




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2352/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2352/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2352/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2352/A


2352/A


A. XXIX. Fom


65.B.69


30013


Payne
17/1/11












100
stephany poy of the.

Tedric Carter.

12. 8. 18
How long.




D E
MORBORVM
INTERNORVM
CVRATIONE
LIBRI IIII.

DIONYSIO FONTANONO
Doctore Medico Mompeffulensi
Authore .

lectis ab Ioanne Rænerio Medico in singulis Capitulum
 initijs morborum causis, & signis, ex Galeno,
 Paulo Ægineta, atque Aëtio desumptis.



VENETIIS,
APVD BALTASSAREM CONSTAN
TINVM. M D LIII.




IOANNES RAENERIVS MEDICVS

Philiberto Girincto apud Lugdunensem

sem diui Ioannis ædem equiti.

ΥΠΩΡΧΩΤΑΤΩ. S.



ANNO superiore proximo Dionysii
Fontanoni, mei in re medica præce=
ptoris, apud Mompeffsulum quondam
celeberrimi, omniq; laude dignissimi,
præcticam Græcanico uocabulo ap=
tam imprimendam curauit. Quam quidem ad rem
andam, Ioannem Frellonium bibliopolam, et typo=
graphum solertissimum delegi, quod eius ea sit laus, ut
ioforum utilitati magis, quam suo quæstui studeat.
nim quæ ex sua officina chalcographica prodeunt,
emendatissima sint, eorum hanc ad rem literato=
rum, nulli parcens sumptui, conducit, qui οὐδὲ μόνον ἐμ=
σοφείν, ἀλλὰ καὶ ὁπιοῦν ὅμματα ἔχουσι. In li=
tari aut prioris editionis epistola lectorẽ monui, ex=
tissimũ illũ uirum, cuius sapiẽtiæ claritas, et incom=
abilis doctrinæ fama innumeros à remotissimis re=
gibus Mompeffsulum perducebat, morborũ interno=
curandi rationem singulis propè annis, ijs qui ipse
gram dabant, dictare solitum fuisse, cum alijs abeun=
s alijs succederent, se illi in medicam disciplinam tra=
tes. Cuius rei testis est numerosa medicorum caterua,
ex eius ludo arte medica instructissimi prodire, nũc
uaria orbis loca sparsi, dispalatiq; languentibus salu=
restituentes, peneq; mortuos ab interitu uindican=
Porro hæc Frellonij typis excusa, omnium postrema
fuit,

fuit, ut quæ uno aut altero anno prius, quàm rebus
manis excederet, ab eo dictata est. In qua sanè se ip
peravit suavius morti uicinus canens, olorem imit
qui, ut ait poeta.

Dulcia defecta modulatur carmina lingua

Cantator cygnus funeris ipse sui.

Hæc autem dictare homo laudis minimè cupidus, lucem
emissum iri aliquando speraret, nunquam est
gressus, satis illi erat eos ad praxim formare, atque
stituire, quos erudiendos susceperat. At sanè iniqu
erat tantum uirum merita gloria, & tot artis me
studioforum millia tanta cōmoditate fraudari. Hoc e
authore, longissimo medicorum operum usu exercita
simo, remediorum syluam, curandiq; ordinem nem
licius tradidit. Morborum autem causas, eorumq;
tas non unà cum remedijs dictabat, discipulos excip
tes ad Galenum, quem per idem tempus magna cum
ria profitebatur, ut hac in re ipsis abundè satisfac
rum, allegabat. Ego uero ne quid studiosus lecto
practico mei præceptoris opere desideraret, eas ex
leno, Paulo Aegineta, Actio, alijsq; homotechnis u
desumptas, quàm potui maxime in compendium re
ctas, adieci. In doctis enim nihil satis est longum,
Etis uerò ὅτι αἱ ἐπεὶ διαρκεῖ. At uerò quoniam nos
ætate medicinæ plurimum pristini sui nitoris accep
ac multum antiqui splendoris recuperauit, rudiorq;
ctio fastidiri cœpta est, orationem paulò cultiorem
didi, barbaras officinarum uoces sustuli, earumq; in
cum à Dioscoride, Galeno, alijsq; eiusdem classis u
usurpatas suffeci. Porro ubi prior editio euulgata si

ἱ ἐκ παροῦδος, καὶ ἀρχῆς ἅ' ἔτι νοταυίδος relegi, &
 dicitur, ἃ τινὲς ἐώραυα: mutata multa deprehēdi, mul-
 ta pratermissa. Id quod cum in alijs operibus, quando
 rimium typis excuduntur, quod malè picta sunt, ut fe-
 è sunt, euenire est facile, tum in opere medico, cuius uo-
 abula, & notæ, quibus & pondera, & mensuræ desi-
 nantur, non omnibus nota sunt. Totum itaque hoc
 pus incudi reddidi, mendis emaculaui, mutata restitui,
 uæ pratermissa deerant, suis locis reposui. Ipsum au-
 em in libros quatuor partitus sum, habita ratione ca-
 pitis, thoracis, uentris imi, & generis uenosi, de quarum
 partium morbis separatim libris illis adanussim disse-
 cit. Nunc igitur nitidum, numerisq; omnibus absolu-
 um publicum accipit. Verum cum anno superiore in-
 uce αἰὲν ὑπὸ ἀδιστοῦ exisset, multorum imperito-
 rum calumnijs impetitum fuit, quibus quiduis facilius
 carpere, quàm aut imitari, aut facere. Quod homi-
 num genus Deorum gaudia tum demum se affecutum pu-
 tat, si doctiores re uel minima reprehendere possit, ex
 aliena obscuratone clarius sibi nomen proferre existi-
 mans. Hæc apud illiteratos agunt, apud quos illis est
 αἰσχροὺν σιοπᾶν, ne ineruditi uideantur. Sine cuiusquam
 igitur patrocinio rursum in lucem prodire recusabat,
 illos reformidans, atque eos, qui etiam αὖτε δὲ ἄγορᾳ
 malè ominata loquuntur. Multis autem illi oblati,
 qui ipsum à calumniantium sannis inconcussum tueri
 possent, te, humanissime Girinete, cunctis prætulit, no-
 menq; tuum sibi inscribi efflagitauit, quo & fieret ho-
 nestior, & aduersus maledicos instructior. Neque id
 temere, cum fide, & obseruantia, ac incredibili stu-
 dio

dio in amicos, præcipua in cunctos beneficentia, om-
 nium sis & beneuolentia & amore dignissimus. Ben-
 mediusfidius sibi consuluit sub tui nominis auspicio i-
 publicum prodire uolens, cum uir sis impigro, ac ac-
 ingenio, multiplici eruditione excullo, qui si quempia
 oppugnare aggredieris, nunquam nisi eo expugnat
 quiescis: pro his autem, quos tibi in animo tueri est
 strenuissime depugnas, nec unquam quisquam, quen
 protegendum suscepisti, tuum aut consilium, aut in-
 ptum frustra esse sensit. At uero ista tua ingenij dexte-
 ritate, atque solertia, indefessoq; in rebus obeundis la-
 bore, ac uigilanti cura, haud uulgari cum doctrina coi-
 iuncta, in tantam claritudinem peruenisti, ut non mo-
 dò excellentibus illis dominis in diui Ioannis æde apu-
 Lugdunum comitibus, sed & Reuerendissimo D. Cardi-
 nali Ferrariensi, Lugdunensi archiepiscopo uehemen-
 ter carus sis, teq; omnes magis ac magis in dies ample-
 ctantur. Tantū quoq; tuæ prudenti industriæ tribuunt,
 ut per te res omnes & arduas, et asperas agant: quippe
 qui ὡς ἰαί & ἄλλ & εἰς τὰ τ' εὐτὰ, πὶ τ' εὐδ-
 μων, πρὸ τ' εὐτὰ. His accedit ingenua quædā tibi mo-
 rū suauitas, & elegantia, ac animi munificētia, quæ cū
 alijs quidem est cognita, tum mihi in primis perspecta,
 quem multis, & ὡς ἄλλ & πὸς magnis beneficijs cumula-
 sti, quorum memoriam immortalem fore percipio.


Nostrum igitur hunc tibi laborem qualemcumq; nun-
 cupo, non quod tuis in me meritis parem esse putem, sed
 quod nostri amoris monumentum, ac pignus aliquod
 extare exoptem. Etenim tuis in me meritis parem re-
 ferre gratiam haud possum, aliquam tamen pro uiri-
 li parte

parte bene & sentiendo, & loquendo, interdum &
scribendo λαβῆς ζῆδεῖσθαι, referam. Interca no-
strum hunc tibi dicatum laborem, qua me
soles frontis serenitate suscipe. Deus
Optimus Maximus, & diu-
tissime incolumem, &
florentem ser-
uet. Vale.

* *

*

4 4



INDEX ALPHABETICVS

BETICVS EORVM QVAE IN

his quatuor libris continentur, Mor-

bos internos, & eorum an-

tidota complectens.

A

Anorexia quid, et eius caus.

- A** B Apoplexia libera se. 89
 ti, in paralyfim Apoplexiae quomodo sub-
 cidunt. 27 ueniendum. 28
 Apoplexia per pauci li Apoplexia laborantes, exi-
 erantur. 27 guè spirant, iacentq; mor-
 r diuersiter alteratus, di-
 ersas gignit febres. 202 tuis persimiles. 27
 er humidus febres putri-
 las generare potest. 202 Apoplexia laborātes (quā-
 er multipliciter potest al-
 terari. 202 uis nullū, in eis uita indi-
 cium appareat) ante ter-
 tiū diem exactum, sepe
 liendi non sunt. 28
 garicus in Colico dolore, Apoplexiā præcedētia. 28
 enematis nō miscēdus, Apoplexia quid. 27
 quia intestina lēdit. 192 Apoplexia unde oria-
 ni procidentiae multipli-
 ces causae. 126 tur. 27
 ni procidentiae qualiter
 medendum. 127 Appetentia canina laborā-
 tes uinum flauum, aut ru-
 brū, & dulce bibant. 93
 Anorexia à pituitoso hu-
 more curatio. 91 Appetentiae caninae multi-
 plex causa. 91
 Anorexia qualiter cure-
 tur. 89 Appetentiae caninae mede-
 la. 94. 95

a s

Asthma

I N D E X

<i>Asthma morbus quid.</i>	70	<i>tibus utile.</i>	12
<i>Asthmate laborantes, quibus cibis uesti debeant.</i>	70	C	
<i>Asthmatis à frigida causa, Curatio.</i>	72	C <i>Alculi in renibus n</i>	15
<i>Asthmatis medela.</i>	95.	<i>tæ.</i>	15
71.72.		<i>Calculi præcautio.</i>	15
<i>Auerrois gloriatur se multos à morte liberaffe, frigida potu.</i>	170	<i>Calculi renũ duæ sunt causæ.</i>	15
<i>Atra bilis propriè quid.</i>	327.	<i>Calculi renũ medela.</i>	15
B		158.	
B <i>Alani hemorrhoidibus cõferentes.</i>	129	<i>Calculi uesticæ Curatio.</i>	160.
<i>Balani in causo adhibendi.</i>	182	<i>Calorem ab hepate tollentia.</i>	18
<i>Balneum fluori muliebri salubre.</i>	136	<i>Calorem febrilem sedantia.</i>	172.
<i>Balneum mola laborantibus salubre.</i>	142	<i>Cancer in utero duplex.</i>	153.
<i>Balneum naturale sulphureũ, et aluminosum, fluori muliebri multum salubre.</i>	136	<i>Cancer non hulceratus.</i>	153.
<i>Balneum pro menstruorũ suppressione.</i>	131	<i>Cancer hulceratus.</i>	153
<i>Balneum pro partus acceratione.</i>	146	<i>Cancris in utero medela.</i>	153.154.
<i>Balneum Tinefmo laborã</i>		<i>Capitis dolorem sedantia</i>	332.
		<i>Cari ab Apoplexia differentia.</i>	19
		<i>Cari & lethargi discrimin.</i>	19
		<i>Carnẽ regenerantia.</i>	150
		<i>Caros à frigida, aut humida</i>	da

ALPHABETICVS.

a intemperie cerebri.	Cephalalgia biliosa compo	
1.	sita.	4
ros per cōsensum totius	Cephalalgia biliosa sim	
orporis.	plex, quomodo curetur.	3
ros per consensum uen	Cephalalgia melancholi	
riculi.	ca:	9
ros per consensum ute	Cephalalgia pituitosa.	5
i.	Cephalalgia sanguinea	
ros pituitosus, & eius	qualiter curetur.	2
Curatio.	Cephalalgia uentriculi ui	
ros quid, & unde oria	tio orta.	8
ur.	Ceratum pro pręgnanti	
atalepsyos, & Apople	bus.	145
xię discrimen.	Ceratum pro uomitu.	87
atalepsyos & Catoches	Cerebrum roborantia.	8
differentia.	Cholerae accurate, & sine	
atalepsyos et lethargi dif	mora succurrendum.	88
ferentia.	Cholerae qualiter meden	
atalepsyos quid, & unde	dum.	88
oriatur.	Cholera quid, et unde oria	
atarri tres differentię.	tur.	88
45.	Coitus, renũ hulceribus af	
ausos qualiter curetur.	fectis summę perniciosus.	
182.	164.	
ausos quid, & eius notę.	Colici doloris medelę.	
181.	119. 120.	
ephalalgia à Gallico mor	Colicus dolor unde oriatur.	
bo.	119.	
ephalalgia à pituita per	Conditum, pro febre Syn	
proprietatem cerebri.	copali à bilioso humore	
9	labo	

I N D E X

laborantibus.	194	Diabetes origo, & Cura	163
Conditum, quod febricitantes, sitis tempore uti possunt.	173	Diarrhœa medela.	110.
Conditum sitis tempore, febre quartana intermittente laborantibus, utile.	197.	Diarrhœa quid, & unde ortum habeat.	110
Cordis palpitatio à frigida causa quomodo curetur.	81.	Dolor meiendi qualiter mitigandus.	166
Cordis palpitationis medela.	80.81	Dydimi relaxatio.	161
Cordis palpitatio per uentriculi cōsensum qualiter curetur.	81	Dydimi relaxationis medela.	162
Cordis palpitatio, quid & unde ortum habeat.	80	Dysenteria medela.	115.
Corpora pestilentiali febri obnoxia quæ.	203	Dysenteria quid, & unde oriatur.	115
Cor roborantia.	183	E	
Cynanche à frigida causa, quomodo curetur.	65	Ephialthæ, et Epilepsia discrimin.	23
Cynanche, quæ latinis Angina dicitur quid.	60	Ephialthes morbus Graecis, Latinis Incubus, quid sit.	21
Cynanches quatuor differentia.	60	Ephialthes morbus, pueris frequens.	21
D		Ephialthes, siue Incubus, ex assidua cruditate uentriculi, & crapula, oriatur.	21
D elirium unde cōtingat.	181	Epilepsia à sanguine, & à bilioso humore.	27
		Epilepsia per consensum	cum

ALPHABETICVS.

um parte aliqua subie-	26	Febris lipiria, & Hepiala,
ta.		cx genere febrium quoti-
pilepsie, pueri, & adole-		dianarum intermittentiũ
centes obnoxij.	32	sunt.
		191
pilepsia propter consen-		Febris lipiria unde oria-
sum oris uentriculi.	25	tur.
		191
pilepsia quid.	23	Febris nonana qualiter cu-
pilepsia tripliciter gigni-		retur.
tur.	23	201
		Febris pestilentialis aliqua
		do à solo influxu cœlesti
		fit.
		202
F ebre Syncopali labo-		Febris pestilentialis causæ.
rantes, quibus cibis		202.
uesci debeât.	193. 194	
ebres melancholica.	195	Febris pestilentialis signa.
ebri cõtinue inflatiue cũ		202.
putredine qualiter medẽ		Febris phlegmatica du-
dum.	169	plex.
		185
Febris tertianæ nothæ, qua		Febris Phlegmatica, Me-
liter medendum.	174	lancholiæ admista quali-
Febris continua inflatiua,		ter curetur.
cum putredine unde oria-		189
tur, & eius notæ.	169	Febre quartana intermit-
Febris continua inflatiua		tente laborantibus, qui ci-
quæ Græcis Synochos di-		bi utiles.
citur, unde oriatur.	167	196
Febris continuæ inflatiuæ		Febris quartanæ intermit-
citra putredinem mede-		tentis, secundum Galenũ,
la.	167. 168	notæ.
		196
Febris Hepiala unde oria-		Febris quartana intermit-
tur.	191	tens, unde oriatur.
		199
		Febris quartanæ origo.
		196.

Febris

I N D E X

laborantibus.	194	Diabetes origo, & Cura	
Conditum, quod febricitan		tio.	163
tes, sitis tempore uti pos		Diarrhœæ medela.	110.
sunt.	173		111.
Conditum sitis tempore, fe		Diarrhœa quid, & unde or	
bre quartana intermittē		tum habeat.	110
te laborantibus, utile.		Dolor meiendi qualiter mi	
	197.	tigandus.	166
Cordis palpitatio à frigida		Dydimi relaxatio.	161
causa quomodo curetur.		Dydimi relaxationis mede	
	81.	la.	162
Cordis palpitatio mede		Dysenteria medela.	115.
la.	80.81		116.
Cordis palpitatio per uen		Dysenteria quid, & unde	
triculi cōsensum qualiter		oriatur.	115
curetur.	81		
		E	
Cordis palpitatio, quid &		E Phialthæ, et Epileps	
unde ortum habeat.	80	sie discrimen.	23
Corpora pestilētiali febri		Ephialthes morbus Græ	
obnoxia quæ.	203	cis, Latinis Incubus, quid	
Cor roborantia.	183	sit.	21
Cynanche à frigida causa,		Ephialthes morbus, pueris	
quomodo curetur.	65	frequens.	21
Cynanche, quæ latinis An		Ephialthes, siue Incubus,	
gina dicitur quid.	60	ex assidua cruditate uen	
Cynanches quatuor disse		triculi, & crapula, ori	
rentiæ.	60	tur.	21
D		Epilepsia à sanguine, & à	
D Elirium unde cōtin		bilioso humore.	27
gat.	181	Epilepsia per consensum	
		cum	

ALPHABETICVS.

cum parte aliqua subie-	26	Febris lipiria, & Hepiala,	
cta.		ex genere febrium quoti-	
Epilepsia, pueri, & adole-		dianarum intermittentiū	
scentes obnoxij.	32	sunt.	191
Epilepsia propter consen-		Febris lipiria unde oria-	
sum oris uentriculi.	25	tur.	191
Epilepsia quid.	23	Febris nonana qualiter cu-	
Epilepsia tripliciter gigni-		retur.	201
tur.	23	Febris pestilentialis aliqua	
		do à solo influxu cœlesti	
		fit.	202
F ebre Syncopali labo-		Febris pestilentialis causæ.	
rantes, quibus cibis			202.
uesci debeāt.	193.194	Febris pestilentialis signa.	
Febres melancholica.	195		202.
Febri cōtinuæ inflatiuæ cū		Febris phlegmatica due-	
putredine qualiter medē-		plex.	185
dum.	169	Febris Phlegmatica, Me-	
Febri tertianæ nothæ, qua-		lancholiæ admista quali-	
liter medendum.	174	ter curetur.	189
Febris continua inflatiua,		Febre quartana intermit-	
cum putredine unde oria-		tente laborantibus, qui ci-	
tur, & eius notæ.	169	bi utiles.	196
Febris continua inflatiua		Febris quartanæ intermit-	
quæ Græcis Synochos di-		tentis, secundum Galenū,	
citur, unde oriatur.	167	notæ.	196
Febris continuæ inflatiuæ		Febris quartana intermit-	
citra putredinem mede-		tens, unde oriatur.	199
læ.	167.168	Febris quartanæ origo.	
Febris Hepiala unde oria-			196.
tur.	191		

Febris

I N D E X

laborantibus.	194	Diabetes origo, & Cura	
Conditum, quod febricitantes, sitis tempore uti possunt.	173	tio.	163
Conditum sitis tempore, febre quartana intermittente laborantibus, utile.	197.	Diarrhœæ medela.	110.
Cordis palpitatio à frigida causa quomodo curetur.	81.	111.	
Cordis palpitatio per uentriculi cōsensum qualiter curetur.	81	Diarrhœa quid, & unde ortum habeat.	110
Cordis palpitatio, quid & unde ortum habeat.	80	Dolor meiendi qualiter mitigandus.	166
Corpora pestilentiali febri obnoxia quæ.	203	Dydimi relaxatio.	161
Cor roborantia.	183	Dydimi relaxationis medela.	162
Cynanche à frigida causa, quomodo curetur.	65	Dysenteria medela.	115.
Cynanche, quæ latinis Angina dicitur quid.	60	116.	
Cynanches quatuor differentie.	60	Dysenteria quid, & unde oriatur.	115
			E
		Ephialthæ, et Epilepsie discrimin.	23
		Ephialthes morbus Græcis, Latinis Incubus, quid sit.	21
		Ephialthes morbus, pueris frequens.	21
		Ephialthes, siue Incubus, ex assidua cruditate uentriculi, & crapula, oriatur.	21
		Epilepsia à sanguine, & à bilioso humore.	27
		Epilepsia per consensum cum	

ALPHABETICVS.

cum parte aliqua subie-	26	Febris lipiria, & Hepiala,	
cta.		ex genere febrium quoti-	
Epilepsia, pueri, & adole-		dianarum intermittētū	
scentes obnoxij.	32	sunt.	191
Epilepsia propter consen-		Febris lipiria unde oria-	
sum oris uentriculi.	25	tur.	191
Epilepsia quid.	23	Febris nonana qualiter cu-	
Epilepsia tripliciter gigni-		retur.	201
tur.	23	Febris pestilētialis aliquā	
		do à solo influxu cœlesti	
		fit.	202
F ebre Syncopali labo-		Febris pestilentialis causæ.	
rantes, quibus cibis			202.
uesci debeāt.	193.194	Febris pestilentialis signa.	
Febres melācholica.	195		202.
Febri cōtinuæ inflatiuæ cū		Febris phlegmatica du-	
putredine qualiter medē-		plex.	185
dum.	169	Febris Phlegmatica, Me-	
Febri tertianæ nothæ, qua-		lancholiæ admista quali-	
liter medendum.	174	ter curetur.	189
Febris continua inflatiua,		Febre quartana intermit-	
cum putredine unde oria-		tente laborantibus, qui ci-	
tur, & eius notæ.	169	bi utiles.	196
Febris continua inflatiua		Febris quartanæ intermit-	
quæ Græcis Synochos di-		tentis. secundum Galenū,	
citur, unde oriatur.	167	notæ.	196
Febris continuæ inflatiuæ		Febris quartana intermit-	
citra putredinem mede-		tens, unde oriatur.	199
la.	167.168	Febris quartanæ origo.	
Febris Hepiala unde oria-			196.
tur.	191		

Febris

I N D E X

Febris quintana alijs dete	Alexandro.	193	
rrior teste Hippocrate.	Febris tertianæ continuæ,		
201.	causæ, & notæ.	179	
Febris quintana quomodo	Febris tertiana continua,		
curetur.	201	qualiter curetur.	180
Febris quotidianæ conti-	Febris tertiana non pura		
nua Curatio.	192	à bile vitellina, quomodo	
Febris quotidiana phleg-	curetur.	176	
matica cur ita uocetur.	Febris tertianæ nō puræ,		
185.	à tertiana pura discrimē.		
Febris quotidiana phleg-	178.		
matica quibus signis à	Febris tertianæ non puræ		
tertiana et quarta digno	medelæ.	178. 179	
scitur.	185	Febris tertiana notha du-	
Febris quotidiana, quando	plex.	173	
in quartanam uertitur.	Febris tertianæ puræ in-		
196.	termittētis medelæ.	171	
Febris septana qualiter cu	172. 173.		
retur.	202	Febris tertianæ puræ inter	
Febris syncopalis à bilioso	mittentis signa.	171	
humore, unde oriatur, et	Febrium biliosarum disse-		
eius notæ.	194	rentiæ.	170
Febris syncopalis ab humo	Febrium differentiæ quin		
re phlegmatico quomodo	que.	167	
curetur.	193	Febrium Lipiriæ et Hepia	
Febris syncopalis causæ.	læ, ex Arabum sententia		
193.	Curationes.	192	
Febris syncopalis curadæ	Febrium phlegmaticarum		
duo modi, alter à Gale-	causæ.	193	
no, alter ab Auerroc, &	Fistulæ lachrymalis mede		
	læ.		

ALPHABETICVS.

- la. 57 107.
Fistula lacrymalis, unde *Hepatis imbecillitas* unde
 oriatur. 57 *producatur.* 106
Fluor muliebris qualiter *Hepatis imbecillitati qua*
 curetur. 135. 136 *liter medendum.* 106
 G *Hepatis tumor à causa fri*
G *Ordonij Trochisci.* *gida, qualiter curetur.*
 165. 105.
 H *Hirudines hæmorrhoidi-*
H *æmorrhagiæ è na bus conferunt.* 128
ribus causæ. 62 *Hulceris in uestica existen*
Hæmorrhagia laborâtes, *tis curatio.* 165
quibus cibis uesti debeât. *Humor melancholicus pro*
 62. *priè quid.* 178
Hæmorrhagiæ medelæ. *Hydrope anasarca labo-*
 63. *rantibus, exercitatio su-*
Hæmorrhoides apertæ quo dorem excitans admodû
modo curantur. 128 *utilis.* 99
Hæmorrhoides cæcæ quo- *Hydrope laborantium Si-*
modo curantur. 128 *gna & notæ.* 96
Hæmorrhoidum medelæ. *Hydropis Ascitis à causa*
 128. *calida, curatio.* 96
Hæmorrhoides triplices. *Hydropis Ascitis à causa*
 122. *frigida curatio.* 97
Hepatis phlegmones me- *Hydropis Ascitis notæ, &*
delæ. 104 *signa.* 96
Hepatis phlegmones no- *Hydropis tres species, As-*
 104 *scites, Tympanites, Ana-*
ta. *sarca.* 96
Hepar roborantia, obstru-
ctionesq; aperientia. *Hydropis Tympanitis cu*
ratio.

I N D E X

ratio.	98	L	
Hydrops Tympanitis, nota.	98	L	Acouillum, aut caprinum, renum huc
Hydrops anasarca facilius curatur, quam Ascites & Tympanites.	99		ceribus affectis, salubre
Hydrops anasarca quid.	99		164.
			Lactis potus uesticæ huc
Hydrops Tympanites à causis calidis ferè suboritur.	98		bus remedium eximium
Hydrops Tympanites, omnium periculosissima.	96.		166.
Hydrops unde ortum habeat.	96		Lacrymæ ex oculis manantes, et earum medela. 53
Hypochyma, quid, & unde oriatur, & quomodo curetur.	54		Lacrymæ frigide, & earum curatio. 54
I			Lethargus. 17
Icterus quid.	102		Lienis obstructione laborantes, turbulentis somnijs uexantur. 107
Icteri medela.	102		Lienis obstructione laborantium signa. 109
Icteri multiplices causæ.	101.		Lienis officium. 107
Ilei doloris multiplices causæ.	121		Lienis phlegmones curatio. 109
Ilei doloris notæ.	121		Lienis phlegmones notæ. 109.
Ilei doloribus qualiter medendum.	121, 122		Lienis phlegmone unde. 109.
			Lienis scirrhi curatio: 109.
			Lienis tumor si sit à melancholica materia, qualiter curandus. 110
			Lienis

ALPHABETICVS.

Lienis tumor si frigidus sit	Melancholia quid.	32
& mollis qualiter curan-	Melancholia Hypochondriaca.	34
dus. 56		
Lienteria qualiter meden-	Melancholia naturalis quid	
dum. 117. 118	195.	
Lienteria quid, & eius cau-	Melancholia præter natu-	
se. 117	ram quadruplex. 195	
Linguae nigredini, & aspe-	Melancholia laborantes,	
ritati qualiter prospiciē-	quidam se uasa fictilia fa-	
dum. 181	ctos esse putant, & ob id	
Lumbrici qualiter necan-	occurrentibus cedunt, ne	
di, ac à uentre expellen-	collidantur. 32	
di. 97	Melancholiae qualiter sub	
	ueniendum. 33	
M		
Ania quid, & unde	Melancholici, mœsti, uitæ,	
oriatur. 29	& hominum osiores. 32	
Mania & phrenetidis di-	Melancholici omnes timēt	
scrimen. 29	& facile terrentur. 32	
Mania laborantes quidam	Melancholici quidam, mor-	
frequenter rident, quidā	tem timent, et tamē mor-	
iracundi ac temerarij eua-	tem sibi conciscunt. 32	
dunt. 29	Melancholici uinum albū,	
Mania laborantibus, à ui-	& tenue bibant. 32	
no prorsus abstinendum	Melancholici uitā damnāt,	
est. 29	non tamen omnes mori	
Mania qualiter succurren-	cupiunt. 32	
dum. 30	Melancholici quidam bru-	
Maniam antecedentia. 29	ta se esse animalia crea-	
Melancholiae tres differen-	dunt, ipsorumq; uoces &	
tia. 32	gestus imitantur. 32	
	b Melan-	

I N D E X

- Melancholici quibus cibis 32
uesci debeant. 32
- Melancholicis, cantus, & 131.
instrumenta musica con-
ferunt. 33
- Melancholicis coitus mo- 33
deratus confert. 33
- Melancholicis somnus plu-
rimum confert, qui si nō
sponte obrepat, concilian-
dus. 32
- Melancholicus humor du-
plex, naturalis, et præter
naturam. 195
- Menstrua mulieribus quā-
do fluere incipiant, &
quando desinant. 130
- Mēstruorū purgatio, quot
diebus terminetur. 130
- Menstruorum redundans
fluxus quid, & eius cau-
sæ. 134
- Menstruorum redundantis
fluxus notæ. 134
- Menstruorum redundans
fluxus qualiter curan-
dus. 134
- Menstruorum suppressio-
nis multiplices causæ.
130.
- Menstruorum suppressio-
ni qualiter medendum.
131.
- Menstruorum suppressio-
nis notæ. 130
- Mola triplex. 141
- Mola carnea quid, eius cau-
sæ, & notæ. 141
- Molæ ab Hydroke disci-
men. 141
- Mola incurabilis, nisi prin-
cipio remedia adhibean-
tur. 141
- Mola qualiter curanda.
141. 142.
- Mola uentosa quid, & quo
modo curetur. 142
- Mulieres quæ mēstruis nō
purgantur, minimè conci-
piunt. 132

O

O

Phtalmia duplex.

50.

Ophtalmia uera quid. 50

Ophtalmia uera quid, &
unde ortum habeat. 50

Ophtalmiæ triplex causa.

50.

Ophtalmiæ qualiter sub-
ueniendum. 51. 52

Para

ALPHABETICVS.

P

Phrenitidis tres species.

P aralysis quid, & eius curatio. 37.38	15.	Phrenitis uera. 15
Paralysis à casu, aut per= cussione. 40	Phrenitis non uera. 14	
Paralysis à sanguine. 41	Pleuritidis notæ, & nō ue ræ, curatio. 79	
Paralysis ani. 40	Pleuritis quid. 74	
Paralysis linguæ. 40	Pleuritidis causæ. 74	
Parotides unde oriantur 60.	Pleuritidis medelæ: 75.	
Parotides à frigida causa quomodo curentur. 61	76.	
Parotidum curatio. 60	Pleuritidis ueræ notæ, & signa. 74	
Partus acceleratio, fœ= tusq; euocatio, quibus me dicamētis iuuetur. 146	Pleuritide laborātes, om= nia actu ualida bibere debent. 74	
Partus difficultatis reme= dia. 146	Pleuritide laborātes aquā frigidā summē uitent. 74	
Partus difficultatis plures causæ. 146	Pleuritide laborātes, in la tus affectum cubent. 74	
Peripneumonia quid. 79	Pleuritide laborātibus, ui= num non est dandum sal= tem ante septimū diem.	
Peripneumonia laborātiū notæ. 79	74.	
Peripneumoniæ causæ. 79	Pregnātes caueāt ab irati more, mœrore, uomitu, & tussi 144	
Peripneumonia quomodo curetur. 79	Pregnātes, exercitium la= boriosum, saltus, choreas, & coitum uitent. 144	
Pileolus Asthmate laborā tibus utilis. 74	Pregnantium medelæ.	
Pilulæ bilem, & pituitam uacuant. 175		

b z 144

I N D E X

144. 145

S

Pregnantibus nō solita co
medi appetentibus mini-
mē neganda. 145

Pregnātis regimen, ut fœ-
tus conseruetur, & uite-
tur abortus. 144

Pruritus, seu priapismus
uteri quid. 159

Pruritus uteri unde oria-
tur. 160

Pruritus uteri qualiter cu-
retur. 160. 161

Putredo quid.

Putrefactio quid.

R

Raphani mira pro-
prietas. 160

Renum hulceribus affecti
quibus cibis uesci debent,
& à quibus abstinere.
164.

Renum hulcerum medela.
164. 165.

Renum hulcera unde orian-
tur, & eorum signa. 164

Renum hulceribus affecti,
nihil crudi edere debent.
164.

Sanguinis fluorem ē na-
ribus sistentia. 196

Scomata morbus quid, &
eius causæ. 12

Scirrhus diuturnus in can-
crum uertitur. 153

Scirrhus quid. 152

Scirrhus uteri qualiter cu-
retur. 152

Somnum prouocātia. 173

Somnus prolixior, renum
hulceribus affectis sum-
mē uitandus. 164

Spasmus quid, & eius cau-
sæ. 41

Spasmi tres species. 44

Sternutamentum cientia.
58.

Stupor quid. 45

Suffocationis ab utero cu-
rationes. 138. 139

Suffocationis ab utero no-
tæ: 137

Suffocatio ab utero quid,
& unde ortum habeat.
137.

Suffocationē ab utero præ-
cedentia. 138

Surditas à causa calida. 59

Surditas

ALPHABETICVS.

Surditas à primo ortu ho-
minem comitata incur-
bilis est. 58 84.

Surditatis causæ. 58 *Ventriculi dolorem miti-*
Surditatis medelæ. 58 *gantia.* 83

Syncope quid. 82 *Ventriculi dolor unde or-*
Syncopes causæ multipli-
ces. 82 *tum habeat.* 83

Syncopes medelæ. 82 *Ventriculum, & membra*
Syncope laborantiũ signa,
& notæ. 82 *roborantia.* 177

Vētriculũ roborantia. 84
Vesica resoluta. 40

Vesicæ hulcerum medelæ.
166.

Vesicæ hulcus qualiter co-
gnoscat. 165

Vinum dysenteria labo-
rantibus noxium. 115

Vomitorium pro febre ter-
tiana laborantibus. 171

Vomitum irritantia. 175
Vomitus à bilioso humore
medelæ. 87

Vomitus à bilioso humore
notæ. 87

Vomitus curatio. 86
Vomitus sanguinis unde.
92.

Vomitus sanguinis mede-
læ. 92.93

Vomitus unde oriatur. 86
V

Vapores è profundita
te terræ exorti,
acrem inficiunt, & pe-
stem generant. 177


Ventrem exiccantia. 97
Vētriculi dolor à bile, quo
modo curetur. 85

b 3 Vrine

I N D E X

<p><i>Vrinæ ardor unde oriatur.</i> 161.</p> <p><i>Vrinæ ardori qualiter me-</i> <i>dendum.</i> 161. 162</p> <p><i>Vteri inflammatio, quid</i> <i>eius causæ, & notæ.</i> 147</p> <p><i>Vteri inflammationi quali-</i> <i>ter medendum.</i> 148 149.</p>	<p><i>Vteri œdema qualiter cu-</i> <i>retur.</i> 150. 151</p> <p><i>Vteri œdematis notæ.</i> 150.</p> <p><i>Vteri prociçetia quid, &</i> <i>eius multiplices causæ.</i> 139.</p> <p><i>Vteri prociçetiæ quo mo-</i> <i>do medendum.</i> 139</p>
--	---

F I N I S.



DIONYSII FONTANA

NONI DOCTORIS MEDICI

MOMPESVLENSIS.

DE MORBORVM INTERNORVM CVRATIONE LIB. I.

CEPHALALGIAE SANGVINEAE

Curatio. Caput. I.



DOLOREM hunc facere possunt, *causae.*
quaecunque plenitudinem in corpore
procreant: ut sunt cibi, & potus hu-
berius sumpti, et ij praesertim, qui bo-
ni sunt succi, cum sudoris, balneorum,
& exercitiorum, aliarumq; uacuationum & natura-
lium, & artificialium neglectu.

Oculi hoc morbo laborantis cum facie rubent, ue- *signa.*
nae tenduntur adeo, ut non solum maiores, sed etiam mi-
nores, & quae antea ob paruitatem latebant, uisumq;
effugiebant, appareant. Pulsus magnus redditur, ac ue-
hemens. Vene temporum pulsant. Urina flava & cras-
sa. Qui sentitur dolor, grauatiuus est.

Victus ratio sit refrigerans, & siccans. Versetur *visus
ratio.*
igitur in aere frigido et sicco: aer igitur cubiculi Aquil-
lonem spectet, non Solem. Quod si talis natura non
sit, arte paretur, aere frigidior per euripos immisso,
& floribus & folijs nymphaeae, salicis, uitis, arundi-
num, & iuncorum sparsis per cubiculi aream. Arceat-

A tur

DE MORB. INTER. CVR.

tur inde hominum turba, ne suo halitu, & transpiratu
aerem calefaciat. Vitet copiose nutrientia, qualia
sunt oua sorbilia, & carnes. Vescatur piscibus carne
friabili præditis, ptisana hordeacea, oleribus frigidis,
utroque intybo satiuo, portulaca, lactuca, cucumere,
cucurbita. Vinum fugiat, aquam pluuiam bibat, aut
aquam cum hordeo coctam. Quòd si aut consuetudo, aut
uirium imbecillitas aliter suadeat, aut morbi paruitas,
uinum nō negetur, sit tamen imbecillum, oligophorum,
ac etiā aqua multa dilutum. Condimentum ex ompha
cio, aceto, arācorum succo, aut citreorum, aut oxalidis
utile est. Et nisi frigida, uentriculi intemperies repu
gnet, sint hæc omnia actu frigida, aut si opus fuerit, cale
fiant, deinde refrigerentur. Motus & corporis, & ani
mi sint remissi, somnus mediocris, et solito parcior. Ve
nus nulla, gaudeat, omnisq; animi perturbatio absit.

Curatio. Curandi ratio statim à uenæ sectione (re quidem nul
la repugnante) auspicianda. Incidatur igitur primum
(si magna quidem plenitudo fuerit) uena interna bra
chij, matutino tempore, ieiuno uētriculo, postridie uerò
humeralis eiusdē brachij: aut media, si per humeralem
malignè fluxerit sanguis. Si pars una capitis altera ma
gis doleat, incidende erunt uenæ iā dictæ brachij eiusdē
partis: si uerò totum caput æquè doleat dextri. Quanti
tas autem sanguinis mittendi sit pro ratione uirium et
plenitudinis. Porro prius quàm uena secetur, corporis
excrementa deijcienda sunt, quòd si sua sponte non con
tigerit, hoc enemate, aut decocto subducatur aluus.

Enema.

Recipe maluæ, althææ, uiolarie, betæ, hordei. ana. m.
i. pruna

i. pruna damascena. x. quatuor seminum frigidorum maiorum, ana drach. i. oxyphœnicōn, un. i. decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. Dein accipe iuris decocti per colum transfusi lib. i. β. cas. recens extractæ, saccha. rub. ana unc. i. olei uiolacei, unc. iij. omnibus commistis fiat enema, quod mane ante pastum infundatur.

Decoctum.

Recipe trium florum communium, ana pugil. i. quatuor seminorum frigidorum maiorum ana. drach. i. pruna damascena. viij. oxyphœnicōn. unc. β. Coquantur in s. q. aquæ fontanæ donec dimidium absumatur, postea manibus exprimantur & colentur, deinde accipe decocti huius un. quatuor. β. cas. recens extractæ, unc. i. serapij uiol. unc. β. commistis omnibus, fiat potio, quæ detur diluculo, prandeat horis post quatuor ad summum, non expectata operatione potionis: uertetur enim in alimentum si diutius in ediam sustinuerit. Poterit loco unc. i. cas. poni. unc. i. β. manna.

Aut in forma boli.

Recipe cas. recens extractæ. unc. i. baccas oxyacanthæ. iij. cum sacch. q. s. fiat bolus, quem capiat diluculo, prandeat hora non insolenti, ad summum quarta à bolo sumpto. Cum utetur enema, eodem die fiat uenæ sectio, enema ciecto statim: cum uerò utetur decocto, aut bolo, postridie circiter septimam horam incidatur uena. Poterit & bolus dari hora una ante coenam, et postridie ieiuno uentriculo uena incidi. Si uerò aut ætas, aut uirtus imbecilla, uenæ secandæ consilium interpellat, affigantur cucurbitæ non quidem capiti, sed partibus capiti continuatis, & coniunctis. Quod si

A 2 dolor

DE MORB. INTER. CVR.

dolor his perfectis intra diem quartum aut quintū non ledetur, appareatq; adhuc in oculis, fronte, & facie rubor, sanguinis fluxus ē naribus excitetur, immis̃sis setis porcinis. Vel aperiātur uenæ frontis, præcipuē si dolor sit in posteriore capitis parte, aliās aperiātur uenæ temporum. Deinde purgetur, humore prius cocto in hunc modum. Recipe serap. nymphae, serap. acetati simp. an. un. i. β. stillatitiorum liquorum, oxalidis, cichorij, buglossi, ana unc. iij. Misceantur omnia, & iij. unc. appetente diluculo à ieiuno bibantur per triduum. Recipe trium santal. unc. β. utatur cum scrapiis.

Solutium.

Recipe pruna damascena. xij. florū nymphae, trium florum communium. ana p. i. quatuor seminum frigidorum maiorum. ana drach. v. coquantur in. s. q. quæ donec dimidium absumatur, accipe decocti huius unc. iij. β. in quibus macerentur corticum myrobala. flauarum, confricatarum oleo amygdal. dulc. drach. iij. manē lento igni fricentur, & colentur, adiectis cas. recens extractæ unc. β. antidoti ē succo rosa. drach. ij. serapij uiolacei, unc. β. commistis omnibus fiat potio purgans.

Sumat hora quarta, prandeat decima, sed horæ die midio antè quàm prandeat utatur hoc lotorio. Reci. pul. sacch. rub. unc. β. aquæ hor. unc. vi. aut iuris pulli salis expertis tantundem, misceat, & bibat. Postridie diluculo edat conser. rosa. unc. β. Si uerò ægrotus opulentus fuerit, mutabis antidotum ē succo rosato in rhabar. selecti unc. i. semis, spicæ grana quinque, quæ minutatim concisa singula macerabis in stillatitij liquoris intybi satiui latioris. & uini albi. q. s. superet autem stillatitius

latitius liquor uinum. Adcurbitulis sine scarificatu af-
fixis scapulis, & lotionē brachiorum, & crurum facta
ut infra. Recip. folior. salicis, florum & foliorum nym-
phæ, foliorū uitis albæ satiua. an. m. ij. coquātur in suf-
ficienti aqua, qua calida lauētur crura, et brachia ante
pastum. Alteranda prætereā est inēperies calida à cali-
dis humoribus relicta, frigidis. Idq; potest fieri statim
post uenæ sectiones dictas. Recipe olei rosar. unc. iij.
ol. nymph. unc. i. ꝑ. acetī unc. i. commista applicentur
fronti frigida ætate, æstate: hyeme, tepida.

Aut sic fiat.

Recipe succi lactuæ, succi foliorum salicis, stillæ
titij liquoris rosarum, ana. unc. iij. acetī unc. i. his com-
mistis immergatur pannus lineus, qui fronti applice-
tur. Quod si magna sit caliditas, addatur caphur. scru.
i. Prætereā Lauetur facies stillatitiis liquoribus ro-
sar. & plantag. Ista etiam quæ fronti applicantur,
non diu retineantur ad frontem, ne fiat reflexio calo-
ris ad caput. Meminerit ægrotus frequenter olfacere
stillatitium liquorem rosar. cum pauco caphuræ.

CEPHALALGIAE BILIOSAE

Simplicis Curatio. Cap. II.

INedia, ira, dolor, labor, uigilia, exercitatio nimia, Cause.
uietus ratio ex biliosis cibis, ut alliis, porris, & si-
milibus, & quæcunque uniuersum corpus, atque adeo
caput calefaciunt, & exiccant, unde flaua bilis pro-
creatur, hoc genus doloris capitis efficiunt. Huc acce-
dit hominis temperatura calidior, anni tempus, ætas
uigens, uitaq; sollicita, quæ omnia faciunt ad flauæ
bills coacervationem. Qui sic dolent, facie pallent, signa.

A 3 oris

DE MORB. INTER. CVR.

Viſtus
ratio.

oris adest amaritudo, cum lingue, narium, & oris ſiccitate. Deligendus aer, in quo moretur ægrotus, qui natura ſit frigidus, & humidus, aut qui noſtra induſtria ſic præparatus ſit, ſparſis floribus, ac germinibus frigida facultate præditis per ſolum cubiculi, quales ſunt roſæ, uiolæ, nymphææ flores, uitium capreoli, & id genus alia. Aer quoque refrigeretur aqua frigida de uafe in uas ſubinde transfuſa. Sit ægrotans hiliaris, omnes animi perturbationes declinans. Somno longiore, quieteque utatur. Cibi quibus uſcetur, ſint humidi, bonique ſucci, qualis lactuca, portulaca, intybus, oxalis, ſpinacium. Conueniunt fructus etiam crudi, poma, pyra accida, & ſaxatiles piſces. Vino prorsus abſtinendum, potas ſit aqua. Sectio uenæ in hoc affectu non inutilis, præſertim ſi bilis à ſanguine non multum diſtet. Deinde utemur bilis impetum obtundentibus, cuiusque furorem reprimentibus in hunc modum.

Curatio.

Recipe ſerapij acetati ſimpl. ſerap. nymphææ, ſerap. uiolacei. ana. unc. i. ſ. ſtillatitiorum liquorum, intybi ſatiui latioris, bugloſſ. cichorij. ana. unc. iij. Miſceantur omnia, & appetente diluculo ab ægrotante ieiunio, unc. iij. bibantur. Recipe trium ſantal. unc. ſ. utatur cum ſerap.

Potio purgans.

Recipe Rhabar. ſelecti. drach. i. ſpice gr. v. oxiphœnicon, unc. i. macerentur in ſtillatio liquore intybi ſatiui latioris & pauco uino albo per noctem minutatim prius concifa, deinde ualide exprimantur et colentur, adiectis ſerap. roſa. purgatorij. unc. ij. fiat potio purgans, quæ circiter crepuſculum ſumatur, horis quinque
ante

ante quemuis pastum.

Vel fiat sic.

Recipe cas. recens extractæ. drach. vi. antidoti è succo rosa. drach. iij. serapij rosati solut. unc. i. cum decocto prunorum, trium florum communium, & hordei fiat potio purgans, quæ sumatur ut dictum est.

Vel in forma boli.

Recipe cas. recens extractæ, unciam unam. rhabar. selecti drach. i. antidoti è succo rosa. drach. i. ß. cum saccharo fiat bolus: capiatur dictum est.

Vel in forma pilularum.

Recipe pil. aggreg. scrupu. iij. ß. cum stillatitio liquore intybi latioris fingantur pil. vij. quæ sumantur circiter mediam noctem finitis serapijs. Postridie uerò appetente diluculo edat conseruæ rosa. unc. ß. Loca lia remedia adhibeantur ut dictum est in Cephalalgia sanguinea, uerum maior refrigeratio in hoc affectu requiritur, fiat igitur in hunc modum. Recipe ole. uiolacei, ole. nymphæ, ole. de salicibus. ana. unc. i. ß. Commistis omnibus linantur frons & tempora frigide manè & uespèri, & iniiciantur in nares & aures. Prætereà olfaciat sæpè caphuram dissolutam in stillatitio liquore rosarum. Fiant quoque lotiones crurum & brachiorum, ut dictum est capite proximo superiore. Quòd si dolor intensus sit, nec predictis præsidijs cedat, dissoluantur gr. ij. opij in stillatitio liquore rosa. quæ in nares & aures iniiciantur: ceterum istud rarenter fiat: frequens enim huius præsidij usus magis obesset, quàm prodesset.

A 4 Cepha

DE MORB. INTER. CVR.
CEPHALALGIAE BILIOSAE COM-
positæ Curatio. Caput. III.

causæ.
Curatio.

Fit autem hic affectus, ubi flaua bilis cum pituita mi-
scetur. Curandi ratio auspicanda statim à materia-
rum communium uacuatione. Vacuabuntur autem &
educuntur aut hoc, aut simili enemate. Recipe mal-
uæ, althææ, betæ, uiolarum. ana. M. i. florum chamæme-
li, P. i. ß. oxyphœnicæ n. unc. ß. coquantur in. s. q. aquæ
fontanæ ad tertias, & colo transfundantur. dein accipe
iuris decocti, & colati lib. i. ß. cas. recens extractæ, sac-
chæ. semel duntaxat cocti. ana. drac. i. ß. mel. ros. col. unc.
ij. ole. uiola. & chamæmeli. ana. unc. i. ß. commistis omni-
bus fiat enema: detur ante pastum. Quod si in ægroto
plenitudo apparuerit, humorq; morbi causa nō multum
à sanguine recesserit, fiat sectio uenæ humeralis. Dein
de concoquatur humor, hoc est alteretur, & edometur,
naturæq; obsequens reddatur, ut per loca euacuationi
cōuenientia sine molestia purgante medicamento traha-
tur. Id quod ad hunc, aut similem modum fiet.

Recipe Serapij acetati simpl. unc. ij. mel. ros. colati.
unc. i. ß. serapij è succo intybi satiui latioris unciam unā.
Stillatitiorum liquorum, betonica, cichorij, buglossi.
an. unc. iij. Misceantur omnia, & appetente diluculo bi-
bantur à ieiuno unc. iij. per triduum. Si bilis non fuerit
(ut loquuntur) citrina, sed uitellina, pro melle rosacco
substituatur oxymeli simplex, uel scilliticum. Recipe
Diarrhod. abb. unc. ß. ut atur cum serapijs.

Potio purgans.

Recip. Rhabar. selecti. scrup. iij. agar. in pastillorum
formam redacti, scrup. ij. cinnamomi optimi gra. v. In-
fun-

LIBER PRIMVS. 5

fundantur stillatitijs liquoribus beton. & intybi satiui
latioris, ac pauco uino albo horis xij. deinde exprimantur,
& colentur adiectis serapij rosa. purgatorij unc.
ij. fiat potio purgans. Potest aliquando addi scrup. i.
rhabar. puluerati ad partes debiles roborandas.

Vel sic.

Recipe Cathol. unc. β. diaphoenici drac. ij. β. antidoti
ē succo rosa. drach. i. serapij adianti. unc. β. excipiantur
communi medicina decocto, fiatq; potio. Sumatur ad
crepusculum finitis serapijs concoquentibus.

Aut in forma Boli.

Recipe Cathol. unc. i. antidotorum ē succo rosar. &
diaphoenici. ana. drach. i. β. cum saccharo, fingatur bo-
lus, qui sumatur hora quarta à media nocte.

Aut in forma pilularum.

Recipe pilu. aggr. scrup. iij. cum stillatitio liquore
beton. fingantur pilu. vij. quæ sumantur ad mediam no-
ctem. Recipe, conser. rosa. & buglo. ana. drach. i. β. pulu.
diamoschi dul. scrup. i. misceantur, & sumantur post tri-
die mane.

Vel sic.

Reci. Theria. ueter. scrup. ij. conser. rosa. et buglos. ana
drach. i. misceantur, et sumantur sex horis ante pastum.
Deinde utendum apophlegmatismis, errhinis, & sternu-
tamentum cientibus.

Apophlegmatimi.

Recipe Mastich. unc. β. fingantur pastilli mansiles
lupinorum forma, quorum unus à ieiuno horæ dimi-
dium mandatur.

Errhina.

A

3

Re

DE MORB. INTER. CVR.

Recipe iuris decocti sampsuch.unc.i.ß.mannæ granulose.drach.vi.misceantur, & per nares attrahantur à ieiuno.

Aut sic.

Recipe succorum betæ & sampf.ana.unc.i.mel.com.unc.ß.misceantur, & fiant errhina. Sternutamentum cient pul.pip.aut zinzib.in nares immissus. Vti licebit tam apophlegmatismis, quàm errhinis, ac sternutamentum cientibus dies quatuor, aut ad summum quinque post purgationem. Deinde adhibenda erunt localia præsidia. Recipe Alo.unc.ß.farinæ fabarum, uncias duas, ole.ros.q.s.aceti parum, misceantur, & temporibus, & fronti admoueantur. Recipe Ole. chamæmeli.ole.rosa.ole.aneth.ana unciam unam, aceti, unc.ß.misceantur, & iniiciantur intra nares, & aures.

CEPHALALGIAE PITUITOSAE

Curatio.

Cap. IIII.

Causa.

OLera, pisces, fructus, otium, somnus, curis, & solitudine uacans uita, satietas, aliâq; item id genus, quæ pituitam in uniuerso corpore, atque adeò in capite procreare sunt nata, ut in aere frigido, & humido uersari, & ijs denique cibus uti, qui ea sunt facultate

Signa.

præditi, sunt hæc omnia in huius doloris causa. Somnolentia, pigritia, sensum inertia, excrementorum capitis copia, capitis grauitate, faciei albore, humiditateq; deprehenditur hic morbus.

Victus ratio.

Victus ratio calefaciens sit, & siccans. Versetur itaque egrotus in aere calido, & sicco, qui si talis natura non est, industria fiat, luculento igne, suffitibus aromaticum, ut caryophyllorum, cinnamomi, thuris, ligni aloes.

iloes, & similia, quæ uidelicet calida sint, & sicca. Media huic affectui salubris est, quare alimenta pauca sint, & rara, eaq; sinapi, aut alio similibus uiribus condimento prædito condita. Inter olcra, saluiam, hyssobum, saturciam, apium, thymum, maioranam, sibi esse usui norit ægrotus. Carnes, quibus uescetur, natura excrementose parum sit. Magna autem ex parte sint asæ, odoramentorum (ut dictum est) accessione conditæ.

Vino in potu utatur tenui: purgato tamen corpore, uti uino generoso poterit, etiam armatibus medicato, sed parcè. Panis sit fermentatus, salsus, ualde coctus, habens anisum, aut melanthium, aut aromata, aut saccharum admistum. Motu totius corporis celeri, uehementiq; in aere, præsertim calido, siccoq; poterit ægrotus ieiunus exerceri. Vigiliæ, uehementesq; animi curæ ad hunc affectum curandum conducunt. Curandi ratio initium

Curatio.

sumet ab educatione materiam communium. Recipe maluæ, althææ, brassicarum rub. ana. M. i. chamæmeli, meliloti, stœchados Arab. ana. p. ij. Coquantur in. s. q. aquæ ad tertias, & colo transfundantur.

Deinde accipe iuris decocti & colati lib. i. β. casie recens extractæ, saccha. semel duntaxat cocti. ana. unc. i. mell. anthosati. unc. i. β. diaphœnici, uel hieræ picræ. unc. β. ole. com. unc. iij. salis. drach. i. fiat enema, detur ante pastum. Quod si displicuerit enema, aut circa uentriculum grauitas apparet, medicamento hoc, aut simili sumpto educantur.

Recipe Vuarum pass. detractis uinaceis, glycyrrhizæ. ana. unc. β. hyssopi, bugloss. ana. M. β. stœchados Ara. P. i. coquantur in. s. q. aquæ fontanæ usque ad

DE MORB. INTER. CVR.

ad dimidij consumptionem, quod supererit coletur. Deinde accipe decocti huius un. iij. cas. recens extractæ. un. i. mel ros. col. un. ß. fiat potio, quæ horis quatuor ante prædium sumatur. Quod si ægrotus sit iuuenis. appareatq; in eo plenitudo, mittatur sanguis ex humerali uena dextri brachij ad. unc. v. Quoniam autem materia phlegmatica plerunque multa est, minuatur sumpto medicamento priusquam concoquatur.

Recip. Pilul. asier. agar. in pastillorum formam reducti, ana. drach. ß. cum serap. stœchad. fiant pilul. v. quæ capiantur post primum somnum. Deinde concoquatur humor, si crassus quidem fuerit, in hunc modum.

Recip. Mel. rosacei col. unc. ij. ß. oxymel. scillitici, unc. ij. Stillatitiorum liquorum betonicæ, sampsuchi, florum sambuci. ana. unc. iij. Misceantur, & ubi diluxerit, à ieiuno bibantur. un. iij. per triduum. Altero statim triduo rursum idem fiat: non enim facile hic humor concoquitur.

Recip. Diamoschi dulc. unciam, i. utatur cum serapijs. Si uerò materia non ita crassa sit, concoquetur ut sequitur. Recip. Oxymel. simpl. serapij, stœchad. serapij adianti. ana. unc. i. ß. Stillatitiorum liquorum, betonicæ, melissophylli, sampsuchi. an. unc. iij. Misceantur, & triduo. unc. iij. à ieiuno bibantur diluculo. Altero item triduo repetantur. Recip. Diamoschi dulc. unciam unam, utatur cum serapijs.

Aut fiat apozema ut sequitur.

Recipe Radicis acori, quinque rad. com. maceratarum in aceto ana. unc. ß. melissophylli. betonicæ, sampsuchi. ana. manipul. i. thymi, cassutæ. ana. tertiam partem manipuli unius, uuarū passarum detractis uinaceis.
unc.

unc. β. seminum, apij, anisi, fœniculi, ana unc. ij. florum
stœchados, helichrysi, & roris marini, ana pugil. i. β.
Coquantur in. s. q. aquæ, donec dimidium absumatur, co-
lo post transfundatur. Dein accipe decocti illius lib.
unam. β. & adiecto melle. q. s. suaue reddatur, fiat q; se-
rapium mediocris consistentiæ depuratum. Adijciantur
drach. una nucis moschatæ, & drach. ij. cinnamomi
selecti iucundioris & odoris, & saporis gratia. Utetur
autem sex diebus appetente diluculo, ieiunus. Solemus
enim decoctis uti cum herbarum est copia, quarum cum
est penuria serapijs utimur.

Potio purgans.

Recipe uuarum passarum detractis uinaceis, gly-
cyrrhizæ, ana. unc. β. hyssopi, manip. β. florum stœcha-
dos Arabi. pugil. unum. Decoquantur in. s. q. aquæ do-
nec dimidium relinquatur, quod colo transfundetur:
accipiantur autem illius decocti unc. iiij. cas. recens ex-
tractæ. unc. i. diaphœni. unc. β. serapij stœchados unc. β.
fiat potio purgans, quæ sumatur more aliarum me-
dicinarum.

Aut in forma pilularum.

Recipe Pil. coci. drach. i. cum stillatio liquore be-
ton. fingantur pil. v. sumantur ab ægroto ubi primum
à somno excitatus fuerit. Recipe Theria. ueter. scrup.
ij. conser. florum stœchados, conser. bugloss. ana. drach.
i. β. misceantur, & sumantur postridie sex horis
ante pastum.

Aut in forma boli.

Recipe Diaphœnici unc. β. cum saccha. fingatur bo-
lus, qui sumatur hora quinta mane.

Aut

DE MORB. INTER. CVR.

Aut poterit uti hoc puluere.

Recipe Turpeti scelecti drach.i. zinzib. drach.ß.
pul. stœchados, pul. seminis peoniæ, ana scrup.i. saccha-
ri ad pondus omnium, fiat puluis, qui detur diluculo cū
iure cicerum rub. uel cum iure pulli. Postridie uerò de-
tur theriaca ut suprā. Corpore purgato utatur errhi-
nis, sternutamentum cientibus, & gargarismis, ac po-
stremo cerebrum corroborantibus.

Errhina.

Recipe nigellæ torrefactæ drach.i. cum succo maio-
ranæ fiant errhina, quibus utetur tepidis ieiunus.

Vel sic.

Recipe succi rutæ unc.ij. hieræ picræ, uel benedi-
ctæ, aureæ Alexandrinæ ana drach.ij. fiant errhina,
quibus tepidis ieiunus utetur.

Vel sic.

Recipe succi maioranæ, succi betæ, ana unc.i.ß.
uini albi unc.i. zinziberis, pyrethri. ana scrup.i. mi-
sceantur, & fiant errhina, ut dictum est. Possunt etiam
fieri e succo iridis, cum succo helenij.

Sternutamentum cientia.

Recipe piperis, pyrethri ana drach.ij. fiat pul-
uis, qui in nares immittatur. Potest etiam fieri de
puluere radicis ellebori albi pulueratæ.

Gargarismus.

Recipe hyssop. manip. i. saluie, thymi ana manip.
ß. Decoquantur in .s. q. aquæ ad tertias. Deinde acci-
pe iuris decocti lib. i. oxymel. scillitici. unc. iij. miscean-
tur, & fiat gargarismus, quo utatur ægrotus manē
uentriculo uacuo.

Cere

Cerebrum hæc roborant sumpta.

Recipe electa. diamoschi dul. aut pliris cum moscho, aut diamb.unc. ij. fingantur orbiculi, aut morsuli in rhombi formam pro egrotantis arbitrio, de quibus unum sumat tribus horis ante post pastum quater per hebdomadam, quo deglutito, bibat parum scillatitij liquoris, aut succi mellissophylli. Tempore uerò calido, semel in hebdomada sumat. drach. i. theria. ueteris, manè sex horis ante pastum. Nec temere dictum est sumenda esse supradicta electaria quater in hebdomada: nam si quotidie sumerentur, parum prodesse, ut quæ fierent nutrimentum potius, quàm medicamentum, propter assuefactionem.

Cerebrum hæc roborant admota.

Recipe Milij torrefacti partes tres, salis communis torrefacti partem unam, de panno lineo raro fiant duo sacculi, in quibus illa concludantur, & calidè capiti applicentur manè ante pastum alter post alterum, idq; fiat per horam. Aut fiat sacculus in modum pileoli, ubi hæc quæ sequuntur insuantur.

Recipe melissoph. beton. sampsuchi, uerbenæ, pulegij. ana manip. ß. cocci infectorij, drach. ij. mace ros, drach. i. absinthij sicci, manipul. ß. florum stœchados, florum roris marini, ana p. i. ß. radicis cappar. drach. ij. hæc diligenter trita in panno sericeo, rubro, & raro insuantur, fiatq; in modum pileoli, qui nocte dieq; duos aut tres menses feratur. Perseuerante autem dolore cum intemperie frigida, irrigetur pileolus stilatitio uini liquore. Potest & epithema ex solo stilatitio liquore uini fronti admoueri.

Cephæ

DE MORB. INTER. CVR.
CEPHALALGIAE VENTRICVLI

uitio ortæ Curatio. Caput. V.

Causæ.

COaceruatur nonnunquam acris quidam humor,
et tenuis in ore uentriculi, à quo uapores prauī
excitantur, sursumq; ad caput feruntur, unde fit
hic dolor. Sunt plerunque humores hi biliosi, quòd bi-

signa.

lis flaua sua leuitate promptè efferatur. Dolor mordax
cum nausea in ore uentriculi sentitur, simul cum capitis
dolore. Quòd si diutius in edia tulerit, augetur illius hu-
moris malitia, prauitasq; tuncq; magis dolent: sumpto
autem cibo mitigatur dolor, plerunque etiam sedatur.

Curatio.

Curandi ratio auspicanda ab humoris concoctione.

Recipe Serapij rosa. de rosis siccis, serapij de ompha-
cio, serapij de succo intybi satiui latioris, ana. unc. i. ß.
stillatitiorum liquorum, oxalidis, absinthij, cichorij,
ana unc. iij. Misceantur, et à ieiuno unc. iij. diluculo bi-
bantur per triduum. Recipe Electa. trium santalo.
unc. ß. utatur cum serapijs. Recipe Myrobala. flaua-
rum. drac. ij. rhabar. selecti. scr. iij. oxiphænicon. unc.
ß. macerentur in stillatitijs liquoribus intybi satiui la-
tioris horis. xij. diem ualide exprimantur, et colentur, et
adiectis serapij rosac. purgatorij. unc. ij. fiat potio pur-
gans, quæ sumatur finitis serapijs hora quarta à media
nocte. Recip. Conser. ros. unc. ß. sumat postridie manè.
Infestante dolore, uentriculo per inediam uacuo, suma-
tur frustulum panis intinctum citranguli succo, aut in
omphacio. Idem præstabit malorum granatorum suc-
cus, si de eo quantum uulgare cochlear capit, hauserit.
Curatur etiam hic dolor uomitu, præsertim si ægrotus
ad uomitum procliuis sit, cui tunc solus aquæ tepidæ
potus

potus ad uomitum prouocandum est satis: si uerò egrè uomat, ualidioribus uomitum laceffentibus opus erit, Oritur autem hic dolor nonnunquam non à calidis, de quibus dictum est, sed à frigidis humoribus, pituitosis, aut acidis, aut falsis, sed hi magis in uentriculi amplitudine, quàm in ore continentur. Porrò hic dolor omnium facillimè curatur, quòd hi humores, facile ad intestina detrudantur.

Recipe pil. de hiera simpl. pil. asaiet. ana. drach. i. ß. agar. in pastillorum formam redacti. drac. i. Cum mcl. ro sacco è drach. fingantur pil. vi. de quibus sumantur tres, bis in hebdomada, hora una ante coenam. Pro pil. de hiera sumi possunt pil. alephang. atque hæ acillæ interdum sumantur à laborante, cum lectum ingredi uolet, duabus non minus horis à coena. Prohibendi sunt etiam uapores ne à uentriculo ad cerebrum attollantur, quod sic commode fieri poterit. Recipe Coriandi præparati unc. iiij. anisi, fœniculi, cinnamomi optimi. ana. unc. iiij. pul. diacydonites siue speciebus. drach. iiij. ß. maceros. scrup. ij. sacchari ad pondus omnium, fiat puluis, qui sumatur statim à pastu, potusq; sumpto puluere in longũ tempus differatur prætereà os uentriculi roboradum, firmandaq; ipsius uentriculi concoctrix facultas. Recipe Pul. aromat. ros. maiora ex descriptione Gabrielis, pul. diamoschi dul. ana. drach. i. ß. corticis citri saccharo conditi, conser. ros. ana. drach. ij. sacchari dissoluti in stillatitijs, liquoribus absinthij et melissophylli. q. s. fingantur morsuli in rhombi formam, sint autem singuli ponderis drach. ij. ß. Sumatur unus diluculo horis quatuor ante pastum quater per hebdomadam. Negligenda quoq; non sunt localia præsidia.

Recipe Cerati Gal. emendantis uitia stomachi, olei

B nardini.

DE MORB. INTER. C V R.

nardini. ana. unc. ij. misce, iungatur regio uentriculæ
ludè manè & uesperè ante pastum.

CEPHALALGIAE A PITUITA

per proprietatem cerebri Curatio.

Cap. VI.

Flt etiam nonnunquam dolor capitis à pituita per pro-
prietatem cerebri, qui curatur iniectione oleorum
quæ mox dicentur, in nares & aures. Recipe Iasme-
lei, olei nardini, ana. unc. ij. Inijciantur gutte duæ tepe-
dæ in nares, & aures. Quòd si dolor ualde diuturnus
fuerit, nec prædictis curetur: excitentur uesicæ post au-
res in parte inferiore. Recipe Cantharid. abscisis
capitibus & alis. iij. redigantur in puluerem, miscean-
tur cum fermento, & aceto forti, fiatq; in conspersio-
nis modum, quæ applicetur post aures in parte inferio-
re, ibiq; maneat per diem & noctem, donec uesiculæ exi-
stant. Si autem ualidus id efficere uolueris, misce iam dic-
ta cum melle anacardino. Vbi autem uesicæ extiterint,
rumpantur, illisq; superponatur folium brassicæ, ibiq;
hæreat, donec quicquid est aquei humoris expulsus fue-
rit. Cum autem uesicæ locum curare, exiccareq; uolueris,
ungatur unguento albo Rasis caphurato. Possumus etiam
uti, si res postulet, cauterio hoc, quod accipit calcis ui-
uæ. q. v. misceatur cum sapone, melle, & succo asphode-
lorum. Applicentur autem loco dicto.

CEPHALALGIAE MELANCHOLICAE

Curatio.

Cap. VII.

Huius doloris & causæ, & signa posteriùs dicentur
in capite de melancholia. Curandi ratio initium
sumat ab euacuatione excrementorum communium.

Recipe

Recipe Maluæ, altheæ, uiolar. linozostidos, stœchados Arabi. maioranæ, ana manipul. unum. Coquantur in .s. q. aquæ ad tertias, deinde exprimantur, & colentur, accipianturq; iuris illius decocti lib. i. ß. cas. recens extractæ, saccha. semel duntaxat cocti. ana. unc. i. cathol. drach. vi. mel. uiolacci. unc. i. ß. olei commu. unc. iij. fiat enema, quod ante pastum immittatur. Quod si enema displicuerit, sumat potionem sequentem. Recipe Pruna damasc. x. uuarum passarum detractis uinaceis. unc. ß. stœchados Arab. trium florum communium ana. pug. unum. ß. polyp. quer. folliculorum sennæ ana. unc. ß. oxyphœnicon. drach. vi. Coquantur in sufficienti. q. aquæ usque ad dimidij absorptionem, dein accipe huius decocti. unc. iij. cas. recens extractæ unc. i. serapij uiol. serapij stœchados ana. unc. ß. Commistis omnibus, fiat potio, quæ sumatur diluculo horis quatuor ad summum ante pastum: nec in longius tempus differatur sumptio cibi. Quo die enema immissum fuit, aut postridie quàm potionem sumpsit, si ægrotus iuuenis fuerit, colore subnigro, apparueritq; plenitudo uel mediocris, incidatur uena interna brachij dextri, sanguisq; mittatur ad unc. iij. præsertim si fluens sanguis niger sit. Deinde concoquatur humor melancholicus in hunc modum. Recipe Serapij uiolacci, serapij stœchados, oxymel. scillitici ana. unc. i. ß. Stillatitorum liquorum melissophylli, buglossi, lupi salictarij ana. unc. iij. pul. diamoschi dul. drac. i. misceantur, & ab ægro tante ieiuno bibantur triduo unc. iij. circa diluculum. Id quod altero triduo repetetur.

Aut utatur apozemate sequenti.

Recipe Corticis rad. cap. y. rad. com. maceratarum in

B 2 aceto,

DE MORB. INTER. CVR.

aceto, ana. unc. β. mellissophylli, sampsuchi, buglosi integri, extremitatum lupi salictarij, ana. M. i. v. herbarum capillarium, an. M. β. uuarum passarum detractis uinaceis. unc. i. florum stœchados Arab. trium florum com. an. P. i. thymi manipul. sem. folliculorum sennæ unc. sem. polyd. quer. unc. i. sem. Concoquantur in. s. q. aquæ, donec dimidium absumatur, deinde exprimantur, & colentur, iuris decocti accipiantur lib. ij. & saccharo semel duntaxat cocto. q. s. adiecto, dulce reddatur, depuretur, & adiectis scrup. iiij. pul. diamoschi dul. & drach. i. nucis moschatæ, sapore suauiore, odoreq; gratiore fiat. Bibat egrotus diluculo. unc. iiij. diebus sex.

Potio purgans.

Recip. chatol. drach. vi. antidoti hamech. drach. iiij. serapij uiolacei, serapij stœchados. ana. unc. sem. cas. unc. sem. excipiantur uncijs quatuor apozematis superscripti, fiatq; potio purgans, quæ sumatur ad auroram. Toto uerò eo die domi se contineat. Hora autem quinta à positione sumpta, sequens lotorium bibat. Recipe Saccha. semel duntaxat cocti unc. sem. cum iure ciccrum rub. misceatur. Recipe Mitrid. drach. i. conser. buglos. drach. ij. misceantur, & sumantur postridie mane. Quod si Mitrid. displicuerit, fiat in hunc modum. Recipe Conser. buglos. unc. β. pul. diamoschi dulc. scrup. β. sumat ut dictum est.

Aut in forma pilularum.

Recipe pil. ind. drach. i. pil. cocci. scrup. i. cum stillatio liquore melissophylli, fingantur pil. v. sumantur ad dimidium noctis, obseruenturq; omnia suprascripta.

Aut in forma boli.

Recipe

LIBER PRIMVS. 11

Recipe Cas. recens extractæ, cathol. ana. unc. ß. anti
doti hamech. drach. iiij. cum saccaro fiat bolus, sumatur
hora quarta à media nocte, cæteraq; obseruentur su-
prà. Præterea apophlegmatismis, gargarismis, sternu-
tamentum cientibus, & sacculis utendum: ut in Capite
Cephalalgie pituitosæ dictum. Porro apophlegmati-
smi magis ex usu erunt, si de succo maioranæ, aut eius
decocto fiant. Fricationes quoque ad reuellendum fa-
ciendæ, & affigendæ cucurbitule, ut supra est dictum.
Sumendæ præterea quotidie, cum aliud non sumitur,
electuarij solidi diamoschi dulc. drach. ij.

CEPHALALGIAE A GALLICO

morbo Curatio. Cap. VIII.

IN festat hic dolor magna ex parte anteriorem capi- signa.
tis partem, & tempora, nonnunquam etiam poste- Curatio.
riorem. Curandi ratio statim auspicianda ab enemate
molliter reuellente, ne tanta & uaporum, & humo-
rum copia ad caput efferantur. Recipe Maluarum,
mercurialis, betæ ana. M. i. furfuris frumenti, cha-
mæmeli, ana. M. ß. calaminthæ, maioranæ, ana tertiam
partem. M. i. Decoquantur in s. q. aquæ usque ad sextæ
partis consumptionem. Exprimantur, & colentur.
Deinde accipiantur iuris decocti libr. i. ß. casia. unc. i. ß.
sacchari semel duntaxat cocti, mellis à spuma pur-
gati, ana. unc. ß. benedictæ laxat hieræ Archigenis. ana.
drach. ij. olei antiqui. unc. ij. butiri ueteris. unc. i. salis
fossilis. drach. i. Misceantur omnia, fiatq; enema, quod
immittatur ante pastum. Deinde concoquatur hu-
mor. Recipe Serap. conseruat. acori. serapij, fumarie,
serapij buglos. ana. unc. ij. Stillatitiorum liquorum

B 3 chamae

DE MORB. INTER. CVR.

chamæpityos, melyssophylli, lupi salictarij, buglossi, ana. un. iij. misceantur, et à ieiuno diluculò bibantur per quatrimum. Rec. electar. dianoschi dul. un. ß. utatur cum serapijs. Vbi herbarum copia fuerit, præstiterit hoc apozemate uti. Recipe radicis acori, glycyrrhizæ. ana. unc. i. quinque radi. com. maceratarum in aceto, & uino albo an. unc. sem. melyssophylli, betonicæ, summitatum lupi salictarij, fumarizæ, buglossi integri, cirsi ana. manip. unum. hermodactylorum unc. sem. uuarum passarum detractis uinaceis unc. i. trium florum com. florum roris marini. ana. pugil. unum. thymi drach. tres, foliorum sennæ unc. sem. polypodij quer. unc. i. ß. Decoquantur in. s. q. aquæ donec dimidium absumatur, dein exprimantur, & colo transfundantur. Accipiantur iuris decocti colati unc. uiginti, quæ saccharo dulces reddantur, adiectisq; cinnamomi selecti drach. duab. & pul. diarrhodi abb. drach. una, reddantur iucundioris & saporis, & odoris. Sumatur à ieiuno. unc. iij. diluculò diebus quinque.

Potio purgans.

Recipe pruna damasc. xij. glycyrrhizæ, expurgatæ, oxyphœnicon, uuarum passarum detractis uinaceis, uiolarum. ana. unc. ß. hordei pugil. i. seminum anisii, & fœniculi. ana. drach. ij. polypodij quer. unc. ß. foliorum sennæ, unc. i. ß. hermodactylorum drach. ij. Decoquantur in. s. q. aquæ fluuiialis, aut fontanæ usque ad dimidij consumptionem. Dein accipe huius decocti. unc. iij. cathol. drach. sex. compositionis hamech, diaphœnici. ana. drach. ij. serapij buglos. unc. i. ß. Commistis omnibus fiat potio purgans, quæ detur hora quarta à media nocte.

He. Eo die domi se contineat, & post horam nonam bibat lotorium sequens. Recipe Sacchari semel duntaxat cocti, unc. sem. cum iure cicerum rub. fiat lotorium. Recipe Theria. ueteris, drach. unam. conser. buglos. drach. duas, misceantur, & sumantur postridie, sex horis ante pastum.

Aut purgans pilulis.

Recipe Pil. foetidarum, pil. indarum. ana drach. sem. excipiantur stillatio liquore melissophylli, fiantq; pilul. v. quæ sumantur circiter noctis dimidium, aut cum primum experrectus fuerit. Cætera deinde ut supra fiant. Vbi autem quieuerit tres aut quatuor dies, utatur decocto sequenti. Recipe Scobis tenuissimæ ligni sancti libr. i. decoquatur in lib. quatuor aquæ fontanæ, usque ad dimidiæ partis consumptionem. Cum autem ad de decoctionis terminum propè accesserit, addatur melisso-phylli, betonicæ, chamæpityos, buglossi integri, fumaricæ, lupi salictarij summitatum. ana. manipul. unum. Iuris huius decocti. unc. vi. bibat dies quatuor, hora quinta matutina, & prouocetur sudor (ut humores, qui hucera plerunque cicatrice obduci prohibent, qui in totius corporis ambitu sunt, nedum capitis, discutiantur) qui quidem accuratè abstergetur. Quod si egroto post epotum hoc decoctum somnus obrepit, dormire licebit. Herbae autem illæ, quæ decocto ligni santi admiscuntur, ligentur, ne se scobi commisceant, ab eaq; ut facile segregari queant. Rursumq; scobs illa, detractis herbis, coquatur in sex libris aquæ fontanæ usque ad tertiæ partis absorptionem. Et hoc secundo decocto utatur reliquo tempore quoties sitiet: cui poterit adijci modicum uini, si

B 4 quidem

DE MORB. INTER. CVR.

quidem debilis ualde fuerit egrotus. His perfectis, topi-
cis praesidijs utendum. Recipe emplastri nobilis ab Io-
anne de Vigo compositi lib.ß. emplastri filij Zachariae,
emplastri de meliloto, emplastri diuini, emplastri cero-
nei, emplastri diachyli, cui iris adiecta sit, ana unc. tres,
farinae seminis lini, farinae fœnogreci ana unc.ß. bdel-
lij, ammoniaci dissolutorum in oleo de lil. ana drach.
tres, croci drach. sem. adiecta terebinthina. q. s. commi-
sceantur, & ex omnibus fingatur massa emplastri, ma-
gdaleonem appellant, de qua sumatur. q. s. ut super alu-
tam extendendo fingatur pilcolus, qui capiti superpo-
natur, nec inde auellatur, nisi sedato dolore. Nectan-
tùm id capiti fiat, sed et alijs corporis partibus, si qua sit,
quæ ob hunc morbum dolore infestetur. Interea singulis
hebdomadis utetur catapotijs sequentibus. Recipe Pil.
asaieret, agarici in pastillorum formam redacti, ana
drach. ij. pil. fumarie, pil. sine quibus ana drach. i. her-
modactylorum scrup. iiij. mastich. scrup. i. myrobalano-
rum flauarum, myrobalanorum caerulearum confrica-
tarum ol. amygd. dul. ana drach. i. cum serapio conser-
uationis acori fingatur globus, qui diuidatur in drach.
& singulae drachmae, in pil. vi. de quibus tres sumet sin-
gulis mensibus ter, horis quatuor post coenam fruga-
lem, & tenuem. Tempore quoque frigido proderit agro
to non mediocriter sumpsisse drach. unam, theriacæ ue-
teris cum drach. i. sem. conser. bugloss. sex horis ante pa-
stum singulis hebdomadibus semel. Conducat etiam plu-
rimùm, si quid aliud, sequenti uti enemate singulis men-
sibus, quater, usq; ad perfectã huius affectus curationem,
quod & humores, & uapores, qui sursum efferuntur, et
iam

iam elati sunt, qui sanè doloris sunt in causa, reuellet:
 & pharmaci solutiui uicem deplebit. Recipe Mala-
 uarum, linozostidos, helxines, origani, calaminthæ,
 betonica, rutæ, melissopyhlli, saluæ, ana manip. unum,
 hyssopi, pulegij, ana manip. sem, seminum anisi, fœnicu-
 li, cumini, ammeos, ana drach. ij. centaurij minoris mani-
 pul. i. polypodij quer. drach. vi. agarici, medulle colocyn.
 ana drac. ij. foliorum sennæ scr. iij. florum stœchados flo-
 rû rorismarini, florum chamæmeli, ana. p. i. Decoquatur
 in. s. q. aquæ, donec dimidium absumatur, deinde colen-
 tur, & recipientur uiris decocti unc. xvi. hieræ picræ,
 benedictæ laxatiuæ an. unc. ß. compositionis indi maioris
 dra. iij. diaphœnici dr. i. succi betæ un. i. mel. ros. colo trans-
 fusi un. i. ß. olei chamæmeli, ol. rutæ, ol. anethi, ana unc. i.
 salis fossilis drach. i. ß. Commistis omnibus fiat enema,
 quod ante pastum immittatur, cæterisq; enematibus
 diutius ab ægrotante retineantur. Utetur præterea ægro-
 tus sequenti compositione quotidie, uno tamen aut al-
 tero die p hebdomadâ prætermisso. Reci. conseruæ acori,
 cōseruæ radice bugl. ana un. ij. ß. pul. diamoschi dul. drac.
 ij. pul. diarrhodi abb. pul. rosatæ nouelle, ana drac. i. ß. pul.
 diamargar. frigidi drachm. unam, excipiantur serapio
 conseruatiuo acori, fiatq; electarium molle. Magnæ au-
 tem auellane magnitudo indicabit quantum de hoc ele-
 cta. sumpturus sit ægrotus, duabus aut tribus horis an-
 te pastum matutinum.

SCOTOMATIS CVRATIO.

Cap. IX.

Est autem scotoma, morbus, quo hebescant ægro-
 tantis oculi, ipsisq; tenebræ obuersantur. Fit au-

B s tem

DE MORB. INTER. CVR.

Victus
ratio.

tem interdum cerebro primogenia affectione laborante,
interdum quia ori ventriculi consentit. Vtriusque &
causas, & notas qui fusius scire uolet, legat Galenum in
Tertio de locorum affectorum notitia. Quod ad uictus
rationem attinet, agrotus aerem deuitet nebulosum, &
crassum, in puro, lucidoq; commoretur: paroxysmo tamen
ingruente, præstabit ipsum in aere obscuro, & quieto collo
cari, ubi spiritus & uapores moti facilius ad quietem de
ducuntur. Boni succi cibis, & concoctu facilibus ut a
tur, qui flatu (quod faciunt herbae, et legumina) minimè
gignant, quales sunt caporum, perdicum, phasianorum, ui
tulorum, piscium saxatilium carnes, oua quoque sorbilia,
& alia id genus multa. Cane peius & angue ea oderit
omnia, à quibus uapores sursum feruntur, ut sunt species,
allia, cepæ, porri, sinapi, acetum, & quæ simili sunt facul
tate prædita. Vinum bibat album, tenue, & oligopho
ron. Animi perturbationibus prorsus uacuuus sit. Res
non intueatur, quæ in gyrum rotantur, aut celeriter mo
uentur. Hæc enim malum hoc exasperant. non in præci
pitij ambulat, neque in profunda conijciat oculos. Exer
citium mediocre utile, per horæ dimidium ante cibum. In
terdiu à cibo ne dormiat, noctu lectū dormiturus non acce
dat, ante horam à coena secundam. Si hic affectus à pleni
tudine fuerit, curatur ut Cephalalgia sanguinea. Si à bi
le, ut Cephalalgia biliosa. Si à pituita, ut Cephalalgia pi
tuitosa, nisi quod subtiliantia à principio non sunt exhi
benda. Fiet igitur in hunc modum. Recipe Oxymel.
simplic. unc. ij. mel rosacei colati unc. i. ß. Stillatitorum
liquorum betonicae, buglossi, melissophylli. ana. unc. iij. mi
sceantur omnia, fiatq; in zupapij modum, quod depuretur,
&

Curandi
ratio

Et adiecta drach.i.nucis moschatæ suauiore reddatur & odore, & sapore. Cum serapijs aut apozematibus aromata ad saporem iucundiores efficiendum adijcimus, electaria solida non exhibemus: sin minus, contra. Si tollatur igitur de præcedenti serapio nux moschata, cum eo sumatur unc.ß.elect. solidi. diamoschi dulcis, quòd in rhombi fingere solent figuram. Cætera omnia fiant, quæ dicta sunt in Cephalalgia pituitosa demptis errhinis, quæ in hæc mutabuntur. Recipe Succu maioranæ unc.iiij. aut tantundem iuris decocti eiusdem, quòd tepidè ieiuno uentriculo naribus attrahetur.

PHRENITIDIS NON VERÆ

Curatio.

Cap. X.

Phrenitis non uera non proprie morbus est, sed morbi alterius symptoma, puta febris sanguinæ, aut biliosæ, aut quorundam abscessuum, quos grauissimæ febres commitantur. Fitq; à uaporibus putridis, ad humores calidis resolutis. Cognoscitur hic affectus febre, uigilijs, mentis alienatione. Et nisi accuratè illi succurratur, ueram phrenitidem plerunque parit. Frequens est in febribus paulò antè dictis hora crisis. Crisim tamen interdum præuenit, & cum ipso morbo ingrauescit. Vehementior itaque est in febris augmento, & statu, quàm in principio, & die exacerbationis, quàm quietis. Cæterum tutius ei est quietis hora mederi, quàm paroxysmi. Curandi ratio in primis respicit morbi depulsionem, unde originem trahit. Interea tamen & illi occurrendum, & primum materiæ communes educantur.

causæ.

signa.

Curandi ratio.

Recipe cas. recens extractæ, sacchari semel duntaxat cocti. ana. unc.i. olei uiolacei. unc.iiij. cum lib.i. & semisse deco-

DE MORB. INTER. CVR.

decocti herbarum, quas remollitius appellant, addendo foliorum lactucae, & cucurbitae, ana manipuli semissem, fiat enema, quod immittendum ante pastum, eoq; utetur quoties sua sponte excrementa alius non deiecerit. Capiti admouenda sunt in ipso statim principio uapores repellentia. Recipe Olei rosacei uncias tres, aceti unciam unam. Misceantur & fronti tepida applicentur.

Aut sic.

Recipe Stillatitij liquoris rosar. uncias iij. olei omphac. rosacei. unc. i. β. aceti unciam unam. Misceantur, & fronti tepida admoueantur. Ad conciliandum autem somnū, ubi insomnis permaneret, ungatur unguento populeo. Quod ubi non satis esset, addatur unc. i. unguenti populei scrup. i. β. opij, & ungatur. Proderit etiam plurimum & brachiorum, & crurum lotio in hunc modum. Recipe foliorum salicis, foliorum uitis, foliorum lactucae, florum nymphaeae, ana. M. ij. ros. rub. P. iij. Decoquantur in aqua, & decocto lauentur brachia & crura. Quod si haec somnum non conciliauerint, utatur potione sequenti. Recipe, serapij de papauere unc. i. β. stillatitij liquoris, lactucae, uel nymphaeae. un. iij diamargariti frigidi. scrup. i. Misceantur, et bibatur cum lectū dormiturus ingreditur. Perseuerante phrenitide hac non uera, ubi uapores iā fluxerint, resoluentia cum repellētibus admista admoueantur in hunc modum. Recipe ol. rosacei, ol. chamemeli. ana. unc. i. β. aceti unc. i. Misceantur & tepida fronti applicentur. Horum loco, cum certē phrenitis hac remittitur, catulus per tergum incisus, detractis intestinis, calidus uertici

tici admoueat, ad partem anteriorem declinando. Quem ubi refrixisse senseris, aquæ calide immerge, sicq; calefactum rursum admoue. Idem præstat arietinus pulmo calidis, aut pullus, pullæue, itidem à tergo incisa.

Et ad somnum conciliandum, si hoc quoque tempore uigiliæ molestæ sint, aspergatur puluis seminis papaueris albi super ægroti caput, & per catuli exenterati interiora, deinde admoueat, ut dictum est. Pretereâ reuulsiones fiant fricationibus brachiorum, & crurum, & cucurbitulis sine scarificatu affixis spatulis, & natiuis. Potissima autem cura sit in curando morbo, qui huius phrenitidis causa est. In hoc affectu, illud memoriæ mandandum, topica nulla adhibenda esse remedia capiti, si sit rheuma, uel humorum multitudo deorsum fluentium.

PHRENITIDIS VERÆ

Curatio. Cap. XI.

Tres phrenitidis species Libro quarto de Affectuum locorum notitia à Galeno scribuntur, quæ magis ad phrenitidem non ueram pertinent. Est alia phrenitis cerebro ipso propria, primariaq; affectione laborante, quæ est morbus acutissimus, symptomata grauissima inuehens, quæ, ut ait Galenus libro de Symptom. Causis, est cerebri, aut eius meningum inflammatio. Oritur autem aut ex sanguine exuperante, aut ex humore bilioso cerebrum, aut eius meningas occupante. Quibus sanguis morbi in causa est, hi cum risu insaniant: quibus uerò bilis mali huius author est, immanite rinsaniant, seuiuntq; ut eos uinculis cohibere sit necesse: præsertim si bilis perusta fuerit. Priusquam autem inualescat, hæc signa præcedere solent. Quæ dicunt,
quæue

DE MORB. INTER. CVR.

quæ faciunt non meminerunt, abolita memoria. Febris continua cum amentia comitatur, præterea uigilia, somni, difficiles, & interdum turbulenti, ut exurgant ægroti exilientes, et furibundè uoci ferantes, uerba nullo ordinè nulloq; sensu loquētes. Interrogati nihil appositè respondent, & qui sani mansuetissimi fuerant, nunc furibundo quodam tumultu uerba effundunt. Quum uerò proximè ad phrenitidem accedunt, oculos sæpe perfricant, cruentos, & squallidos, quos tamen nonnunquã habent aridos, nonnunquã lacrymantes. Lingua actu aspera percipitur, atq; è naribus aliquãdo destillat sanguis. Floccos auellere, & festucas è uicinis stragulis carpere uidentur. Pulsus illis exiguus, & languidus, sed quodam modo durus. Spiratio magna, & ex longis interuallis. Phrenitis non uera magna ex parte uerã antecedit, hoc est, in principio mitis adhuc est, paulatim enim per cerebri affectũ phrenitis euenire solet, cùm morbi pars iam genita est, pars adhuc gignenda. Quo quidem tempore danda opera ut genita materia resoluendo et uacuãdo curetur, gignenda sublata causa prohibeatur. Actedẽdum igitur ipso statim principio adhuc morbum curandum, ne absoluta inflammatio fiat, quæ si iam est, in ancipiti est salus. Augeri autem materia primũ uictus ratione prohibeatur.

**Victus
ratio.**

Sit igitur uictus tenuis, qui refrigeret, et astringat. Cibibus itaq; erit ptisanæ cremor. hinc tamen ubi largiore cibo assueuimus, ne ægrotum fame enecuisse medicus insimuletur, hor. farina aqua cocta concedetur, addito aut omphacio, aut citreorum, aut granatorum succo, aut simili, qui humores densare, ac cogere possit, ut ægrius ad caput ferri ualeant. Olera quoq; quæ refrigerare, atq; humectare sunt

sunt idonea, ut intybus lactuca, malua, et quæ simili sunt facultate prædita, cōcedantur. Potus sit hordei decoctum cum serapio nymph. aut uiol. aut rosaceo, qui per interualla tamen, non confertim exhibendus est. Viribus autē debilibus, uentriculoq; natura imbecillo, ac frigido, ubi quidem se febris uehementia remisit, uinum oligophoron, aqua dilutum, non negandum: præsertim si sani uinum bibere consueuerint. Quiescat ægrotus, neq; huc, atque illuc moueatur, nam sic fatigatur, uiresq; atteruntur. Si igitur diues est, famulorum et domesticorum adminiculo retineatur: si pauper, uinculis. Corpore uacuato, eoq; arido, ac squallido existente, aquæ dulcis tepidum balneum conferet, quòd non ariditatem solùm, sed etiam immodicas uigilias, mentisq; alienationem, unà cum febre profligare potest. Animi perturbationes summoperè uitandæ: quare quæ aut mœrorem, aut bilem concitare possunt, prorsus auertenda. Gratißimi itaq; amici ipsum adeant, leniter, blandeq; alloquantur, non tamen intempestiuè interpellent, licebit tamen ubi opus erit, acerbius increpare. Quantum ad curandi rationem attinet, si nihil obstiterit, nullum salubrius, aut præsentius remedium, quàm sanguinem mittere. Incidenda igitur uena statim, nulla habita ratione aut temporis, aut horarum diei, etiam uentriculo pleno: prius tamen materiæ communes educendæ immisso enemate. Recipe Maluarum, helxines, linozostidos, betæ ana. m. i. foliorum lactucæ, foliorum cucurbitæ ana. M. ß. ordei. M. i. quatuor seminum frigid. maiorum ana drach. i. pruna. xij. Decoquantur in. s. q. aquæ ad tertias. Accipiantur iuris decocti. libr. i. ß. cas. recens extractæ, sacchari semel duntaxat cocti, ana. drach. i. ol. uiolacei

Curatio.

DE MORB. INTER. CVR.

violacei unc. iij. fiat enema, quo immisso, et emisso, quæcunque illius operatio fuerit, incidatur uena cubiti exterior. Si tamen plenitudo magna fuerit, uena cubiti interna prior incidatur: sex, aut septem horis post, aut postridie manè, externa. Tantum autem sanguinis educendum, quantum uires ferre poterunt, non tamen usque ad animi deliquium: & hoc in affectibus sanguineis, nam in biliosis, cum sanguis bilem cohibeat, & contemperet, multa sanguiniseductio bilem feruere, et furere permittit: paucus igitur in hoc affectu, cum biliosus est, sanguis uacuetur, auersionis duntaxat, & transpirationis causa. Si uerò aut ætas, aut uires, aut aliud quidpiam uenæ sectioni obstiterit, tunc cucurbitulae ceruici & omoplati cum scarificatione admouendæ, nam ad cerebrum humorum defluxum in contrarium auertent. Poterunt etiam affigi his, quibus uena secta fuit, sed sine scarificatione. Non absurdum erit postridie, quàm uena secta fuerit, pharmacum solutiuum sumere, quòd soleat sanguis in bilem mutari. Recipe cas. recens extractæ un. i. serapij violacei unc. ß. cum aqua fructuum Mesuæ fiat potio, quæ sumatur horis quatuor ante prandium.

Aut sic.

Recipe rhabar. selecti. drach. i. ß. macerentur concisa minutatim in stillatitio liquore intybi fatiui latioris, per noctem, dein exprimantur, & colentur, & adiectis serapij rosacei laxatiui de infusione rosarum unc. ij. fiat potio purgans, quæ sumatur matutino tempore horis quinque ante pastum. Proderit egroto sequenti electario uti, quòd mirè confert ad partium internarum calorem mitigandum. Recipe conser. rosarum, conser. nymphæ,

nymphaea, conser. bugloss. ana. 3. vi. diamargariti frigid.
3. β. coral. rubri. drac. i. fragmentorum com. preciosorum.
ana. 3. ij. seminis portulacae, seminis oxalidis, seminis
intybi satiui latioris ana. 3. β. bracteas auri, vi. sacchari.
q. s. fiat electuarium auro coopertum, quo utetur saepe
cum aqua cocta, aut cum aqua hordei, & sine aqua cum
uolet. Sitis in hoc affectu per quam molesta esse solet, cui
sic occurrendum. Recipe Serapij de succo citri, uel de
ribes. unc. v. utatur cum aqua cocta cum sitiet. Et cum
calor magnus est, ipsum a corde arcere oportet, epithema
mate infra posito. Recipe stillatitij liquoris rosa. lib.
β. stillatitij liquoris nymphaeae, stillatitij liquoris bu-
glossi, ana. 3. iij. omnium santalorum, coral. rubri, ana. 3.
i. caphurae, gra. ij. aceti (quod in pauca quantitate admi-
sceri debet, quoniam uigilijs infestantur) 3. ij. croci 3.
β. Misceantur, & fiat epithema, quo tepido regio cordis
linatur ante pastum. Confert etiam epithemate testiculos
refrigerare. Recipe stillatitij liquoris rosa. 3. viij. uini
albi 3. ij. omnium santalorum, ana. 3. i. fiat epithema, quo
testiculi linantur. Eandem ob causam lauentur crura, &
brachia in hunc modum. Recipe foliorum salicis, fo-
liorum arundinum, foliorum uitis albae uiniferae, rosa-
rum rubrarum, ana. q. v. Decoquantur in aqua, & deco-
cto lauentur brachia, et crura. Si uigiliae ualde infestent,
addatur cortex papaueris albi cum eiusdem semine. Ut a
capite quoque humores auertantur, non parum conferunt
uincula extremis corporis partibus iniecta, pedum item
& brachiorum fricationes cum sale, & aceto. Quoniam
autem perpetuis pene uigilijs infestantur, somnum hunc
in modum prouocabimus. Recipe syrup. de papauere,
C 3. i. β.

DE MORB. INTER. CVR.

℞. i. β. stillatitij liquoris lactucae, uel nymphaeae, unc. tres. pulueris diamargariti frigidi, scrup. i. Misceantur, & bibantur ab egroto ad horam somni. Quod ad remedia topica attinet, primo quidem die repellentia ad mouenda sunt. Recipe olei rosacei, uncias tres. aceti unciam i. Misceantur, & tepida fronti & temporibus applicentur: & propter uigilias si nimiae fuerint, adijcere licebit ℞. β. opij. Recipe unguenti populei, ℞. quatuor applicentur fronti, & temporibus. Quod si rheuma sit, aut humorum multitudo deorsum fluentium, non sunt adhibenda topica remedia capiti.

LETHARGI CVRATIO.

Cap.

XII.

Hic affectus Phrenitidi contrarius est. Nam in Phrenitide egroti in somnes permanent, in lethargo uero in expugnabilis est dormiendi necessitas. Fit ab humore pituitoso, praeter naturam sua frigiditate, & humiditate cerebrum, & maxime partem eius posteriorem imbuate, & in somnum impellente. Morbum hunc comitatur febris continua lenta, quoniam est a pituita, lento humore, putrescente. Pulsus lethargicorum rarus, magnus, & undosus. Spiratio rara, & imbecilla. Ad uociferationem oculos quandoque aperiunt, & mox claudunt, ad somnumque redeunt. Si quis uocem attollens eos interroget, respondent quidem nonnunquam, sed uix & tarde. Oscitant frequenter, & hiant ore, tanquam id claudere obliui, persistunt. Qui huic morbo obnoxij sunt, somnolenti, inertes, desidiosj obliuiofi, dementesque sunt. In cubiculo lucido, & tepido decumbant. Utatur cibis attenuantibus, exiccantibus, & incipienti

causa.

signa.

Victus
ratio.

dentibus, apio, aniso, cumino, cinnamomo, pipere, caryo-
phyllis, & similibus odoramentis, conditis. Vescatur
auiculis montanis, pullis gallinaccis, perdicibus, turdis,
alijsq; id genus. Inter olera, porris uti licebit, aspara-
gis, fœniculo, & ijs quæ sunt eiusdem facultatis.

Hydromeli bibat, aut uinum album, tenue, & oli-
gophoron: sit tamen subastringens. Celeriter huic
morbo, medendum, non propter aut necessitatem, aut
difficultatem, sed propter partis, quæ laborat præ-
stantiam. Si uires permiserint, nihilq; aliud obste-
rit, inuitò statim sanguinem mittere conducit, prius
tamen enema facibus eductis.

Curandi
ratio.

Recipe Maluarum, betæ, linozostidos, chamæmeli,
furfuris, ana. Manipul. i. Decoquantur in quantitate
sufficienti aquæ ad tertias, deinde colentur. Accipian-
tur iuris decocti sesquilibra, cas. sacchari semel duntaxat
cocti, ana. unc. i. mellis ros. col. sesquiuncia, olei commun.
uncie tres, salis communis drach. ij. Commistis omni-
bus fiat enema, quòd mox immittatur, & eo emissio, in-
cidatur cubiti uena humeralis, aut media, sanguinesq; ad
3. iiij. educantur. Postridie ante pastum enema sequens
paretur, & immittatur. Recipe Maluarum, origani,
calaminthæ, chamæmeli, centaurij minoris, ana. Manip.
i. agarici albi 3. iiij. colocynth. 3. ij. Decoquantur in s. q.
aquæ, ad tertias. Accipiantur iuris decocti lib. i. β. elect.
indi. maioris 3. iiij. diaphœnici 3. ij. (Et si ualde somno-
lentus fuerit, addatur hieræ Archigenis, aut hieræ Lo-
gadij, 3. i. β.) mel. anthosati 3. i. β. ole. com. & rutæ, ana. 3.
i. β. salis fossilis. 3. ij. Commistis omnibus fiat enema, ut
dictum est. Si forte immitti non posset, balani fingantur

C 2

in hunc

DE MORB. INTER. CVR.

in hunc modum. Recipe mel. comm. q. s. decoquatur perfecte, adiecta hiera picra, aut benedicta laxa. ℥. i. cum salis fossilis ℥. ij. balani magnæ fingantur, quæ filo ligatæ, & ole. rosa. irrigatæ immittantur in anum, & agitentur ad irritandam facultatem expultricem. Et hæ balani, aut enemata, repetantur. Non enim est satis illis semel uti. Post hæc eliciatur uomitus in hunc modum. Recipe seminis atriplicis, seminis anethi, seminis raphani, uel radicis eius, ana ℥. semissem. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absumat, accipiantur iuris decocti unguatuor, oxymelitis scillitici unc. ij. Misceantur & tepida bibantur ab ægroto. Si non sponte propter somnolentiam, sumpta ea potione uomat, penna intincta in oxymelite scillitico, cui sinapi admistum sit, in os immittatur, & circa palatum & fauces agitetur. Post tridie excitata natura, si salutis spes fuerit, ad noctis dimidium sumat pil. cocc. drach. i. Aut utatur potione sequenti. Recipe Diaphœnici drach. iij. elect. indi maioris scrup. iij. agarici in pastillorum formam redacti, infusi in oxymelite simpl. & stillatitijs liquoribus betonica, & melissophylli per noctem, & ualide expressi, drach. i. serapij stœchados, unc. sem. cum iure communis decocti medicinarum, cui additus sit sampsuchi M. semis, stœchados Arab. P. i. fiat potio purgans, quæ hora quarta matutina sumatur. Recipe theriacæ ucter. drac. i. confer. bugloss. drac. i. β. Misceantur, & sumantur post tridie manè, sex horis ante pastum. His peractis, non antè, exhibeantur errhina, gargarismi, & sternutamentum cientia, ut dictum supra in Cephalalgia pituitosa. Remedia quoque topica non prætermittenda.

mittenda. Recipe radicem scillæ sub prunis coctam, uel cape, deinde subigatur cum oleo irino, & pauco euforbij, fiat cataplasma, quòd occipiti applicetur. Ab ipso statim principio reuulsiones fieri debent, uinculis in partes inferiores iniectis, ipsarumq; fricationibus, & cucurbitulis primæ & secundæ uertebrae affixis, deinde natis, & partibus inferioribus. Probat Gal. oxyrrhodino in ipso principio occipiti admotum, ad depellendos à capite humores, quicunque fuerint, quòd posterioribus parum placet, nisi aliquid castorei admisceatur, quoniam materia frigida est, primoq; die transacto, ab oxyrrhodino abstinendum.

CARI PITUITOSI CVRATIO.

Cap.

XIII.

CAros, somnus est profundus præter naturam, obstructis meatibus supremi uentriculi cerebri, aut ab humoribus, aut crassis spiritibus, unde sensuum, & uniuersarum motionum sequitur priuatio, spirandi facultate illæsa manente. Differt in hoc ab apoplexia caros, quòd in apoplexia spiratio læditur, in caro nequaquam. Præterea apoplexiæ succedere solet paralysis, finito sopore, bona ualetudo magna ex parte subsequitur. Hoc quoque discriminis inter carum & lethargum, quòd caro laborantes tanta somni profunditate occupantur, ut quamuis stimulentur, et sentiant neque tamen oculos aperiunt, neque loquuntur: contra in lethargo. Præterea caros morbis comitialibus superuenit, & cerebri compressionibus, cerebro aut à cranio uentriculos anteriores comprimente, maximeq; medium coartato, aut meninge ambiēte anteriores ipsos ce-

Causæ.

signa.

C 3 rebri

DE MORB. INTER. CVR.

rebrī uentriculos compressa. Subsequitur etiam caros uehementiores febres, earumq; potissimum accessiones, quod propter uehementes dolores concidat robur spiritus animalis. Lethargus autem morbus est, propriam quandam semper consistentiam obtinens: febrisq; lethargum comitatur. Caros interdum proprius est, & primarius cerebri affectus, interdum est per consensum, aut totius corporis, aut uentriculi, aut matricis: interdum ab intemperie frigida, aut humida, sine materia. Cum est cerebri proprius affectus, aut est à larga sanguinis copia in capite, & tunc curatur ut Cephalalgia sanguinea, iisdemq; notis cognoscitur. Aut est à pituita, id quod ferè est, & tunc ut Cephalalgia pituitosa curabitur, aut ut Apoplexia. Præcedit autem capitis dolor, & grauitas. Curabitur etiam commodè sequentibus præsijs. In primis, si aluus astricta fuerit, hoc enemate laxetur. Recipe maluarum, altheæ, betæ, linozostidos, furfuris, an. M. i. florum chamæmelli. P. i. & dimidiatum. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. Recipientur iuris decocti libr. i. & dimidiata. cas. sacchari semel duntaxat cocti, ana. unc. i. mel. rosacei colati. unc. i. & dimidata, olei comm. unc. tres, salis triti. drach. ij. Commistis omnibus fiat enema, quo immisso, & emisso, non multò post iniiciatur sequens acrius. Recipe helxines, hyssopi, maluarum. an. M. i. & dimidiatum, origani, calaminthæ, centaurij minoris, sampsuchi, ana. Manipul. unum. agarici albi, seminis cartami, ana. unc. i. polypodij quer. unc. dimidium. stœchados Arab. P. ij. Decoquantur in s. q. aquæ donec dimidium tantum relinquatur. Recipientur iuris decocti libra una.

una. & dimidiata, diaphœnici. drach. vi. hieræ picræ Galeni unc. i. olei rutæ. unc. tres, salis fossilis unc. dimidium. Commistis omnibus fiat enema, quod inmittatur priore emisso, ut dictum est. hoc enemate utetur tribus prioribus diebus. At intercâ irritetur uenter ad uomendum, in hunc modum. Recipe seminis anethi, seminis atriplicis, seminis raphani, ana. unc. dimidium. Decoquantur: accipiantur iuris decocti. unc. v. oxymelitos scillitici unc. ij. Misceantur, & ab ægroto bibantur, qui nares post claudat, & dentes constringat. Deinde mox, si quidem expectectus uideatur, hieræ picræ. unc. i. in uno dissolutam bibat, aut pilul. coccia. drach. i. sumat. Postridie uerò drach. i. theriacæ ueter. conferuæ buglos. drach. i. ss. sumat ante diluculum, sex certè horis ante quemuis pastum. In ipsius morbi principio statim & brachiorum, & crurum fricationes fiant duræ & ualidæ: cucurbitulæq; & scapulis, & natibus sine scarificatione affigantur. Olfaciat iugiter ægrotus acetum forte. Purgato uniuerso corpore, errhina, gargarismi, & alia, quæ in capite de Cephalalgia pituitosa dicta sunt, exhibeantur, non ante. Magno quoque postremo usui erunt topica præsidia. Radatur igitur caput ablutum iure decocti sequentis. Recipe sampsuchi, beatæ, mellissophylli, foliorum lauri, florum chamæmeli, stœchados, helychrysi, pseudonardi, ana. q. s. Decoquantur in lixiuio, quo caput irrigetur, deinde radantur capilli. Fricetur deinde capitis pars & anterior, & posterior castor. unc. i. cum oleo rutæ mista. Nec hoc prætermittatur, quod plurimum quoque conferet.

Recipe Capillorum hominis. q. s. comburantur, de

C 4 quo

DE MORB. INTER. CVR.

quorum puluere recipiantur. unc. ij. castor. ʒ. dimidium. misceantur cum succo rutæ, in linimentiq; formam redigantur, quo caput, ubi ipsius partem & anteriorem & posteriorem ualide fricueris, lines. Denique olfaciat humanos capillos super prunas positos, qui ante aceto madefacti fuerint.

CARI PER CONSENSVM

totius corporis Curatio.

HOc plerunque contingit in pituitosis febribus, & tertianis nothis, in paraxysmorum principijs.

Fiant reuulsiones uinculis partibus extremis iniectis, quæ antè non segniter fricentur. Detur sepe olfaciendum acetum. Robur cerebro addatur oleo rosæ, & aceto, an. q. v. siue oxyrrhodino, fronti tepide admoto.

CARI PER CONSENSVM

uentriculi Curatio.

COgnoscutur ex præcedente uentriculi dolore. Irritetur uenter ad uomitum, ut suprà dictum est: aut hiera picra cum oleo epota. Quàm si nolit sorbere, penna in ea intincta fricentur fauces, & palatum. Quòd si non uomuerit, aut nihil uomitus profuerit, sumat hieræ picræ. unc. sem. cum iure decocti hyssopi. Si uiderimus unico uomitu materiam totam non fuisse uacuatam, repetatur. Cerebrum deinde roboretur applicando fronti tepide olei rosæ & aceti, an. q. v. Postremò prohibebimus uapores ad cerebrum effferri acris enematibus, fricationibus, & affixis cucurbitulis, ut suprà dictum est.

Cari

LIBER PRIMVS.
CARI PER CONSEN-

sum uteri, Curatio.

COgnoscitur quoque ex præcedente uteri dolore.
Utendum reuulsionibus, & balneis, euocandi men-
ses. Proderit & sanguinem è sophena mittere.

CARI A FRIGIDA, AVT

humida intemperie cerebri,

sine materia Curatio.

Compositionibus calefacientibus hic uti expediet,
tam sumptis, ut conserua acori, diamoscho dulci,
theriaca, compositione anacardina, & alijs eadem facul-
tate præditis: quàm admotis, ut oleis castor. spicæ, co-
stino, rutaceo, nardino, irino, chamæmelino, quibus pars
anterior capitis linatur.

EPHIALTAE CVRATIO.

Cap.

XIIII.

Dicitur hoc morbi genus Latinis Incubus, ab incu-
bando, quòd qui eo laborat, noctu graue pondus
sibi incumbere, supraq; se stare putat, respiratio-
nem opprimens, & uocem impediens, ab aliq; se inuadi
arbitratur. Quòd si quam tunc uocem emittat, indiscre-
ta, incertaq; est. Ex assidua cruditate uentriculi, & cra-
pula nascitur hoc mali; cùm præsertim ex hoc genit a
pituita crassa, et lenta, aut etiam ipsi cibi concoctu ad-
modum difficiles os uentriculi opprimunt, resupino iac-
cente corpore. Inde enim uapores frigidi, & crassi sur-
sum feruntur, posterioresq; cerebri uentriculos replent,
unde prohibetur animalis facultas per neruos diffundi.
Partes autem extremæ primæ hoc incommodi sentiunt,
spiritibus priuata torpent, uixq; mouentur: repit autem

causæ &
signa.

C S

paulatim

DE MORB. INTER. CVR.

paulatim sursum, destituunturq; deinceps cetera partes animali spiritu: tandem constringitur septum transversum, pectus, pulmo, cor, ad iustum modum non dilatantur, hinc suffocationis, & ueluti cuiuspiam ingruentis imaginatio. Anxij admodum, attenuatis tandem spiritibus, & discussis, meatibusq; apertis repente excitantur. Paruam esse epilepsiam inquit Galeenus, cui non subscribo, quod materia Epilepsiae causa uenata sit, in Incubo ueneni nihil est. Præterea Epilepsia non sine conuulsione fit, quæ in Incubo nulla est. Morbus hic pueris frequens, & ijs, qui cibis multis, ac pituitosis uictitant. Fit tamen nonnunquam à sanguine crasso, interdum à melancholico humore: à bile etiam crassiore, quam uitellinam appellant. Huic malo quamprimum occurrendum, nam si perseuerarit, grauius aliquod malum prænuntiat, ut Maniam, aut Epilepsiam, aut Apoplexiam: quod crassus humor in cerebris uentriculis sensim colligatur. Victus ratione tenui utantur, & cibis, qui flatu haudquaquam generent. Vino abstineant: si permittere fuerit necesse, sit oligophoron. Interdum ne dormiant. Sit duarum horarum intercaedo inter coenam et somnum nocturnum. In summa, nihil intersit inter rationem uictus horum, & eorum qui Comitiali morbo laborant, de quibus posterius. Si sit hic affectus à sanguine crasso, & multo, primum educantur materiae, ut loquuntur, communes aut hoc, aut simili enemate. Recipe casiae recens extractæ, sacchari semel duntaxat cocti, ana unc. unam, olei uiolacei, olei chamæmeli, ana. ʒ. i. ʒ. Cū iure communis enematum decocti fiat enema, quod ante pastum immittatur: quo emissio, sanguis

Victus
ratio.

Curandi
ratio.

de

de sophena ad uncias tres mittatur, postridie hora matutina opportuna ex humerali mittantur unc. quinque, et hoc quidem fiat, si neque uires, neque ætas, neq; aliud quidpiam obstiterit. Affigantur & cucurbitulæ crurum suris. His uerò accurate perfectis, si nihilo secius hoc uitij perseueret, secetur uena aut frontis, aut temporum, aut sub lingua. Post hæc prohibendi uapores, ne post pastum à uentriculo sursum efferantur, id quod fiet sumptis uncijs duabus carniū cotoneorum saccharo conditarum sine odoramentis. Si uires permiserint, nec uino, nec carnibus utatur ægrotus, solo hordei cremore contentus. Nec satis sit hæc semel fecisse, sed iterum, atq; iterum, si quidem perrexerit Incubus, repetantur, ne aut Epilepsiam, aut aliud quidpiam longè grauius inducat. Caterum si ab humore pituitoso, id quod ferè fit, oriatur, principio minuatur humor, morbi causa, antequam ipsius concoctionem adiuuemus. Recipe pil. de agar. pilul. cocci. ana. drach. ß. cum stillatitio liquore betonicæ fingantur pil. v. quæ ad dimidium noctis sumantur, aut ubi à somno excitatus ægrotus fuerit: eo die ne prodeat foras. Recipe iuris decocti cicerum rub. unc. sex, sacchari semel duntaxat cocti, unc. ß. Fiat lotorium, quo utetur hora quinta & dimidiata à sumptione pilularum. Recipe theriacæ ueteris drach. i. conser. bugloss. 3. i. ß. misceantur, & postridie diluculo ab ægroto sumantur, prandiumq; in sex horas differat. Deinde concoquatur humor. Recipe oxymel. simpl. 3. iij. scarpaj stœchados. unc. i. ß. Stillatitiorum liquorum betonicæ, absinthij, buglossi, ana unc. tres, seminis uel radicis peoniæ drachm. ß. Et adiecta drach. i. nucis moschata

DE MORB. INTER. CVR.

*schate iucundiore & sapore, & odore reddantur. Per tri-
dum à ieiuno appetente diluculo bibantur. Idem altero
triduo faciendum suadeo, si humor nondum satis coctus
appareat. Non sunt in hoc affectu stillatitij liquores ni-
mium incidentes, attenuantes, & meatus dilatantes exhi-
bendi, ne materia nimium attenuata, uapores exciten-
tur. Concoctis humoribus purgetur in hunc modum.*

*Recipe pil. cocci. drach. i. cum stillatio liquore melisso-
phylli fiant pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.
Postridie uerò theriacamumat, ut supra dictum. Humo-
re multo existente, qui non unica purgatione uacuetur,
unius aut alterius dici intervallo, rursum eo concocto pur-
getur egrotus. Utetur quoque enematis acris, quo-
rum formulæ ex superioribus petendæ sunt, ubi de Ce-
phalalgia pituitosa egimus. Corpore recens uacuato, uta-
tur errhinis, apophlegmatismis, sternutamentum cienti-
bus, gargarismis, quorum formulas supra posuimus, sin-
gulis autem per dies quatuor. Cerebrum deinde robo-
randum sumpta ʒ. i. theriacæ ueteris semel in hebdoma-
da. Cæteris diebus, quibus nihil aliud sumet, tribus ho-
ris ante cibum quater in hebdomadaumat conseruæ aco-
ritantum, quanta est castanea. Curet præterea electar.
diamoschi dulcis unc. ij. in rhomborum formam finge ne-
das, de quibus unumumat horis duabus à coena, lectum
ingressurus. Eodem quoque tempore sequenti pulucre
caput aspergat. Recipe corticis citri sicci, drac. tres,
cyperi, caryophyllorum, ana ʒ. ij. cocci infectorii, ʒ.
iij. coriandri præparati, ʒ. ij. ʒ. sampsuchi sicci, betonicæ
siccæ, ana drach. sem. stœchados Arabi. rosarum rub. an.
ʒ. ij. fiat puluis. Hic autem puluis mirificè confert ce-
rebro*

rebro à materia frigida affecto.

EPILEPSIAE CVRATIO.

Cap. XV.

Est autem Epilepsia, uniuersarum corporis partium conuulsio, non quidem perpetua, sed quæ ex temporum interuallis accidit, cum mentis & sensuum oblesione. Tripliciter hic morbus gignitur, aut enim cerebrum primogenia affectione laborat, aut gignitur propter consensum oris uentriculi male affecti, aut propter consensum cuiuspiam alterius partis. Fit à cerebro primaria passione laborante, crasso, frigido, & pituitoso humore, aut etiam crasso humore melancholico in cerebri uentriculis spiritus meatum obstruente, tuncq; cerebrum neruorum principium, seipsum quatit, ut quod noxium est excutiat. Hunc morbum antecedere solet tristitia, corporis animiq; inconstantia, cum motu minime uoluntario, obliuio, turbulenta somnia, capitis dolor, faciei pallor: lingua quoque inordinate mouetur, quam etiam nonnulli mordent. Qui hoc malo corripiuntur, statim concidunt, conuellunturq; plerunque stertunt, interdum uociferantur, tremunt alij, & circumaguntur, ex oreq; spuma emergit. Si cui hic morbus acutissimus fuerit, crebris accessionibus, & symptomatum magnitudine breui ipsum tempore iugulabit. Huic morbo pueri, quod humidiores sunt cerebro præ cæteris sunt obnoxii, deinde adolefcētes, hoc est, qui annum uigesimum quintum nondum attigerunt, post hos ætate consistentes, minime omnium senes. Morbus Comitialis qui ante pubertatem fuerit, si non adueniente pubertate curetur, aut mensium initio, aut dum uterum ferunt, ferè adusque

Causæ.

Signa.

DE MORB. INTER. CVR.

Videtur
ratio.

adusque uitæ extremum producit, nisi idoneis fuerit à medico curatus præsidij. Primum uictus rationem congruam constituere expedit, quæ calfaciat & siccet, si quidem morbus fuerit ab humore pituitoso. Cubiculum in quo morabitur ægrotus, si tale naturâ non fuerit alteretur igne luculento, suffitibus, cum caryophyllis, cortice citri, roremarino, sampsuco, salvia, stœchade, & alijs id genus. Cauendum tamen ne uaporum multitudo caput repleat, aut materiam exagitet. Cibus, quo uescetur, uaporosus ne sit, paucus sit, itidem & potus, præsertim in cœna, quòd ciborum copia uapores multi efferantur, accessione epilepticam, aliâq; capitis uitia irritantes. Legumina, & pisces uitentur, carnes quoque, demptis montanis auibus, & quæ eiusdem facultatis sunt. In primis uitentur caprarum grandium carnes, quòd excitandi, & detergendi Epilepsiam, uim habeant, uti gaggates lapis, bituminis odor, olus atrum, iccoris caprini, aut hircini assi odor: id quod multò magis efficiet, si edatur. Lactuca, portulaca, & alijs herbis quæ frigido sunt & humido temperamento, abstincendum. Non reiiciendæ uerò calidæ, ut salvia, sampsucus, & præter cæteras hyssopus. Capparis esus mirum in modum confert. Vinum aromaticum, aut aliter calidum permittatur, sed paucum: aliàs tenue sit, & aquosum, atque etiam dilutum. Præstabit autem, si eo ægrotus carere possit, mulsa uti. Vinum aromaticum in exigua etiam quantitate omnino negandum, cum aeris intemperies calida uiget, aut cum citra capitis, aut uentriculi noxam, ægrotus eo uti non potest. Exerceatur ante cibum, fricetur quoque, post cæteras autem partes, capiti fricationes adhibeantur. Coitu
uti

uti licebit, sed moderato. Nocturnus somnus sit mediocris, diurnus impensè uitetur, Curandi ratio in hac Epilepsia ab humore frigido, & pituitoso, statim auspicianda ab eductione materiarum communium, quod aut hoc, aut simili enema commodè fiet. Recipe maluarum, betæ, linozostidos, ana. Manipulum unum. furfuris, Manipulum unum & dimidiatum. Decoquantur in sufficienti quantitate aquæ ad tertias. Accipiantur iuris decocti libr. i. ß. cas. recens extractæ, sacchari semel duntaxat cocti, ana. 3. i. mellis despumati, 3. i. ß. olei commu. 3. iij. salis, 3. i. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum immittatur. Deinde concoquatur humor in hunc modum.

Recipe serapij de hyssopo (in hoc affectu ualde probatur) serapij stœchados, oxymelitos scillitici à Democrito traditi, ana. unc. ij. Stillatitiorum liquorum, betonice, primule ueris, mellissophylli, an. unc. iij. misceantur, & per quatrimum in quatuor partes partita à ieiuno appetente diluculo bibantur.

Aut utatur apozemate sequenti.

Recipe hyssopi, sampsuchi, betonice, mellissophylli, saluæ, ana. Manipulum unum. primule ueris Manipulum unum, ß. radice pœoniæ Luna decresciente collectæ, unc. ß. seminis eiusdem simili quoque tempore collecti, drach. ij. florum helichrysi, stœchados, cirsii, bugloss. an. P. i. ß. agarici recens in pastillorum formam redacti, unctam unam, medullæ cnici, drac. vi. Coquantur in s. q. aquæ donec dimidium absumatur. Recipiatur iuris decocti libr. i. ß. melleq; adiecto. q. s. fiat in serapij mediocris consistentiæ formam, quod depuretur, & adiectis nucis moschata, & cinnamomi selecti, ana. drach. i. ß. iucundiore

DE MORB. INTER. CVR.

iucundiore & sapore, & odore reddatur. Postremo toti apozemati misceantur scrup.ij. seminis peoniæ puluerati. Quinque ad meatus aperiendos idoneæ radices in hoc affectu minimè conueniunt, humores enim nimium attenuant, & uapores excitant. Purgetur deinde in hunc modum. Recipe pilul.cocci.3.i.cum stillatitio liquore hyssopi, fingantur pilul.v. quæ ad dimidium noctis sumantur. Recipe theriacæ ueter.drach.i.conseruæ bugloss.drach.i.ß. misceantur, & postridie sumantur sex horis ante pastum. Purgato corpore, utentur sequentibus errhinis, apophlegmatismis, & gargarismis: singulis autem per dies quatuor.

Errhina.

Recipe succi sampsuchi,unc.i.ß.succi rutæ,unc.i.mellis unc.ß.misceantur, & tepida à ieiuno naribus attrahantur.

Aut aliter.

Recipe succi sampsu.3.iiij.radic.peoniæ pulueratæ 3.ß.munie.3.ij.misceantur, & utatur ægrotus ut dictum est.

Apophlegmatismi.

Recipe pyrethri,mastich.ana.3.i.adiecta cera fingantur morsuli auellanarum magnitudine, qui mandantur, semper expuendo, horæ dimidio, ieiuno uentriculo, per dies quatuor.

Gargarismi.

Recipe Sampsuchi,hyssopi,stæchados Arab.calaminthæ,ana.manipul.unum, sinap.3.ß.Decoquantur ad dimidij consumptionem aquæ. Recipiantur iuris decocti uncie sex, adiectis oxymelitos scillitici uncis duab.fiat gargarismus, quo utatur mane, ante pastum. Hæc autem
fiant

fiant ab egrotante bis quotannis, Vere quidem Martij principio, autumno uero ad dimidium Septembris. Post hæc cerebro robur addet, sumpta 3. i. theriacæ ueter. semel in hebdomada, sex horis ante pastum. Aut cum lectum dormiturus ingreditur, sumat diamoschi dulcis, aut pliris cum moscho morsulum unum, qui in rhombi figuram fingi solet, quater in hebdomada. Et hæc quidem uere et autumno fiant, reliquo uero tempore, hoc est æstate, et hyeme, utatur pil. sequentibus. Recipe Pil. asieret, agarici in pastillorum formam redacti, ana. 3. ij. seminis pæoniæ, 3. ss. excipiantur serapio, stœchad. funganturq; pil. vi. ponderis. 3. i. de quibus sumet tres lectum ingrediens, semel, aut bis in hebdomada. Aestatis uero tempore præstabit eas cum oxyphœnicæ pulpæ fingere. Hyberno tempore sequenti compositione molli utetur. Recipe conseruæ florum stœchados, conser. acori col. conser. roris marini, ana. 3. i. ss. corticis citri saccharo conditi. 3. i. cineris cuculli, cineris hirundinum, cineris ungulæ asini, cineris cranij masculi (pro masculo) foeminini (pro foemina) coral. rub. an. 3. ij. seminis uiticis, seminis pæoniæ, seminis satyrii basilici, an. 3. iij. radicis pæoniæ collectæ Luna decresciente. 3. ss. Cû serapio de hyssopo fiat cõpositio mollis, de qua sumat ad castaneæ amplitudinem, tribus horis ante pastum, quater in hebdomada: qua sumpta, mox bibat. 3. iij. iuris hyssopi decocti. Aestate uero utetur compositione sequenti. Recipe pul. diarrhodi abb. pul. diamoschi dul. ana. 3. ij. conseruæ florum stœchados, conseruæ roris marini, ana. 3. i. ss. sacchari dissoluti in stillatitijs liquoribus ros. et hyssopi. q. s. fiat compositio solida, quæ in rhombi figuram fingatur. Sint autem singuli rhombi ponderis. 3. ij. ss. E quibus

D sumat

DE MORB. INTER. CVR.

sumat unum matutinis horis, ante pastum, quater in hebdomada. Eoq; sumpto, mox bibat. ℥.ij. iuris decocti hysopii, & cichorii. Radicem quoque pæoniæ collo appensam, Luna decrescente collectam, assidue gestet. Quod si his non curatus fuerit, fiat cauterium ferro supra commissuram capitis anteriorem, ubi coniungitur commissura sagittalis cum coronali. Si uero cauterium ferro factum, durius egroto uideatur, ea admoveantur, quæ sua facultate idem præstant, quæ dicta sunt superius in Cephalalgia pituitosa per proprietatem cerebri.

EPILEPSIAE PROPTER CON-

sensum oris uentriculi Curatio.

O Re uentriculi male affecto, ab ipso ad cerebrum feruntur uapores, quos cerebrum ut noxios excutere nititur. Prouidendum ut aeger probè concoquat. Et nisi egrotus egrè admodum uomat, uomitu primum tentandum uentriculum expurgare, in principio quidem leuiore, irritamento, hunc in modum. Recipe Aquæ tepidæ. ℥.vi. oxymelitis, simpl. ℥.i.ß. misceantur, & bibantur. Post horæ dimidium, si non uomat, penna in oleo de lilio intincta palatum & fauces fricare expedit, ut sic uomitus irritetur. Rursum irritamento fortiore eliciendus uomitus. Recipe Seminis atriplicis, radicis raphani, seminis anethi, ana ℥.ß. Decoquantur in aqua. Accipiantur iuris deco. ℥.vi. oxymel. scillini à Democrito traditi, ℥.ij. misceantur, & tepida bibantur, fiatq; ut dictum est. Deinde euacuandus humor, qui uentriculi superficiei infixus est. Reci. hieræ picræ Gal. ℥.ß. uel. ℥.vi. sumantur appetente aurora, cum cinnamomo. Aut sumatur pilul. hieræ picræ Gal. ℥.i.ß. manè cum iure cicerum rubr. aut cum

cum absynthij liquore stillatitio. Aut pilul. euacuetur.
Recipe pilul. de hiera simpl. Gal. aut alephangi, agar. in
pastillorum formam redacti, ana. ʒ. i. ʒ. Cum melle rosa.
fingantur e pondere ʒ. i. pil. vi. de quibus bis per hebdoma
dam horis duabus ante coenam tres sumantur. Confert
etiam eas interdum sumere, cum lectum dormiturus egro
tus ingreditur. Utatur etiam electario molli, scripto Ca
pite proximo superiore, addendo aromatici rosacei à Ga
briele in literas relati ʒ. ʒ. Topica deinde adhibenda præ
sidia. Recipe emplastri mastich. emplastri stomachici,
ana. ʒ. unam. coral. rubr. ʒ. ij. galangæ, ʒ. i. ʒ. adiecto oleo
nar. q. s. miscantur, & fingatur emplastrum idoneum ad
uentriculi regionem tegendam: applicetur uentriculo aut
in parte anteriore, aut in parte posteriore. Hoc quoque
unguentum plurimum conferet. Recipe olei absinthij,
olei nardini, olei mastich. olei ex contoneis, ana. ʒ. i. ʒ. men
ta sicca, cardamomi, caryophyllo, coral. rubr. ana. ʒ. ij.
coriandri præparati, sesquidrachmam ceræ parum. Fiat
unguentum, quo ungatur regio uentriculi, mane, & ue
speri ante pastum. Utatur & hoc puluere à pastu, qui
uapores ad cerebrum ferri prohibet. Recipe coriandri
præparati, ʒ. iiij. pul. diacydonitæ sine speciebus. ʒ. iiij. se
minis pæoniæ collecti Luna decresciente, maceris, ana. ʒ. i.
cinnamomi selecti, anisi, fœniculi, ana. ʒ. iiij. sacchari ad
pondus omnium, Fiat puluis, quo post pastum utetur: quo
sumpto, ne bibat. Diarrhodum à pastu ne sumatur, nam
penetrat, & quæ easunt facultate à cibo sumpta, succos
crudos in uenas deferunt.

EPILEPSIAE PER CONSENSVM

cum parte aliqua subiecta Curatio.

D

2

Inter

DE MORB. INTER. CVR.

Interdum hoc mali ex parte quapiam subiecta inuade-
re percipitur, elato inde prauo quodam, & uenenoso
uapore, ad cerebrum. Si spiritalis illa substantia uene na-
ta ex aliquo mēbro, quod supra possit uinculum excipe-
re, putà ex pede aut manu, ascendat, ubi commoueri inci-
pit, pars super posita fortiter deligetur: ut uia uapori illi
præcludatur. Deinde post accessionem illam, uacuandum
corpus uniuersum, quo expurgato, ad particulam à qua
aura illa frigida, & uenensa emergit curandum acceden-
dum. Primum concoquantur humores. Recipe mel. ro-
sacei col. serapij conseruationis acori, serapij storchados,
ana. 3. i. ʒ. Stillatitiorum liquorum, chamæpityos, beto-
nice, hyssopi, ana. 3. iij. misceantur, & à ieiuno partita in
tres partes, per triduum diluculò bibantur. Recipe pi-
lul. de agar. pil. foetid. ana. 3. ʒ. Cum stillatio liquore
hyssopi fingantur pilul. v. quæ circa noctis dimidium su-
mantur. Recipe theriacæ ueter. ʒ. ij. conseruæ acori,
conseruæ buglos. ana. 3. i. ʒ. misceantur, & postridie ma-
ne sumantur. Utatur præterea & compositione illa
molli cerebrum roborante, scripta paulò antè in Capite
de Epilepsia ab humore pituitoso frigido. Corpore ita-
que inanito, lues illa deinde topicis præsidij à parte un-
de ascendit uacuanda: partem etiam cauterijs hulceran-
do. Recipe Cantarid. abiectis capitibus & alis, ʒ. i. ʒ.
misceantur cum fermento, & melle anacard. subigan-
tur in conspersionis modum, applicenturq; parti illi, un-
de uenenosus uapor exurgere solet, ibiq; tantisper persi-
stant, dum uesicæ existant, quæ post rumpantur, & hu-
more inde manente expulso, tegantur, aut ficubus, aut
brassicæ folijs. Postquam autem exiccate fuerint, &
abolita,

abolita, inibi cucurbitulae affigantur, nec sine scarificatione. Non leue quoque adiuumentum sentiet, si semel aut bis in hebdomada pil. sequentibus usus fuerit. Recipe pil. asaiet, agar. in pastillorum formam redacti, ana. 3.ij. cum melle ros. fingantur è pondere 3.i pilul. vi. de quibus sumat tres, lectum iugrediens, ut dictum est.

EPILEPSIAE ET A SANGVINE,

et à bilioso humore Curatio.

SI sanguinis copia uentriculos cerebri occupauerit, spirituumq; meatus obstruxerit, quæ huius morbi accessionem procreet, in primus mittatur sanguis (præmissis enematibus emollientibus, quorum formulæ multæ superius multis in locis sunt traditæ) è sophena, deinde (si sanguis affluxerit) de humerali: sin minus, de humerali tantum, aut de uena frontis mittetur. Capiti deinde oxyrrhodinum apponatur. Cætera omnia fiant ut in eo affectu, quem multa bilis, sanguini mista, procreauerit. Perrarò tamen usu uenit, ut à bile hoc mali oriatur. Si quando tamen contigerit, sic curetur. Primum humor, hunc in modum concoquatur. Recipe sera. de succo intybi satiui latioris, 3.ij. oxymel. scillini. 3.i.ß. stillatitiorum liquorum, bugl. cichorij, oxalidis. ana. 3.ij. misceantur, et à ieiuno per triduum diluculò bibantur. Reci. electarij trium santalorum 3.ß. utatur cum serapijs. Recipe pil. aggre. 3.i. cum stillatitio liquore intybi satiui latioris, fingantur pil. v. quæ sumantur ab ægroto, ubi exacerrectus fuerit, circiter noctis dimidium.

Aut fiat potio purgans.

Recipe rhabar. selecti 3.i.ß. cinnamomi gra. iij. mace-
retur in stillatitio liquore intybi satiui latioris, horis xij.

D 3 deinde

DE MORB. INTER. CVR.

deinde exprimantur, & colentur, adiectis cas. recens extractæ ʒ. i. serap. ros. purgatorij, ʒ. ʒ. cum iure communis medicinarum decocti, fiat potio purgans, quæ hora quarta à noctis dimidio sumatur. Recipe conser. rosarum, conser. bugl. ana. ʒ. i. ʒ. conser. acori. ʒ. i. misceantur, & postri die mane sumantur. Epilepsia interdum oritur à retentio ne spermatis, curetur coitu. Epilepsia cum sit ab humore melancholico, curetur remedijs in Capite de Melancholia dictis, seruata tamen methodo pituitosæ Epilepsia curadæ.

APOPLEXIAE CVRATIO.

Cap.

XVI.

Apoplexia est omnium corporis partium motus, & sensus priuatio, subito superueniens, patiente cerebro, communi neruorum principio. Ab hoc morbo per pauci liberantur. Quod si quempiam effugere hoc mali contigerit, in paralyfim incidit, manetq; plerunque uiolata ratio. Senes temperamento pituitosiores, quique sua uictus ratione, temperamentum hoc aluerunt, huic morbo signa. obnoxij sunt. Huius mali magnitudo cognoscitur ex noxæ, quam spirationi infert, uehementia. Vbi enim spiratio multum egreditur naturalem ordinem, magnam in cerebro noxam conijcimus, si uero parum, paruam. Spiratio illa omnium est pessima, quæ intermittitur, et magna cum uiolentia trahitur. Hoc malo correpti, ut dormientes, oculis clausis, decumbunt, & nonnunquam stertunt. Spiratio in illis nonnunquã tã est exigua, et debilis, ut sensum effugiat, iacentq; mortuis p̃similes, ij præsertim, qui corde sunt minus calido. Lana igitur carpta, aut accensa candela horum naribus, & ori admoueatur, aut poculum aqua plenum pectori, quæ si moueantur, respirationis & uitæ

uitæ sunt indicia. Speculum quoq; naribus et ori admotū, si maculetur, aut caliginæ obducatur. Et quanquā nullum uitæ indicium appareat, ante tertium diem exactum sepe licendi non sunt, nam multi sunt reuixisse uisi. Præcedit plerunq; hoc mali capitis dolor uehemens, tumor quoq; uenarum iuguli, refrigerantur nulla ratione partes extremæ, palpitat uniuerſum corpus, difficulterq; mouetur: urina quoq; pauca est, & nigrescens, cum farinaceo ſedimento. Oritur interdum hæc paſſio ob acrem admodum frigidum ambientem, cerebri humiditates, & excrementa conſtringentem. Interdum ob caſum, aut ictus, qui cerebrum concutientes efficiunt ut ad ipſum humores confluant. Frequentiſſima eſt, aut à pituita craſſa, frigida, & lenta, à cruditatibus, et crebris ebrietatibus procreata, præcipuos cerebri uentriculos cumulatiſſime implente, cerebri etiam ſubſtantia læſa: aut fit à ſanguine, & huius curandi rationem prius exequemur, illius poſterius. Principiò, ſi os clauſum, dentesq; conſtricti fuerint, ponatur inter dentes ligni fruſtū, osq; teneatur aptum. Deinde fiat uenæ ſectio, ob magnam ſpirituum obſtructionem, ne ſuffocetur. Fiat autem lata incifio: ut ſanguis qui ueluti cōgelatus craſſior eſt, facilius exeat. Et ſi magnæ plenitudinis ſanguinis indicia adſuerint, primū mittatur ſanguis è ſophena, ad reuellendum. et euacuandum: deinde è uena externa cubiti. Si uerò plenitudinis ſigna non adſint, ſatis erit è uena externa, aut è uenis naſi, aut frōtis mittere. Si uehemens nō fuerit Apoplexia, ante uenæ ſectionē immittatur enema eductiuū materiariū cōmunium, nō acutum, ne magis inflammet, piculumq; ſit præfocationis ægroti. Si uerò uehemens fuerit prius incidatur uena, et miſſo ſanguine immittatur enema ſequens.

Cauſæ.

Curandi
ratio.

D 4 Recipe

DE MORB. INTER. CVR.

Recipe betæ, linozostidos, maluarum, fursuris, an. M. i.
Decoquantur in s. q. aquæ, ad tertias. Accipiantur iuris decocti lib. i. β. cas. recens extractæ, sacchari rub. an. ʒ. i. mel. rosæ. col. unc. i. β. ol. communis unc. iij. salis triti. ʒ. i. β. fiat enema, quod immittatur ut dictum est. Si i principio sanguinis fluxus ad caput appareat, inhibeatur in hunc modum. Recip. ol. rosacei, aceti, an. ʒ. ij. Misceantur, et admoveantur fronti tepida, post uenæ sectionem, & immisionem enematis. Multis immixtis enematis, sternutamenta cingere expediet. Recipe pulueris piperis, pulueris pyrethri, ana. ʒ. i. β. insufflentur in nares. Cæterum si enemata immitti non possent, fingantur balani ex sapone duro, in felle bubulo infusæ, in quo sal dissolutus fuerit, longitudinis. viij. digitorum, quæ filo alligatæ, in anum immittantur, & agitentur ad irritandum facultatem expultricem. Apoplexia si à pituita fuerit lenta, crassa, et frigida, plethorâq; appareat, hoc est, si sit ægrotus succulentus, & corpulentus, reuulsionis gratia incidatur uena humeralis, minus tamen sanguinis mittatur, quàm in Apoplexia à sanguine. Deinde immittatur sequens enema. Recipe origani, calaminthæ, saluæ, stœchados Arab. chamæmeli, ana. Manipul. i. agarici albi. ʒ. i. medullæ enici. ʒ. β. centaurij minoris. M. β. colocyntidos. ʒ. ij. Decoquantur in s. q. aquæ tantisper dum pars dimidia absumatur. Recipiantur iuris decocti libr. i. β. hieræ picræ. ʒ. ij. hieræ Logadij. ʒ. β. mel. anthosati. ʒ. i. β. olei rutæ, olei chamæmeli, an. ʒ. i. β. salis fossilis. ʒ. ij. fiat enema, quod immittatur statim à uenæ sectione, sæpeq; immittatur, deplet enim uicem solutiui pharmaci, quod per os assumi non potest: coigitur ut edum, donec bona materie pars euacuata fuerit.

Quod

Quod ubi perfectum uidebitur, utendum apophlegmatif-
 smis, sternutamentum cientibus, & gargarismis dictis in
 Cephalalgia pituitosa. Si ore quidpiam deglutire pote-
 rit,umat compositionis anacardinae. 3. ij. cum hydromeli
 te aut mithridat. 3. ij. aut theriacae ueter. Lamina quoque
 ferrea uel adeò calefacta ut capillos urere uideatur, su-
 perponatur capiti. Embrocha deinde utendum, quæ sic
 paretur. Recipe saluiae, roris marini, foliorum lauri, stœ-
 chados, helychrysi, origani, calaminthæ, an. q. s. Deco-
 quantur in aqua, iure de cocti irrigetur caput, quo irro-
 rato, & loto, radatur: rasum sequentibus linatur. Recipe
 castor. 3. ʒ. sinapi. 3. i. ʒ. puluerentur, & adiecto aceto for-
 ti fiat linimentum, quo caput rasum calidè linatur.

Aut sic.

Recipe ol. de euphorb. olei rutæ, olei nard. ana. 3. ij. py-
 rethri, piperis, sinapi, nucis moschatæ pulueratorum, an.
 3. ij. succi rutæ sesquiunciam. Adiecta cera fiat unguen-
 tum, quo unguatur caput rasum. Immittatur etiam in
 nares, & aures oleum rutæ. Cùm autem expergefactus
 fuerit, & loqui incipiet, tertio quidem aut quarto die à
 morbi principio, si per os aliquid sumere queat,umat se-
 quentes pil. Recipe pil. cocci. Almanforis. pil. de euphor.
 ana. 3. ʒ. cum stillatitio liquore betonicæ, singantur pil. ʒ.
 quæ sumantur circiter dimidium noctis.

Autumat potionem sequentem.

Recipe diaphœnici, bdelli, elect. indi. maioris, an. 3. ij. ʒ.
 serapij stœcha. 3. ʒ. excipiantur iure communis medicina-
 rum decocti, adiectis polypod. quer. 3. ʒ. agar. albi. 3. ij. fiat
 potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recip. theria-
 cæ ueter. 3. i. sumatur postridie sex horis ante pastum.

D S Vomiti-

DE MORB. INTER. CVR.

Vomitus magis in morbi processu, quā in initio laudatur.

MANIAE CVRATIO.

Cap. XVII.

Fit hic morbus patiente cerebro aut per seipsum, aut p
compaticiendi rationem. Et à sola cerebri nonnūquam
calidiorē intemperatura sine humore vitioso, & hæc si-
milis est illi, quæ ex ebrietate contingit. Oritur interdum
ab humoribus mordacibus & calidis, qualis est flaua bi-
lis, cerebrum occupantibus, ipsumq; cū membranis suis
stimulantibus. Nascitur etiam interdū à sanguine incor-
rupto, etiā temperato. sed multitudine tantum cerebrum
lādente. Et hæc quidem mania minū periculosa est: comi-
tantur eam frequentes risus, ridiculis quibusdam uisis ob-
oculos obuersantibus. Quod si sanguini flaua bilis admi-
scetur multa, iracūdi, temerarij; euadunt. Si uerò etiam
super assa fuerit, crassiorq; effecta, ferinus erit furor.
Estq; hæc Mania omnium periculosissima. A phrenitide
autem differt Mania, quod hæc citra febrem sit, illa uerò
cum febre. Antecedere plerunque solet hanc insaniam ca-
pitis imbecillitas, ipsiusq; uibratio, & grauitas, cum au-
rium tinnitu, rarus somnus, & is per breuis, oculis quoq;
splendores quidam apparent. Progressu temporis augen-
tur hæc omnia, atque increbrescunt, oculi excauantur, ac
minimè mutāt. Excitantur rabidi quidam appetitus, &
maximè ad uenerem. **Viētus** sit tenuis, cibi sint liquidi et
ratio. forbiles, aluum ad excretionem procliuē reddentes, et qui
nullius, aut certè perquā pauci sanguinis generatiui
Curandi sint. Vitetur satietas. A uino prorsus abstinendum. **Curan-**
ratio. di ratio statim à sanguinis missione auspicianda, siue fue-
rit plenitudo, siue mensium, aut hæmorrhoidum, aut ali-
cuius

cuius cōsuetæ euacuationis sanguinis suppressio, enemate tamen prius iniecto. Recipe maluarum, althææ, uiol. ana. M. i. lactuæ, foliorum cucurbitæ, ana. M. semissimæ prunæ. x. quatuor seminum frig. maiorem, ana. 3. i. Decoquantur in s. q. aquæ, ad tertias. Recipiantur iuris decocti libr. i. ̄. cas. recens extractæ sacchari semel duntaxat cocti, an. 3. i. olei uiolacei. 3. iij. fiat enema, quod ante pastum iniiciatur, cui sal addi non debet, quoniam desiccet. Enemate eiecto incidatur sophena, postridie uerò mediana dextri brachij, aut illius partis, in qua grauitatis sensus apparet. Fiat autem incisio lata. His peractis si plenitudo non satis imminuta uidetur, secetur humeralis, deinde uena frontis, aut irritetur sanguinis fluore naribus. Si uerò hoc mali à bile flaua nascatur, è uena media duntaxat mittatur sanguis, qui si niger, crassusq; uideatur, permittatur effluere: sin tenuis, sistatur. Materia deinde, siue fuerit Mania sanguinea, siue biliosa, & cōcoquatur, & euacuetur in hunc modū. Reci. serapij acetati simp. 3. iij. serapij uiolacei. 3. i. ̄. Stillatitiorum liquorum nymphææ, buglossi, lupi salictarij, an. 3. iij. Misceantur, et per triduum in tres æquas portiones diuisa à ieiuno appetente diluculo bibantur. Recip. elect. trium santalo. 3. ̄. utatur cū serapijs. Præstabit cū herbarum erit copia, hoc apozemate uti. Reci. foliorū circij, buglossi integri, extremitatum lupi salictarij, & fumarie, intybi satiui latioris nō loti, cichorij, an. M. i. hemionitidis, adianti recentis, an. M. ̄. iij. seminum frig. maio. ana. sesquidrachmam. prunæ. xij. trium florum com. florum nymphææ, an. P. i. ̄. foliorum sennæ, polyp. quer. ana. 3. vi. epithymi (cæteris plenè decoctis addatur) M. ̄. Decoquatur in s. q. aquæ

DE MORB. INTER. CVR.

aquæ fontanæ, tantisper dum pars dimidia tantum relin-
quatur. Accipiat iuris decocti lib. i. ß. & adiectis sera-
pij simp. de pomis redolentibus. serapij de bugl. an. 3. ij. &
saccharo, fiat serapium mediocris consistentiæ, quod de-
puretur, dein addendæ. 3. ij. pul. Æiamargar. frig. cum. 3. i.
agallochi, ut suauiore reddatur & sapore & odore. Et
ipsum in quinque partes aquas diuisum, diebus quinque
ieiunus egrotus diluculo bibat. Vacuetur deinde idoneo
solutiuo, quod in forma liquida magis conuenit quàm so-
lida (nisi potio egrotanti displiceat) cū in hoc affectu hu-
mectare summopere expediat, utetur igitur potione se-
quenti. Reci. cathol. 3. ß. compositionis hamech. 3. ij. sera-
pij uiu. 3. ß. excipiantur iure decoctorum prunorum, uua-
rum passarum, glycyrrhizæ, & trium florum com. adie-
ctis decoctione penè absoluta epithymi, 3. iij. fiat potio
purgans, quæ sumatur hora quarta matutina.

Aut hac.

Recipe foliorum sennæ à stipitibus purgatorum, po-
lypo. quer. an. 3. ß. rhabar. selecti. 3. iij. oxyphœnicwn.
drachm. vi. macerentur in sero caprino horis xij. deinde
exprimantur, & coletur: ac adiectis serapij rosacei de in-
fusione rosarum siue diagrid. 3. ij. fiat potio, quæ suma-
tur ut suprâ dictum est. Si potio displicuerit, utatur pil.
sequentibus. Recipe pil. indarum pil. de lapide Armen.
ana drach. ß. cum stillatitio liquore buglossi fingantur
pil. v. quæ sumantur ad noctis dimidium.

Aut hoc puluere laxatiuo.

Recip. lapidis Armenij quinquagies loti in stillatitio
liquore buglossi. 3. ij. croci. 3. ß. epithimi. 3. i. sacchari
ad pondus omnium, fiat puluis, quem sumat exceptum
stillatitio

Stillatitio liquore intybi satiui latioris, aut iure pulli, aut sero caprino. Robur deinde & cerebro, & cordi addendum, ad quod, si quid aliud, conferet hæc mollis cōpositio. Recipe Conseruæ rad. buglossi, conseruæ rosarum, conseruæ nymphæ, an. ʒ. i. ʒ. conseruæ adian. ʒ. vi. pul. diamarg. frig. coral. rub. an. ʒ. ij. fragmentorum preciosarum com. ana. ʒ. ʒ. compositionis alchermes, compositionis de hyacintho, an. ʒ. iij. doronici Romani. ʒ. i. excipiantur serapio de pomis redolentibus, fiatq; electarium molle, de quo sumetur instar castaneæ circiter auroram tribus horis ante pastum, mox deinde bibat stillatitiorum liquorū intybi satiui latioris & buglossi. ʒ. i. Poterit & fieri electarium solidum, si eo ægrotus magis delectetur. Reci. pul. diamarg. frig. ʒ. ij. pul. elect. de gemmis. ʒ. i. doronici, serici puluerati, an. ʒ. ʒ. conseruæ rosarum, conseruæ bug. ana. ʒ. i. ʒ. sacchari. q. s. dissoluatur in stillatitijs liquoribus rosa. & bugloss. fingaturq; electarium solidum in rhomborum figuram, quorum singuli sint ponderis. ʒ. ij. Sumet unum quotidie manē duabus horis ante pastū, bibendo post stillatitios liquores ut supra. Adhibeatur deinde cordis regioni epithema sequens. Recipe stillatitij liquoris rosarum, ʒ. viij. stillatitij liquoris buglos. ʒ. ʒ. stillatitij liquoris nymphæ, ʒ. iij. pul. diamarg. frigidi, coral. rub. ana. ʒ. i. ʒ. pastillorum de caphura, drac. ʒ. croci. ʒ. i. aceti, ʒ. semissem. Misceantur, fiatq; epithema cordi tepidē manē & uesperī ante pastum. Hepar quoque non negligendum, quod & sequenti epithemate iuuabitur. Recipe stillatitij liquoris intybi satiui latioris lib. i. stillatitij liquoris rosarum. lib. semissem, omnium santalorum, an. scsquadrachmam seminis oxalidis, seminis

DE MORB. INTER. CVR.

feminis portulacæ, feminis intybi satiui latioris, an. ℥. ij. caphuræ gra. ij. spicæ nardi, scrup. i. aceti, unc. semissim.

Misceantur, & fiat epithema hepati mane & uespere ante pastum tepide. Declinante morbo supra modum conferet egrotum balneo in hunc modum parato uti.

Recipe maluarum, foliorum salicis, foliorum uitis albe uiniferæ, foliorum lactucæ, foliorum nymphæ, ana Manip. iij. florum uiolarum, florum cirsii, florum bugl. an. P. ij. florum chamæmeli, florum meliloti, ana Manip. ℞. Decoquantur in aqua, in qua tepida collocatus egrotus aliquantisper lauetur ante pastum, deinde lectum ingrediatur, nec multis, aut densis stragulis opertus sudorem eliciat. Sudor enim exiccat. Embrocha tamen è iure decocti balnei ante, quam balneum ingrediatur, caput irrigatum et lotum radatur, et in egressu balnei, rursus eodem decocti iure caput lauetur. Deinde spinalis medulla, & pectus, unguento sequenti moderate calido ungantur, statim scilicet ab egressu balnei. Recipe olei uiolacei, olei amygdalarum dulcium, olei nymphæ, pinguedinis recentis porci, ana unc. iij. ceræ albæ parum, fiat unguentum, quo ungatur, ut dictum est. Quod si his peractis curatus non fuerit, cauterij utendum, aut è ferro candenti, aut ex his compositis, quæ corrodingi hulcerandiq; facultate sunt prædita, quæ superius crebro tradita sunt. Et his potius utemur, donec tanta corrosio facta sit, ut os nudum appareat. Admoueat autem ubi coronalis commissura cum sagittali coniungitur. Osse uerò denudato, de eo particula integrè auferatur, maneatq; locus ille apertus per mensem. Vehemens admodum erit Mania illa, quæ his curari non poterit.

Melan-

LIBER PRIMVS. 32
MELANCHOLIAE CVRATIO.

Cap. XVIII.

Hic morbus, desipientia quaedam est, et mentis alienatio sine febre, ex humore melancholico cerebri occupante, et mentem immutante orta. Cuius tres sunt differentiae. Vna cum uniuersus in uenis sanguis melancholicus est effectus, obq; id commune uitium, ipsum quoque cerebrum laeditur. Quod ut cognoscatur, uniuersum corporis habitus est considerandus. Si enim egrotus macilentus fuerit, niger, hirsutus, uenas habens latas: aut rufus, aut flauus multis laboribus qui se fatiget, uigilijs, et solitudine, tenui quoque uictu educetur: ad haec cibis ne hic melancholicum sanguinem suapte natura parientibus sit usus, inquirendum est: querendum quoque an haemorrhoids aliqua restricta sit, aut alia quae piam sanguinis consuetudine uacuat, ut in mulieribus menses. Notae enim haec sunt uniuersi in uenis sanguinis melancholici effecti. Altera Melancholiae species est, cum reliqui corporis sanguis prorsus syncerus, et innotuus, solus uero is qui in cerebro continetur, melancholicus est: atque id bifariam fit. Aut enim aliunde in cerebrum deriuatur, aut in ipsomet humor melancholicus genitus est, cum uidelicet internus calor flauam bilem, aut crassum atrumq; sanguinem superassauit. Internoscere autem an solum cerebrum sanguis melancholicus occupet, an uniuersum corpus magni est ad curationem momenti. Siquidem ubi uniuersum corpus sanguinem melancholicum continet, a uenae sectione curationem incipere oportet, ubi uero solum cerebrum, sanguinis detractio non indiget. Tertia Melancholiae species hypochondriaca nominatur, de qua postea
rius

Causa.

DE MORB. INTER. CVR.

signa. rius dicitur. Harum autem triū differentiarum notæ communes sunt mœstitia, uitæ, & hominum odium. Et quamquam uitam damnat, nō tamen omnes mori cupiunt. Alij mortem pertimescunt, et tamen mortem sibi consciscunt. Timent omnes, & facile terrentur. Etenim quemadmodum externæ tenebræ omnibus ferè hominibus pauorem inducunt, sic atræ bilis color mentis sedem tenebris persimilem reddens, timoris causa est. Varia illis sunt uisa. Alij enim bruta se esse animalia credunt, ipsorum uoces & gestus imitantur. Alij se uasa fictilia factos esse putant, ob id occurrentibus cedunt, ne collidantur. Sunt alia infinita huiusmodi eorū uisa, quæ singula percenscri non possunt. Ceterum quoniam non in promptu est internum discernere, utrum in solo cerebro, an in uniuerso corpore humor melancholicus contineatur, alijs quidem signis consentientibus, alijs pugnantibus, quò certior habeatur notitia, cubiti uena secunda media. Quòd si sanguis fluens melancholicus appareat, sperabis reliquum similem in uniuersi corporis uenis, uacuabisq; ut paulò post dicitur. Si uerò talis non uideatur, statim suppressatur, quòd solo cerebro humorem illum continente, sanguinis detractio non sit opus, nisi fortè præseruationis gratia, aut nisi plenitudo aliud suadeat. Victus ratio eiusmodi sit, quæ melancholicum humorem minimè generet. Cibi boni sint succis, humidi, & temperati: quales sunt phasiani, capri, gallinæ, perdices, pisces saxatiles, & alij id genus. Elixis utantur cibus, non assis, nec frixis. Vinum album, & tenue bibant. Equitent, ambulent, nauigent per loca amœna, & uiridia. Somnus plurimum confert, qui si non sponte obrepat, conciliandus modis superius

superius locis aliquot traditis. Confert & coitus, modū non excedens. Amici, & hi imprimis quos ægrotus caros habet, ipsum frequēter uisunt, iucūdisq; sermonibus exhibent. Cantus audiat, & musica instrumenta hilaritatem excitantia. Curandi ratio statim à uenæ sectione aspicienda: si quidem uniuersus uenarum sanguis melancholicus fuerit, prius tamen enemate iniecto. Recipe maluarum, uiolar. betæ, ana. Manip. i. florum chamæmeli, florum meliloti, ana. P. i. Decoquantur in s. q. aquæ, ad tertias. Accipiantur iuris decocti lib. i. ß. cas. recens extractæ, sacchari semel duntaxat cocti, ana. ʒ. i. mellis uiolacei. ʒ. i. ß. olei comm. ʒ. iij. fiat enema, iniiciatur matutinis horis, ante pastum. Quo emissio, Galeni sententia, ut paulò antè dictum est, mittendus sanguis è media uena. Arabibus autem & posterioribus consultius uisum humerariā incidi, partis quidem illius in qua maior gratius percipitur. Quòd si (affectu, ut dictum est, dubio) sanguis crassus, nigerq; fluxerit, fluere permittendus pro laborantis corporis habitu. Si uerò dilutior, tenuiorq; fuerit, suppressendus. Postridie autem, si plenitudo multa erat, mediam incidere licebit. Si hæmorrhoidum, aut mensium suppressio fuerit, euocentur. Melancholicus humor deinde concoquatur, & uacuetur. Recipe oxymelitos simpl. ʒ. iij. serapij uiol. ʒ. ij. serapij de pomis dulc. simpl. ʒ. i. Stilletiorum liquorum buglos. fumarie, lupi salictarij, an. ʒ. iij. Misceantur & adiectis ʒ. ij. pul. diamoschi dulcis, et ʒ. i. cinnamomi selecti reddatur iucundiore & sapore, & odore. In ipso principio hæc satis sunt, in progressu poterunt alia ad concoquendum humorem exhiberi, quæ ipsum magis attenuabunt, corporisq; meatus magis patefacient.

Curandi
ratio.

E Hac

DE MORB. INTER. CVR.

Hac deinde potione uacuetur.

Recip. cas. recens extractæ, catholici, ana. ʒ. ʒ. compositionis hamech. ʒ. ij. ʒ. serapij uiolacci. ʒ. i. excipiantur sero caprino, aut iure cōmunis medicinarum decocti, adiectis epithymi. ʒ. ij. folior. sennæ. ʒ. iij. fiat potio, quæ post serapia sumatur hora quarta matutina. Recipe conseruæ radicis buglosi, ʒ. semissem, sumat postridie manè. Vacuatus utetur molli electario sequenti. Recipe conseruæ radicis buglosi, conseruæ cirsii, an. sesquiunciam, pul. diamoschi dulcis, pul. elect. de gemmis, ana sesquidrachmam, compositionis alchermes. ʒ. i. utriusque behen, seminis ocymi, ana. ʒ. ij. pul. diamargar. frigid. coral. rub. ana. ʒ. i. adiecto serapio de pomis redolentibus fiat electarium molle, de quo sumat magnæ auellane instar, manè, horis tribus ante pastum, quo sumpto, mox bibat parum stillatitij liquoris buglosi, aut parum uini eodem liquore diluti. Deinde cor epithemate roboretur. Recipe stillatitij liquoris buglosi. ʒ. iij. stillatitij liquoris mellysfophylli, stillatitij liquoris florum uiolarum, stillatitij liquoris florum nymphæ, ana. ʒ. i. behen. albi, & rubri, seminis ocymi, serici crudi, an. ʒ. ʒ. seminis oxalidis, coral. rubri. ana. ʒ. i. ambari. gra. iij. uini odoriferi. ʒ. semissem. fiat epithema cordi tepidè ante pastum. Non præmittatur balnei usus in hoc affectu perquam necessarius, qui sic paretur. Recipe chamæmeli, meliloti, M. iij. seminis lini, seminis fœnogr. an. unc. iij. capitum ueruecum, q. v. Decoquantur in sufficienti quantitate aquæ, in qua butyri recentis, q. s. dissoluatur. Hoc balneo irrigetur, & lauetur egrotus manè ante pastum, & uesperis, horis sex à prandio. Cum autem balneum egreditur, inungatur

tur spina dorsi his oleis tepidis. Recipe olei amygdal. dulcium, olei uiolacei, axungiae recentis pullae, ana ℥.iij. Misceantur, & fiat ut dictum est in exitu balnei. Embrocha quoque tepida utendum ē ueruecum capitibus, chamæmelo, artemisia tenuifolia (matricariam appellant) & althea in aqua decoctis parata, matutino quidem tempore per multos dies. Confert etiam plurimum pulmo arietinus calidus, ē cadenti adhuc corpore recens extractus, & sic capiti admotus. Aut in aqua calida calefiant, dein leniter exprimatur, sicq; capiti applicetur. Idem præstabit agnus per dorsum diuisus, et exenteratus, adhuc calens capiti superpositus. Pulli accipitris, & noctuae comesti hinc quoque commendantur.

MELANCHOLIAE HYPO=

chondriacæ Curatio.

OB hypochondriorum, & uentriculi offensionem, Causa.
 passio hæc constat. Nam inflammatis hypochon-
 drijs, partibusq; uentriculo uicinis, & ob id ipso quoque
 uentriculo plus caloris quàm decet habente, sanguis qui il-
 lis in partibus continetur, fit crassior, & atræ bili confor-
 mis. Et quemadmodum uidemus elatis ex uentriculo ad
 oculos fuliginosis, & fumosis quibusdam exhalationi-
 bus, ac crassis uaporibus, qualia in suffusione accidentia
 contingunt, ita à partibus illis, crassoq; sanguine in ipsis
 contento elata ad cerebrum euaporatione, melancholica
 symptomata circa mentē eueniunt. Quos hic affectus ha- signa.
 bet, æstum in præcordijs sentiunt, cibi q; refrigerantibus
 iuuari uidentur. Ructus illis frequentes acidi, uentriculi
 cruditas, & flatus. Sūpto cibo coctū difficili, humido spu-
 to abundant. Ventriculus illis interdū uehementer dolet,

E 2 dolorq;

DE MORB. INTER. CVR.

Curandi
ratio.

dolorq; nonnullis ad dorsum usque procedit. Euomunt nonnunquam crudos cibos, et pituitam uel sub amarā, uel acidā, adeo ut dentes plerunque torpedine afficiantur. Ventres desiccantur, somnus per breuis est, cum turbulentis somnijs. Venæ, quæ circumstant oculos, à uaporibus, & flatibus elatis intumescunt: qui in auribus sonitū quoque efficiunt. Vertigine crebro infestantur. Curationis initium à uenæ sectione sumetur, prius tamen sequenti enemate aluo subducta. Recipe betæ, brassicarū, artemisiæ leptophylli, chamæmeli, an. M. i. polypodij, seminis enici, ana. ʒ. ʒ. cassiæ, epithymi, an. quartam partem. M. i. Decoquatur in s. q. aquæ, ad tertias. Accipiantur iuris decocti libr. i. ʒ. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana. ʒ. i. mellis uiola. ʒ. ij. olei communis, olei de lilio, ana ʒ. i. ʒ. hieræ picræ Gal. ʒ. ij. Fiat enema, quod ante pastum immittatur, eoq; semel in hebdomada utatur. Emisso enemate, si ægrotus iuuenis sit, in eoq; sit plenitudo, incidatur uena iccoraria dextri brachij, aut saluatella sinistra. Si uero totius corporis plenitudo non adsit, sed tantum circa lienem, aut renes affluere uideatur sanguis saluatella tantum incidenda est. Humor deinde in hunc modum concoquatur. Recipe serapij bizantini sine aceto (propter exiccationem) ʒ. ij. serapij de epithymo. ʒ. i. serapij simpl. de pomis redolentibus, ʒ. ʒ. Stillatitorum liquorum hemionitidos, buglossi, lupi salictarij, ana unc. ij. misceantur, & à ieiuno mane per biduum bibantur, repetendo alijs post octo diebus. Recipe diamoschi dulcis, unciam unam, utatur cum serapijs. Concoctis humoribus sic uacuetur. Recipe catholici ʒ. vi. compositionis hamech, ʒ. ij. uel. iij. pro ægrotantis uiribus, serapij de

de buglos. $\mathfrak{z}.\beta$. excipiantur iure communis medicinarum decocti, adiectis foliorum sennæ, polypodij quer. ana $\mathfrak{z}.\text{ij}.$ epithymi (quod cæteris penè decoctis admisceri debet) $\mathfrak{z}.\text{ij}.$ fiat potio purgans, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe conseruæ rad. buglos. $\mathfrak{z}.\beta$. sumatur postridie manè. Si autem ægrotus extenuatus sit, & uiribus imbecillis, omiſſa compositione hamech,umat duntaxat $\mathfrak{z}.\text{i}.$ catholici cum iure dicti decocti. Vbi dies aliquot quieuerit, rursum humor concoquatur, & purgetur. Interea uerò enemate paulò antè tradito utetur. Rursum igitur in hunc modum concoquatur humor. Recipe serapij de pomis redolentibus, compositi. $\mathfrak{z}.\text{i}.\beta$. serapij byzantini. $\mathfrak{z}.\text{i}.$ serapij de epithymo, $\mathfrak{z}.\beta$. Stillatitiorum liquorum buglosi, fumariæ, lupi salictarij, ana. $\mathfrak{z}.\text{ij}.$ Misceantur, & ab ægroto ieiuno diluculò bibantur per biduū: idemq; facere pergat alijs octo proximis diebus, uacuetur iterum potione purgante supra proximè tradita, sumpta, fiat deinde fots super uentrem ex his quæ sequuntur. Recipe chamæmeli, meliloti, artemisiæ leptophylli, abrotani, an. Manip. $\text{i}.\beta$. polypodij quer. sennæ, epithymi, an. $\mathfrak{z}.\beta$. Decoquantur in aqua, et uino albo, cum pauco aceti scillini, et in huius decocti iure immersis spōgiis foueatur uenter manè & uesperī antè pastum. Deinde ungatur unguento sequenti. Recip. ol. de lilio, $\mathfrak{z}.\text{ij}.$ olei amygdal. dulcium. olei de capparibus, olei rutæ, an. $\mathfrak{z}.\text{i}.\beta$. olei chamæmeli, $\mathfrak{z}.\text{ij}.\beta$. cinnamomi, ninigellæ, seminis anethi, seminis brassicarum, hemionitidos pulueratæ, florum genistæ pulueratarum, ana. sesquidrachmam. croci, $\mathfrak{z}.\text{i}.$ ammoniaci dissoluti in aceto cillino, $\mathfrak{z}.$ semissem. Commistis omnibus fiat unguētum, quo calido ungatur regio uentriculi, partesq;

E 3 uicinæ,

DE MORB. INTER. CVR.

uicina, manè & uesper, post fotum. Utendum embrocha, balneo, cum unctionibus in exitu balnei, ut Cap. proximo superiore traditum est. Fiant duntaxat cordi epithemata, quæ ibidem sunt demonstrata. Hic postremo admonendus Medicus, ne in hoc morbo uolens uentriculi cruditatibus consulere, ea exhibeat, quæ uehementer & calefaciunt, & siccant.

CATALEPSEOS CVRATIO.

Cap.

XIX.

signa.

Catalepsis est subita deprehensio, & occupatio tum mentis, tum corporis motu, sensuq; priuati. Qui hoc malo corripitur eam retinet partium corporis figuram, quæ erat cum correptus fuit, rigidis uidelicet nervis, à frigido, & sicco concretis. Si enim sedebat, sedens permanet; si genua flexerat, flexa manent. Oculi autem manent aperti, quod musculus palpebram superiorem aperiens, rigidus manet, sensu & motu priuatus, ut ceteræ corporis partes, quoniam non solum cerebrum, sed etiam spiritus animalis in singulis corporis partibus concretus manet ab intemperie frigida & sicca, aut humore frigido, & sicco, & ad permeandum nervosa corpora, ac mouendum ineptus. Oritur enim hic morbus

causæ.

non solum ab intemperie frigida & sicca, sed etiam ab humore melancholico frigido, & sicco, cerebri posteriora potissimum infestante. Differt hic morbus à Catoche, quod fiat à frigida, & sicca intemperie, aut à frigido, & sicco humore: Catoche uerò à bile flaua largiore, cum largiore etiam pituita in cerebro permista, ex quibus hæc frigida, & humida, somnum: illa calida, & sicca uigilias inducit, magis tamen, & minus, pro uincens humoris
quans

quantitate & qualitate. Ab Apoplexia quoque differt, quod spiritus habeat affectos, & à frigido & sicco ueluti concretos, & propter id inepti redduntur ad uim & mouendi, & sentiendi in neruosa corpora transuehendam: sed quibus locis intercepti fuerint, quieti manent, fiuntq; partes illæ rigide: in Apoplexia uerò spiritus sunt integri, sed per obstructionem uentriculorum cerebri prohibentur in neruos sentiendi & mouendi facultatem cōuhere. Manent itaque partes laxæ, & resolutæ, corpusq; statum, & priorem partium figuram commutare potest. Et à Lethargo differt, quod in Lethargo refrigeratio inniſta sit humiditati, in Catalepsi uerò, siccitati. Respiratione in hoc morbo manet, sed exigua, illæſis adhuc quibusdā spiritibus manentibus, qui ob uitæ necessitatem respirationi potissimum seruiunt. Viſus ratio. Viſus ratio pro causa rerum uarietate mutetur. Sit admodum tenuis, alatur ægrotus ptisanæ cremore, bibat mulsam, ad ignem accurate coctam. Nutriatur aliàs singulis diebus, aliàs uno interposito die, pro medici prudentia. Quod ad curandirationem attinet, si fuerit hic morbus ab intemperie frigida, & sicca, sine humore, fiat in hunc modum. Recipe dialtheæ, ʒ.ij. olei costini, unguenti martiati, ana. ʒ.i.ʒ. misceantur, & inungantur pars posterior capitis calide, & linteum super ponatur calidum. Cum uerò à paroxysmo liberatur, utatur electario solido, in rhomborum figuram ficto, quem diamoschum dulcem nominant. Summat rhombum unum mane, lectum egrediens: & uesperis, lectum ingrediens. Quando uerò hoc mali ab humore frigido et sicco originem traxerit, curationis gratia primum hoc enemate utendum. Recipe betæ, linozostidos, thymi,

DE MORB. INTER. CVR.

epithymi stœchados Arab. ana. Manip. i. polypodij quer-
sennæ, ana. ʒ.ß. Decoquantur in s. q. aquæ, ad tertias.
Recipiatur iuris decocti libr. i.ß. catholici, sacchari rub.
ana. ʒ. i. mellis anthosati, ʒ. i.ß. olei chamæmeli, olei de li-
lio, an. ʒ. i.ß. Commistis omnibus fiat enemata, quod quacun-
que hora immittatur. Post hæc inungatur unguento su-
perius proximè tradito pars capitis posterior. Vbi ue-
rò à paroxysmo liberatus ad se redisse uidebitur, conco-
quatur humor, deinde uacuetur. Recipe scrapij de bu-
glossa, serapij de epithymo, serapij de stœchade, an. ʒ. i.ß.
Stillatitiorum liquorū melissophylli, fumarie, buglosi,
ana. ʒ. iiij. Misceantur, & à ieiunio per triduum appeten-
te diluculo in tres æquas partes diuisa bibantur. Recipe
diamoschi dulc. aut pliris cum moscho. aut diambra. ʒ.
ß. utatur cum serapijs. Deinde uacuetur. Recipe catho-
lici. ʒ. vi. compositionis hamech. ʒ. ij.ß. serapij de buglos.
ʒ.ß. Excipiantur iure communis medicinarum decocti,
adiectis polypodij quer. ʒ.ß. folior. sennæ. ʒ. iiij. stœcha-
dos Arab. P. i. fiat potio purgans, quæ sumatur hora quar-
ta matutina. Recipe theriacæ ueter. ʒ. ij. conseruæ bu-
glos. ʒ. ij. sumantur postridie manè sex horis ante pastum.
Magno quoque usui erit sequens electarium solidum, in
rhomborum figuram, ut solet, formatum. Recipe pul. pli-
ris cum moscho, pul. lætitie Gal. pul. diamoschi dulc. an. ʒ.
ij. conseruæ rad. buglos. ʒ. ij.ß. sacchari dissoluti in stilla-
titio liquore melissophylli. q. s. fiat electarium, ut dictum
est, sumat rhombum unum quotidie, & manè cum lecto
egreditur, & uespere cum lectum ingreditur.

PARALYSEOS CVRATIO.

Cap.

XX.

Paralyti

Paralysis affectus est neruorum totius corporis, aut partis, dempto capite. Nam cum caput, & reliquæ omnes corporis partes & mouendi, et sentiendi uim amiserunt, hæc affectio non paralysis, sed Apoplexia appellatur. Cum uero omnes corporis partes sub facie constitutæ motum & sensum, amiserunt: aut ubi alteri laterum dextro, aut sinistro id accidit. Paralysis nominatur. Quod si alicui membrorum id euenerit, illius membri Paralysis esse dicetur, etiam si motum tantum amiserit, non sensum. Nam ubi partium aliquarum sensus tantum perijt, non resolutæ, sed sensus expertes dicuntur: cum Paralysis hoc est, resolutio, potissimum dicatur, ubi motus deperditus est. Tunc autem uniuersæ corporis partes sub capite constitutæ, faciei partibus illæsis, sensu & motu priuantur, cum spinæ initium afficitur, ibi facta aliqua dispositione, per quam cerebri facultas ad ipsam peruenire prohibetur. Si uero pars tantum dimidia eius primi spinæ processus affecta fuerit, aut dextra, aut sinistra, omnes suppositæ partes resoluentur, dextræ quidem dextra affecta, sinistra sinistra. Pars autem aliqua tunc resoluitur, cum neruus, qui eius motioni deputatus est, aut musculus affectus est. Hæ omnes resolutiones magna ex parte fiunt à multis humoribus crassis, & lentis, aut neruos, aut neruorum principia obstruentibus, & prohibentibus animalem facultatem, quæ sensum præbet & motum, ad membra transmitti. Frigus ingens, fortis quoque neruosorum corporum compressio, ut propter casum. Paralysem efficere possunt. Multis indicijs ad huius affectus cognitionem nihil opus: partem enim eam, quæ motu priuata est, Paralyse laborare nemo nescit.

Causæ.

D 5 Aqua

DE MORB. INTER. CVR.

Vi-
tus
ratio.

Aqua uerò causa, cum ex aegri sermone, tum ex his quæ dicta sunt facile erit deprehendere. Victus ratio in uni-
uersum calfaciens, siccans, atque attenuans esse debet, quæ pituitæ generationem prohibeat. Moretur igitur ægrotus in aere calido, & sicco, qui si talis natura loci non habeatur paretur industria, ignibus luculentis, suffitibus ex caryophyllis, & alijs id genus. Principiò primis saltem tribus diebus, tenuissimo utendum ui-
ctu. Sustineat itaque ægrotus in ediam, solius melicrati contentus usu, aut paucis ptisanæ succo. Cibus postea boni succi, & concoctu facilibus, natura calidis, & siccis uescatur, ut auiculis, perdicibus, ouis sorbilibus, amygdalis, & alijs id genus. Idem quoque cibi arte calidi & sicci reddantur, id quod fiet, si aut frixi, aut assi fuerint. Panis sit biscoctus, aniso aut melanthio saccharo admisto. Ex oleribus, fœniculum, hyssopus, sampsucus, salvia, satureia conducunt. Humida, & frigida uitentur, ut fructus, & pisces. Sitis quanta maxima potest ferenda, sitq; exiguus potus. Vino prorsus abstinendum, donec morbus desierit. Bibatur mulsa, cui salvia incocta sit, aut cinnamomum. Quod si à uino ægrotus ob consuetudinem aegrè arceri potest, aut uirium imbecillitas, uini usum suadeat, permittatur quidem, sed modicum, atque oligophorum, in morbi declinatione præcipuè, & minore periculo. Interdium non dormiendum. Nocturnus uerò somnus sit mediocris. Exercitium, si eo ægrotus uti poterit in primis utile. Omnes animi perturbationes uitet, letusq; uiuat. In summa, omnia tam sumenda, quam admouenda, facultate quadam naturali & calfaciendi, & siccandi prædita esse debent. Principiò ta-
men

men multum calfacientia cauenda sunt, siquidem hic morbus à causa interna fuerit, ne fluens initiò materia magis colliquetur, & fusa calore per uias ab ipso calore latiores redditas ad fluendum magis prouocetur. Curandi ratio à sanguinis missione auspicianda, si quidem plenitudinis adfuerint indicia, atque ætas, corporis habitus, et similia permiserint. Sanguis autè à latere incolumiore mittendus, & moderatè, ne corpus refrigeretur. Cæterùm ante quàm uena incidatur, aut hoc, aut simili enemate molliatur aluus. Rec. catholici, sacchari rub. an. ʒ. i. mellis rosa. col. ʒ. ij. olei chamæmeli. ʒ. iij. salis com. ʒ. i. Excipiantur iure communis enematum decocti, adiecto florum chamæmeli, meliloti, stœchados Arab. an. P. i. ante pastum iniiciatur. Eductis fecibus si omnia (ut dictum est) consentiant, mittatur sanguis. Humores deinde concoquantur, & uacuentur. Recipe mel. rosacci. col. ʒ. v. Stillatitiorum liquorum saluie, mellissophylli, primule ueris, ana. ʒ. v. Misceantur, & à ieiuno bibantur diluculo per dies quinque. Recipe diarrhodi abb. ʒ. i. utatur cum serapijs. In hoc affectu oxymelite non utendum, quòd neruis propter acetum noceat: nec diamoscho, quòd sit calidior. Deinde uacuetur. Recipe agar. in pastillorum formam redacti, & in melle rosa. col. stillatitijsq; liquoribus betonicæ, & mellissophylli infusi. ʒ. i. deinde exprimatur, fiatq; potio purgans, quæ sumatur hora quarta matutina.

Curandi
ratio.

Aut utatur catapotijs.

Recipe pil. asieret, agarici in pastillorum formam redacti, ana. ʒ. ʒ. cum stillatitio liquore saluie fiant pilul. γ. Sumantur in introitu lecti. Has pilulas non
admo-

DE MORB. INTER. CVR.

admodum efficaces sentiet ægrotus, cuius etiam rei admoneri poterit. Recipe conseruæ acori col. 3. ij. sumantur postridie manè. Post hanc purgationem ungatur origo neruorum oleo chamæmelino, eoq; solo. Quiescet ægrotus dies aliquot, alia non sumens pharmaca: sed interea utetur enemate sequenti. Recip. betæ, helxines, linostidos, saluæ, hyssopi, origani, calaminthæ, ana M. i. centaurij minoris. M. ß. agarici albi. unc. i. stœchados Arabi. florum chamæmeli, florum meliloti, ana. P. i. De-coquantur in s. q. aquæ, donec dimidiũ absumatur. Accipiat iuris decocti lib. i. ß. hieræ Gal. 3. i. mellis anthosati. 3. ij. ol. de lilio. 3. iij. salis fossilis. 3. ij. Cômistis omnibus fiat enema, quod reliquo omni post tempore, quoad sanus sit, bis in hebdomada iniiciatur ante pastũ, facibus prius eductis, altero enemate suprâ proxime dicto iniecto. Diebus aliquot à prima uacuatione transactis, humores pituitosos rursus extenuabimus, & expulsionem idoneos reddemus diebus sex, in hunc modum. Recipe mel rosacei col. 3. ij. serapii stœchados, 3. i. stillatitiorum liquorũ primule ueris, saluæ, betonicæ, ana 3. ii. misceantur, & à ieiuno ad diluculum per duos dies bibantur. Repetantur alijs post quatuor diebus. Recipe rosatæ nouellæ unc. i. utatur cum serapiis. Deinde uacuetur. Recipe pil. asaiet, pil. de agarico, an. 3. ij. cum stillatio liquoris primule ueris fingantur pil. vii. sumantur ab ægroto cum primũ experrectus fuerit. Recipe conseruæ acori col. 3. ii. pul. diamoschi dulc. 3. ß. misceantur, & postridie manè sumantur. Post hanc secundum purgationem inungatur origo neruorum oleo chamæmelino, cui tertia pars olei de lilio immista sit. Quiescat iterum dies aliquot,

aliquot, nulla sumens pharmaca, sed tantum utens enemate paulo ante tradito, ut dictum est. Tertiò, ubi dies aliquot quieuerit, concoquentur humores, in hunc modum. Rec. serapii stœchados. serapij cōseruationis acori, oxymelitos scillini à Democrito traditi, an. 3. iiii. stillatiorum liquorum saluicæ, primulæ ueris, betonicæ, sampsuchi, ana 3. v. Misceantur, & à ieiuno per dies quatuor diluculo bibantur, & uesp̄ri ante coenam horis tribus, ut uis eorum feratur ad cerebrum. Repetantur aliis quatuor diebus si expedire uideatur. Recipe diamoschi dulc. 3. i. β. utatur cum serapiis, Deinde purgetur.

Recipe pil. foetidarum Mesuæ, pil. cocci. pil. de agarico, ana. 3. i. Excipiantur stillatio liquore betonicæ, fingantur pil. v. sumantur ad noctis dimidium. Recipe pul. sacchari semel duntaxat cocti. 3. β. cum iure cicerum rub. fiat lotorium. Bibatur horis septem à sumptione pil. abstergendi uentriculi gratia. Recipe theriacæ ueter. 3. i. conseruæ florum roris marini. 3. i. β. misceantur, & postridie mane sumantur, sex horis ante pastum. Confert plurimum, his peractis, huic malo febrem ephemeram arcessere, id quod efficiunt theria. mitridat. anacardina compositio. Hæc quoque compositio mollis, huic morbo, est admodum utilis. Recipe conseruæ acori col. 3. iiii. conseruæ anthos, cōseruæ florum stœchados, an. 3. i. pul. diamoschi dul. pul. pliris cum moscho, an. 3. ii. seminis pæoniæ. 3. i. chamæpit. recentis. M. β. (si desit recens, substituatur sicca. M. i.) cum serapio cōseruationis acori, fiat cōpositio mollis, de qua sumatur instar parue castaneæ alternis diebus, mane, et uesp̄ri, cū lectum ingreditur. Theriacæ quoq; sumpt. 4. 3. i. cum stillatio

DE MORB. INTER. CVR.

latitio liquore uini, sex horis ante pastum, semel in hebdomada, iuuabit eximie. Anacardinae quoque compositionis 3.i. sumpta mane et uesperis ab ægroto lectum ingrediente, uicem deplebit compositionis mollis prædictæ. Vbi ter, ut dictum est, ægrotus uacuatus fuerit, utatur errhinis, apophlegmatismis, gargarismis, sternutamentum cientibus, dictis in Cephalalgia pituitosa. Deinde laconico, aut hypocausto in hunc modum utatur. In uas idoneum immittantur lapides igniti, uino calido irrigati, aut huius decocti iure. Recipe saluie, hyssopi, chamæpityos, sampsiuchi, foliorum lauri, pseudonardi, florum rorismarini, stœchados Arabicæ, florum chamæmeli, florum meliloti, an. q. v. Decoquantur in uino, & huius decocti iure lapides illi irrigentur. Ingrediatur uas illud ægrotus, in eoq; moretur, quam poterit diutissime mane, & uesperis. Poterit horum loco ægrotus balnea naturalia adire sulphurea, & aliquantulum aluminosa. Egressurus autem aut laconicum, aut balnea, sumat 3.i.ß. compositionis mollis paulò ante tradite, aut ueteris theriacæ: sic se deinde in lecto componat ut sudet. Vbi sudauerit, sudorq; abstersus fuerit, ungatur origo neruorum aut oleis, aut unguento paulò mox dicendo.

Olea.

Recipe olei costini, olei terebinth. olei de lateribus, ana 3.ij. Misceantur, & fiat ut dictum est.

Vnguentum.

Recipe unguenti Martiati, unguenti Agrippæ, ana. 3.i.ß. olei costini, olei nardini, olei de piperibus, ana. 3.i. sagapeni, opopanaxis dissolutorum in uino, ana 3.ij. cere parum, fiat unguentum, quo neruorum origo ungatur calide,

vide, ut dictum est. Potest & ex his commistis destillatio per ascensum fieri, & stillatio liquoze inde manante neruorum origo ungi. Vnctio quoque inibi facta ex axungia uulpis, aut taxonis, aut anseris, aut anatis plurimum confert. Postremò cucurbitæ affigantur circa ipsam neruorum originem, deinde cæteris partibus, sensim ad membrum resolutum descendendo.

PARALYSEOS LIN-
guæ Curatio.

P Rincipiò utendum enematibus, serapijs concoquentibus, & pharmacis uacuantibus uniuersalibus & particularibus, dictis Capite proximo superiore, quibus peractis, pars capitis posterior & ceruix & tempora ungantur oleis sequentibus. Recipe olei costini, olei nardini, olei de lilio ana. ʒ. i. ʒ. Miscantur, & ungantur partes suprà dictæ tepide, deinde pelle aut uulpina, aut leporina calefacta tegantur. Postremò uesticæ in ceruice excitentur, ad motis cantharidibus (ablatis antè capitibus & alis) cum fermento, aut axungia. Rumpantur deinde, & ficus fructus aut brassicæ folia superponantur, & inde uacuata aqua mox loqui incipiet. Utetur quoque ægrotus mollibus compositionibus corroborantibus neruos, Capite proximo superiore traditis, & sequenti. Recipe nucis moschatæ, ʒ. i. castor. ʒ. ij. cum succo saluæ fiantur orbiculi lupini similes, quos in ore sæpe habeat, aut nucis moschatæ frustum. Corpore quoque, ut dictum est, uacuato, uenas, quæ sub lingua sunt, incidere conferet, & mento cucurbitulam admouere. Aegrotus autem loqui perpetuò nitatur, linguamq; non segniter exerceat.

VESTICAE RESOLVTAE CVRATIO.

Cura

DE MORB. INTER. CVR.

Cvrabitur purgantibus medicamentis superius traditis, & unguentis, & oleis. Conferent & hæc plurimum. Recipe olei nardini, olei costini, olei mastichini, ana. ʒ. i. ʒ. Misceantur, & his ungantur imus uenter, & inter foemineum manè & uesperis calidè.

ANI PARALYSEOS CVRATIO.

Pvrgetur ægrotus, utatur roborantibus compositionibus, ungatur, ut proximè dictum est. Ceterum & unctiones circa dorsum fiant.

PARALYSEOS A CASV, aut percussione Curatio.

Paralysis, quæ casum, aut ictum repenti subsequitur, desperata est. Si uerò paulatim, curari potest. Ipso igitur statim principio uena secanda, alio tamen prius mollita, facibusq; eductis. Recipe cathol. sacchari semel duntaxat cocti, ana. ʒ. i. mellis à spuma purgati, ʒ. i. ʒ. olei comm. ʒ. iij. Fiat enema cum iure communis enematum decocti, quod nulla mora iniiciatur. Ipsoq; electo incidatur uena media, etiam si plenitudo non adsit, modò tamen ætas, & uires non repugnent. Tantum autem mittatur sanguinis, quantum exercitato Medico uidebitur expedire. Utetur deinde ægrotus uacuantibus medicamentis, & compositionibus mollibus neruos roborantibus superius traditis. Postremò origini neruorum partis resolutæ, ipsi quoque parti admouebitur sequens emplastrum. Recipe farine fœnogreci, lib. ʒ. ammoniaci, ʒ. ij. bdellij. ʒ. i. ʒ. axungie anseris, ʒ. ij. (facta iam paralyti, non ante) axungie uulpis, ʒ. i. ceræ, q. s. fingatur emplastrum, quod locis antè dictis admouebitur.

Paras

LIBER PRIMVS. 41
PARALYSEOS, A SANGVI-
ne Curatio.

Incidenda statim uena, aluo tamen prius enematemol-
lita. Recipe cathol. $\mathfrak{z} . i .$ mel. uiolacci. $\mathfrak{z} . i j .$ olei chamæ-
meli, olei uiolacci, ana. $\mathfrak{z} . i . \beta$. cum iure communis enema-
tum decocti fiat enema, quod ante pastum immittatur, Curandi
ratio.
eoq; emisso, incidatur mane iecoraria uena primum, dein
de uesperti humeraria, postridie incidatur uenæ sub lin-
gua. Si alius quoque humor exuperare uideatur, uacue-
tur, habita ratione & humoris ipsius, & uirium agro-
tantis. Utatur deinde compositionibus mollibus tempe-
ratis, in hunc modum. Recipe conseruæ acori col. con-
seruæ rosarum, conseruæ buglossi, ana. $\mathfrak{z} . i . \beta$. pul. diamo-
schi dul. pul. pliris cum moscho, ana. $\mathfrak{z} . i j .$ pul. diarrho. abb.
pul. electar. trium santalo. ana. $\mathfrak{z} . i . \beta$. Excipiantur serapio
conseruationis acori, fiatq; compositio mollis de qua su-
mat instar castaneæ matutinis horis, ante pastum, & ue-
sperti cum lectum ingreditur. Ungatur quoque sequen-
tibus oleis. Recipe olei chamæmelini. $\mathfrak{z} . i j .$ olei de li-
lio, $\mathfrak{z} . i j .$ olei costini, $\mathfrak{z} . i .$ Misceantur, & illis calidis neruo-
rum origo unguatur. A flaua, & atra bile rareriter Pa-
ralysis oritur.

SPASMI CURATIO.

Cap. XXI.

Spasmus est, inquit Gal. qui neruos, musculosq; in eū
cogit affectum, in quem ab animali facultate, cum
naturalem habitum seruarent, ducebantur. In hoc enim
malo nerui & muscoli in eas partes attrahuntur, quibus
innascuntur. Nanque attractio fieri non potest, nisi ad
suam originem retrahatur musculus. Hac autem sola ra-
tione

DE MORB. INTER. CVR.

causa.
 tione pasmus in conuulsis partibus à motu naturali dif-
 fert, quòd præter uoluntatem fit. Hic autem motus in-
 uoluntarius fit aut à repletionem, & humorum plenitu-
 tudine, aut à uacuatione, & ariditate, aut per consensum
 alicuius partis: nonnunquam à flatibus: de quibus poste-
 rius dicetur. Conuellitur interdum uniuersum corpus,
 faciei partibus illæsis: tunc certum est, communem omnium
 qui sunt infra faciem neruorum originem, hoc est primæ
 spinalis medullæ partes, affectam esse, ipsiq; adaptanda
 remedia. Si uerò simul cum uniuerso corpore faciei par-
 tes conuellantur, ut sæpenumero labra conuulsa uidentur,
 oculi, cutis frontis, tota mandibula, linguæ radix, partibus
 illis sic laborantibus, non solum spinæ initium, sed etiam
 cerebrum affectum est. Conuellitur plerunque pars ali-
 qua tantum corporis, cuius conuulsio declarat neruum,
 qui eius motioni deputatus est, aut musculum esse affe-
 ctum. Conuulsionis autem uniuersi corporis tres sunt
 species. Prima Grecis τέτανος, Latinis rigor dicitur.
 Est autem cum ceruix unà cum reliquo corpore immobilis
 manet, neutramq; in partem inflectitur, sed recta in
 utranque partem iuxta intenditur. Altera Grecis ἐμ-
 πρὸς ὀτότους, hoc est, ad anteriora tensio, dicitur. Est
 autem cum caput, ceruix, corpusq; reliquum in pectus cō-
 trahitur. Tertia, ὀπίσθι ὀτότους dicitur, hoc est, ad poste-
 riora tensio. In hac enim caput et ceruix cum reliquo cor-
 pore in dorsum conuellitur. Fit autem omnis conuulsio,
 uti diximus, aut à repletionem, aut ab inanitionem, aut à
 flatibus, aut per alicuius partis consensum. Spasmos à
 repletionem esse cognoscetur, si sanum quempiam repente,
 aut statim ab initio morbi, uel non multò post principia
corri-

causa &
 signa.

corripuerit, præsertim si temulentus fuerit, ac plenus homo, in otio uidelicet degens. Nervi enim frigidis, & glutinosi humoribus, ex quibus etiam nutriuntur, replentur: unde conuulsione patiuntur, quemadmodum uidemus lora & chordas, cum humiditate multa madent, in humorem præter naturam attolli, sicque interdum tendi ut rumpantur. Victus ratio in hac conuulsione, calida sit, & sicca, sicut prius dictum est in Cephalalgia pituitosa, Apoplexia, & Paralyfi. Quod ad curandi rationem attinet, iisdem enim matibus, scrapijs concoquentibus, uacuationibus, & uniuersalibus, & particularibus, ut in Paralyticos curatione utendum, iisdem quoque compositionibus mollioribus, neruosa corpora roborantibus. Toto rite purgato corpore, balnea præsertim naturalia, ut sulphurea, salsa aluminosa aduenda, aut quæ à nobis ex sulphure, alumine, & sale in aqua coctis fieri possunt: aut quæ ex herbarum decocto huc in modum parantur. Rec. maluarum, althæe, an. M. ij. chamæpitios, saluie, betonice, stœcha, helichrysi, chamæmelii, pseudonardi, fol. lauri, an. M. i. s. seminis lini, semi. fœnogreci, an. ʒ. iiij. caput unum, aut duo, canis, aut uulpis. Decoquantur in aqua, qua lauetur egrotus, totus quidem uniuerso corpore conuulso, aut ea tantum pars, quæ conuulsa est: idque fiat mane ante primum, & uesperis ante cenam. Cum autem balneum egredietur, ungantur tota ceruix, et uerteræ dorsi unguento sequenti. Recipe olei de lilio, ol. lumbricorum, medullæ cruris uacæ, pinguedinis caudæ arietis, an. ʒ. i. s. ol. costini, ol. terebin. an. ʒ. ij. castoripis, an. ʒ. i. s. pyrethri. ʒ. ij. ceræ parum, fiat unguentum, quo partes prædictæ ungantur. Si autem a sanguinis copia conuulsio fuerit, uacuetur, secta cubiti media uena, parcius

Victus
ratio.

Curandi
ratio.

F 2 tamen

DE MORB. INTER. CVR.

tamen quàm copia exigit, ne vires symptomati occurrere deiciantur. Præstat igitur uacuationem partiri, quàm semel quantum necesse est uacuare. Ante tamen sanguinis missionem mollientibus enematis aluus eluenda, ut antè sepe monuimus: deinde acribus utendum, &unctionibus superiùs demonstratis. Valenter quoque conuulse partes continendæ sunt, & motibus inordinatis resistendum. Spasmus ab inanitione, & siccitate motus uehementes, sudores, & labores, uigilias, alui deiectiones, sanguinis eruptiones, uomitus modum ualde excedentes, famem, curas, sollicitudinesq; subsequi solet. Si enim hæc præcesserint, sequaturq; conuulsio non immeritò siccitas illius causa existimabitur. Si uerò ex febribus ardentibus exiccato toto corpore conuulsio accadat, malum hoc maximum est. Nam omnium conuulsionum, quæ ex siccitate fiunt, hæc est pessima. Omnes autem conuulsionες à uacuatione, aut ariditate sunt curatu admodum difficiles, quoniam longum tempus exigitur ad neruorum siccitatem remouendam, morbi autem acerbitas tempus non expectat, quin subito vires resoluit, et exitium affert.

Victus ratio. Victus ratio sit humectans. Iusculis utatur carniū succulentis, carnibus optimis contusis. Principiò utatur aqua hordei, in qua cancri fluuiatiles, & testudines decoquantur, non autem uino, quia materias in neruos penetrare facit. Tandem tamen eo utetur, sed dilutiore. Diluetur autem aqua hordei solum. Et eo quidem utetur tantum in pastu, extra pastum autem, aqua superius dicta. Balneo etiam utetur aquæ dulcis tepidæ. Quod si caliditas appareat, decoquantur lactuæ, uiolæ, folia cucurbitæ, folia salicis in aqua balnei. Cum autem balneum egre-

egreditur, ungatur totum dorsum oleo aut uiola. aut rosa. aut cucurbitino, ne humiditas balneo quæsita exhalet. Plurimum etiam huic affectui confert balneum ex capitibus & intestinis ueruecum, & oleis clementibus. Inter pastus autem utatur electario sequenti. Recipe conser. uiolarum, conser. bugloss. an. 3. i. nucleorum nucum pincarum mundatorum (neruorum enim humiditatem reparant) maceratorum in stillatio liquore rosarum. 3. ʒ. carnium testudinum præparatarum. 3. ij. pul. electa. resumptiui, pul. diatrag. frig. an. 3. ij. sacchari dissoluti in stilla. liquore florum uiola. q. s. fingantur morsuli ponderis. 3. ʒ. In uniuersum, qui hoc malo infestantur, ut hectici curentur. Spasmus à flatibus, Arabes Alcuzen appellant, citò fieri, & desinere solet. Qui si fortè non cesset, resoluantur flatus illi locum fricando pannis calentibus, et ungendo oleis digerentibus, qualia sunt oleum lumbricorum, & chamæmelinum. Utq; non redeat, dissoluatur theriaca in aliquo dictorum oleorum, & locus ungetur. Spasmus per consensum alicuius partis fit non ob materiam, quæ nervosa corpora implere possit, aut ob inanitionem, materiæq; penuriam, sed fit ubi à parte primò patiente substantia quædam aut spiritalis, aut fluida, alteratis per continuitatem partibus ad cerebrum effertur, quæ quidem substantia mole interdum est minima, ceterum qualitate est maxima. Sic autem contingere solet ijs, qui morbo Comitiali per partis alicuius consensum laborant, aut qui à scorpio, aut alia uenenata fera icti sunt. Hanc uerò noxiam aut substātiā, aut qualitatem, cerebrum ut à se expellat hoc motu concutitur. De hac autem morbi Comitialis specie superius est dictū. Si ue

DE MORB. INTER. CVR.

rò ob alicuius uenenatæ feræ ictum conuulsio accidat, adnitendum initio erit, ut uenenum extrahatur, id quod efficiet, si parti percussæ aut galli, aut gallinæ anum deplumatum aduoueris, rostro compresso, ut ano etiam respiret. Suctu ani uenenum extrahet. Theriaca quoque parti punctæ apposita aut uenenum, aut eius qualitatem è profundo attrahet, atque euacuabit. Idem præstabit cucurbitula illi uulnuscule affixa, ipso tamen prius lactiore factò, locoq; toto in circuitu scarificato. Confert etiã cauterijs latioribus ignitis inurere uulnus, ipsum autem deinde porri seminibus cum sale tritis, aut alliis, aut cepis crudis, aut coctis, aut ipsarum succo illinere oportet. Vbi aut crusta ceciderit, ante diem quadragesimum, aut sexagesimum, prohibendum uulnus cicatrice induci. Ad quam si properabit, aut uitis, aut ficulneo cinere uulnus rursus aperies. Spasmus uerò si neruo puncto non à uenenata quidem fera, sed ferro acuto contigerit, teneatur foramen apertum, ut sanies expiret, quæ retenta putresceret. Quod si quidem angustius fuerit, ferro latius fiat. Unguentum deinde multum siccans, ac digerens, tenuium partium, quale est unguentum apostolorum dictum: aut quod confortius est, basilicum. Quoniam autem puncto neruo dolores plerunque uehementissimi adsunt, ad eorum mitigationem loco puncturæ imponatur oleum de euphorbio, si quidem egrotus robustus fuerit: sin delicatus, terbinthina oleo rosa. mista, aut oleum sabinum, aut quoduis aliud mite, quale est oleum cui terræ lumbrici fuerint incocti: his enim oleis parte puncta fota dolor sedari solet. Si tamen ipsum hisce remedijs non uinci contingeret, stupefacientibus utendum, ut pane cum albi papaueris decocto:

cocto: aut quod uehementius crit, cum ipso opio. Si nec sic quoque dolor compescatur, neruus transuersus secetur, dorsi autem spina oleo de lil. aut ol. terebinth. ungatur.

CYNICI SPASMI CVRATIO.

Cap. XXII.

Est autem musculorum mādibulariorum resolutio, in qua os, et nares, et omnino media faciei pars in obliquum declinant. Pars autem ea, quæ peruersa apparet, non resoluta est, sed opposita. Nam ut resolutio musculi qui dextram labri partem mouet, pars ea in sinistram deflectitur: sic si is, qui sinistram mouet, resolutus fuerit, ea in dextram declinat: haud aliter & totam mandibulam in aduersam partem deflecti contingit. Si fuerit hæc affectio cum delirio, fortè arguit Apoplexiam: si cum ratione, à neruis è ceruicis uertebis procedentibus efficitur. Potest hoc pathema & à conuulsione, & à Paralyfi oriri. Si sit à conuulsione ex plenitudine, fit subito: si uerò à cōuulsione ex ariditate, paulatim. Siue autem à conuulsione ex plenitudine fuerit, siue à Paralyfi, ea omnia conducunt medicamenta, quæ in Paralyseos, & Spasmi curatione produximus, præter gargarismos, errhina, & sternutamenta cientia. Vniuerso igitur corpore, ut ibidem dictum est, purgato, sequentibus utemur.

Gargarismus.

Recipe origani, hyssopi, thymi, ana. Manipul. i. Decoquantur in s. q. aque, donec dimidium absumatur. Accipiantur iuris decocti, unc. xvi. oxymel. scillini, unc. ij. Miscuantur, fiatq; gargarismus, quo utatur manè ante prandium, & uespero ante cœnam.

Aut sic fiat.

F 4 Recipe

DE MORB. INTER. CVR.

Recipe sinapi, ʒ.i.ʒ. decoquatur in libr.i. uini ad tertias, adiectis oxymelitos scillini, ʒ.ij. hieræ picræ, ʒ.ʒ. fiat gargarismus, quo utatur, ut dictum est.

Errhina.

Recipe nigellæ Romanæ maceratæ horis xij. in aceto, ʒ.i. pyrethri, ʒ.ij. Excipiantur succo maioranæ, fiantq; errhina, quibus tepidis utatur ieiunus.

Sternutamentum irritantia.

Recipe piperis, pyrethri, cuphorbij, ana. ʒ.ʒ. fiat puluis qui in nares flando immittatur. Si passio hæc à paralyssi fuerit, ungantur ceruix, frons, & tempora, oleis sequentibus calidis. Recipe olei costini, olei terebinth. olei lumbric. ana. unc. iij. Misceantur, & fiat ut dictum est. Si uerò fuerit à conuulsione, ungantur prædictæ partes sequentibus. Recipe ol. de lilio, olei costini, olei terebinth. olei lumbricorum, ana. ʒ.i.ʒ. Misceantur, & fiat ut dictum est. Cucurbitulæ primæ ceruicis uertebrae affixæ, & secundæ, summam quoque opem afferent. Sanguinis itidem missio è uenis, quæ sub lingua sunt. In hoc affectu, etiam ab utrauis causa, confert in ore tenere frustum nucis moschatæ. Dimidia autem nucis moschatæ pars oleo costino paulisper macerata, si in ore frequenter habeatur, multò plus auxilij feret. Victus ratio in hoc malo eadem cum ea, quæ obseruari solet in Spasmo, aut Paralyssi à plenitudine, prout ab altero illorum ortum habet, præterquàm quod hoc morbo laborantem in tenebroso loco morari oportet. Hic morbus, si febres sequatur, incurabilis est. Multa de morbi huius curatione, haud sane contemnenda, in Philonio uidere est.

Stu

LIBER PRIMVS. 45
STUPORIS CVRATIO.

Cap. XXIII.

SI crura, aut membrum aliquod stupeat, racemorum
Scalcatio confert, aut in musto particulam affectam
immergere. Stupor enim Paralysis est imperfecta, cura-
tur igitur ijsdem penè præfidiis: non enim tam uehemen-
tia medicamenta adhibenda sunt.

CATARRI CVRATIO.

Cap. XXIIII.

TRes sunt de fluxus humorum e cerebro in subiectas
partes differentie. Aut enim ad os, & fauces hu-
mor delabitur, & tunc Græcis $\nu\alpha\tau\acute{\alpha}\rho\epsilon\varsigma$, Latinis De-
stillatio dicitur. Aut ad nares decumbit, $\nu\acute{o}\rho\upsilon\zeta\alpha$, Græ- Causæ.
cis, Latinis Grauedo uocatur. Vbi uerò ad asperam ar-
teriam destillat humor, $\beta\epsilon\alpha\gamma\eta$ Græcis, Raucedo
Latinis appellatur. Horum autem defluxuum frigiditas
interdum causa est, humores qui sunt in cerebro constri-
gens. Interdum caliditas, humores eosdem dissoluens.
Omnia quoque quæ caput immodicè replere possunt, hu-
iuscemodi defluxum excitant: qualia sunt uinum immo-
deratius ingestum, balnea calidiora, cibus crudus, qui
in uentre permanet, neque excernitur. Præterea illa, quæ
uaporum copiam ad cerebrum transmittunt, ut allia, ce-
pe, sinapi, raphanus, & odoramenta supra modum cal-
lida. Vitentur igitur hæc omnia. Utendum cibus facili-
bus concoctu, & boni succi, Liberaliùs prædendum, quàm
cœnandum his, qui destillatione laborant. Iidem interdum
ne dormiant, nec supini noctu iaceant. Ventos Austrinos
fugiant, qui & cerebrum replent, et humores dissoluunt.
Vitent & Aquilonios, qui humores constringunt. Viten-

F c tur

DE MORB. INTER. CVR.

tur autem hæc omnia non solum ab his, qui destillationibus iã iã laborant, sed et ab his, quibus cerebrũ humiditatibus plenum est, & ad destillationes occasione uel leuissima paratum. Caput autem humoribus refertum cognoscitur ex ipsius grauitate, ex insolenti somnolentia, & ad motus uoluntarios pigritia, & cum ueluti in seipso languidus homo apparet. Ex uisu solito caliginosiore, auditu quoque hebetiore. Principio etenim neruorum humectato, hæc omnia euenire necesse est. Humor autem, qui è cerebro in subditas partes delabitur, interdum calidus est, nonnunquam frigidus: & causa interdum calida, ut dictum est, interdum uerò frigida. Si igitur materia sit calida, à calore liquante destillans: aut frigida, à frigore comprimente delabens, materia & causa eadem remedia requirunt. Si uerò materia sit frigida, & causa calida, aut contrà: materia, & causa remedia contraria postulant. Vrgentioris igitur maior habeatur ratio, altero interim non neglecto. Humor autem destillans si calidus fuerit, acris plerunque est, ac tenuis, caputq; incallescit: atque eum defluxum febris magna ex parte comitatur, isq; humor ad os, & nares ferè decumbit, rubetq; nasus. Quòd si facies quoque rubescat, & oculi, cum tensione uenarum, incidatur uena cubiti dextri exterior, (si quidem nihil sit, quod sanguinis missioni repugnet) aut media. Sanguis autem pro laborantis uiribus mittatur. Antè tamen quàm uena secetur, molliatur aluus enemate sequenti. Recipe maluarum, altheæ, linozostidos, helxinos, an. M. i. quatuor sem. frig. maior, an. ʒ. i. β. hordei. P. i. β. decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. Accipiantur iuris decocti lib. i. β. cas. recens extractæ, ʒ. i. sacchari semel duntaxat

Curandi
ratio.

duntaxat cocti. $\text{℥.i.℔.ol. uiolacei.} \text{℥.iij.}$ Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum iniiciatur, eoq; eiecto, et fecibus eductis, incidatur uena, ut dictum est. Materia deinde concoquatur in hunc modum. Recipe serapij de ziziphis, serapij uiolacei. ana. $\text{℥.ij.℔. iuris decocti hordei.} \text{℥.ix.}$ Misceantur, et appetete diluculo à ieiuno bibantur p triduū.

Aut hoc apozemate utatur.

Recipe glycyrrhizæ. ℥.i. ziziphorum, mixorum, ana. ℥.℔. quatuor semi. frig. maior, ana. ℥.ij.℔. seminis papauer. albi. ℥.i.℔. trium florum com. an. P. i. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absumatur. Recipiatur iuris decocti colo transfusi lib. i. ℔. adiectoq; saccharo. q. s. dulcedo inducatur, dein depuretur, et santalorum citreorum. ℥.ij. additis, sapore, et odore iucundiore reddatur. De hoc apozemate in aurora bibat ad. iij. ℥. per dies quatuor. Humoribus concoctis, purgetur ut sequitur. Recipe rhabar. selecti. ℥.i.℔. oxyphœnicon. ℥.℔. macerentur in stillatitio liquore intybi satiui latioris, horis, xij. Dein ualide exprimantur, et colentur, et adiectis serapij rosacei purgatorij de infusione rosarum. ℥.ij. fiat potio purgans, quæ hora quarta matutina sumatur. Si uero ægrotus inops fuerit, et superior potio carior uideatur, utatur sequenti uiliore, nec minus utili. Recipe cas. recens extractæ. ℥.vi. electar. de succo rosa. ℥.iij. serapij uiolacei. ℥.i. iuris decocti pectoralis. ℥.iiij.℔. Commistis omnibus fiat potio purgans, quæ sumatur hora quarta matutina. Nec sit Medicus unica euacuatione contentus, si humor abundare uidetur, rursus igitur uacuetur, deinde ad ea, quæ humorum defluxum sistunt accedendum hunc in modum, si materia non admodum calida sit.

Recipe

DE MORB. INTER. CVR.

Recipe boli arme. lotæ in stillatitio liquore rosa. ℥.ij. puluerentur, & cum serapio uiolac. q. s. misceantur, & sumantur ab ægroto cùm lectum ingreditur. Si humor, qui destillat, salsus percipiatur, addatur spica nard. ℥. β. Aut utatur electario sequenti, ipso somni tempore. Recipe boli Arme. lotæ in stillatitio liquore rosa. ℥. iij. amyli. ℥. ij. tragacanthæ, gummi Arabici, ana. ℥. i. β. sacchari candi. ℥. i. Adiecto serapio uiolaceo, aut (si materia sit ualde calida) serapio de papauere. q. s. fingantur orbiculi in lupinorum modum, quos in ore sæpe habeat, præcipuè noctu inter dormiendum. Interdiu quoque sequenti electario frequenter utetur. Recipe pul. diatrag. frig. pul. diapapauer, ana. ℥. ij. sacchari dissoluti in stillatitio liquore rosa. q. s. fingatur electarium solidum, in rhombi figuram, habeat sæpe in ore. Si uerò materia non admodum calida sit, satis sit parum diatrag. frigida in ore habere, idq; frequenter. Quòd si iam dicta non faciant satis, hæc addantur. Recipe conferuæ rosa. antiquæ. sesquiuunciam, diacodij. ℥. ij. pul. diatraga. frigida. ℥. iij. excipiantur serapio rosa. fiatq; in eclegmatis modum, habeatur in ore frequenter, paulatimq; deglutiatur. Suffitus quoque non parum conferunt. Olfaciat igitur acetum effusum super lapidem ignitum. Torreantur fabæ, quas in aceto maceratas odoretur, frons deinde, & testiculi in uiris, in mulieribus mammae, & pedum soleæ oleo uiolac. & ol. nymph. æquis portionibus mistis linantur. Hic quoque puluis anteriori capitis parti inspergatur, cùm lectum ægrotus ingreditur. Recipe omnium santalo. ana. ℥. ij. baccarum myrthi. ℥. iij. coriandri preparati. ℥. semissem. rosarum rubrarum, florum nymphaeæ, ana. P. i. β. fiat puluis.

uis, quo utendum, ut dictum est. Humor autem destillans signa.
 si frigidus fuerit, frons plerunque & caput undiq; disten-
 ditur ossaq; ethmoidea clauduntur, ita ut non uox per na-
 res libere transire queat. Stillat quoque e naribus
 crassus, & pituitosus humor. Corpus uacuandum per ea,
 quæ pituitam purgant, quam quidem ad rem plurimum
 confert ualidi enematis iniectio, quale est hoc quod sequi-
 tur. Recipe maluarum, helxines, betæ, ana. M. i. betonicæ,
 origani, calaminthæ, ana. M. semissem, florum chamæme-
 li, florum stœchados Arab. florum rorismarini, ana. P. i.
 & dimidiatum. Decoquantur in s. q. aquæ usque ad dimi-
 diæ partis absorptionem. accipiantur iuris decocti ses-
 quilibra, cas. recens extractæ, sacchari semel duntaxat co-
 cti, ana. ʒ. i. mellis anthosati. ʒ. i. β. olei com. ʒ. iij. salis. ʒ. i.
 Commistis omnibus fiat enema, immittatur ante pastum,
 eoq; utatur quoties alui subductione opus fuerit. Con-
 coquatur deinde materia hunc in modum. Recipe serae-
 pij de hyssopo, serapij stœcha. mellis rosacei colati, ana.
 ʒ. i. β. Stillatitiorum liquorum betonicæ, sampsuchi,
 adianti, ana. ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuno in tres æquas
 partes partita, diluculo per triduum bibantur.

Aut utatur apozemate sequenti.

Recipe glycyrrhizæ. ʒ. i. radicum rusci, asparagi, græ-
 minis, acori, ana. ʒ. semissem. betonicæ, mellissophylli, hyss-
 opi, sampsuchi, adianti recentis, ana. M. i. uuarum passa-
 rum, detractis uinaccis, ficorum pinguium (propter pe-
 ctus) ana. sesquiunciam, florum stœchados Arab. rorisma-
 rini, & sambuci, ana. P. i. β. trium florum communium,
 ana. P. i. Decoquantur in aqua iustæ quantitatis tantisper
 dum dimidium absumat, dein colo trasfundantur. Acci-
 piantur

DE MORB. INTER. CVR.

plantur iuris decocti. 3. xvi. tantum admisceatur sacchari, quantum ad dulcedinem inducendam satis esse uidebitur. Dein depuretur, & adiectis cinnamomi selecti, pulueris iridis, ana. 3. i. 3. nucis moschatae. 3. iij. iucundiore & odore, & sapore reddatur. Diebus quatuor, aut quinque ab ægroto. 3. iij. appetente diluculo bibantur. Deinde uacuetur. Recipe pil. cocci. 3. iij. pil. de agar. (propter humorem in pectus iam delapsum) 3. 3. cum stil-
latitio liquore hyssopi fingantur pil. vij. quæ sumantur circa noctis dimidium. Domi postridie manendum, ho-
risq. vij. à sumptione pil. utatur lotorio superius fre-
quenter repetito. Si pilulæ displiceant, utatur sequenti
potione. Recipe cathol. 3. 3. agarici recens in pastila-
lorum formam reducti, in oxymelite simplici, & stil-
latitijs liquoribus betonicæ, & adianti macerati, & ex-
pressi. 3. i. 3. diaphœnici. 3. iij. serapij adianti. 3. 3. Exci-
pantur iure decocti pectoralis, adiecto stœchados Arab.
P. i. fiatq. potio purgans, quæ sumatur hora quarta ma-
tutina.

Aut bolo sequenti utatur.

Recipe cathol. 3. 3. diaphœnici. 3. iij. adiecto saccharo
fingatur bolus, qui circa crepusculum sumatur. Recipe
theriacæ uet. 3. i. conscrue buglossi. 3. i. 3. Miscantur, &
postridie manè sumantur. vi. horis ante pastum. Vniuer-
si corporis uacuatione præmissa, capiti tadem, quod ma-
li fons est, topica sunt adhibenda remedia, tum quæ ip-
sum peculiariter purgent, tum roborent. Ut edum autem
hanc ad rem primum errhinis, sternutamenta cientibus,
apophlegmatismis, & gargarismis.

Errhina.

Recipe

Recipe succi betæ. ʒ. i. ʒ. iuris decoctæ maioranæ. ʒ. iij. mellis. ʒ. i. feruant una parumper ad ignem, & inde fiat errhina, quibus dies aliquot utatur ieiunus. Poterit & ualentioribus uti, in hunc modum. Recipe succi radiceis betæ. ʒ. ij. pyrethri, piperis nigri, ana. ʒ. i. uini albi. ʒ. i. ʒ. Misceantur, & utatur ægrotus, ut superius dictum. Pro succo radiceis betæ, substituere licebit succum radiceis plantaginis.

Aut sic fiat.

Recipe succi radiceis iridis. ʒ. iij. ex eo errhina fiant. Possunt & fieri ex felle capræ, aut bouis, eruntq; longè uehementiora. Caterum non hæc fiant, nisi materia maiori ex parte, ut dictum est, uacuata. Sternutamenta autem excitentur puluere ueratri albi, aut piperis nigri.

Apophlegmatismi.

Recipe mastich. ʒ. i. corticeis radiceis cappar. ʒ. ij. pyrethri. drach. iij. piperis nigri. ʒ. i. ʒ. uuarum passarum. ʒ. ʒ. Commisceantur, & in panno raro lineo inuoluta manducantur p̄ horæ dimidiū ante pastum manè, & uesperī.

Aut sic fiant.

Recipe mastich. ʒ. i. cubebæ. ʒ. ij. piperis. ʒ. i. corticeis radiceis capparis. ʒ. i. ʒ. fiat puluis, de quo, quantum capit argenteum cochlear, à ieiuno, quanto tempore superius dictum est, semper expuendo mandatur. Gargarismis postremo utendum loco, principio sanè catarrhum magis irritarent. Hunc autem in modum fiant. Recipe hyssopi. M. i. ʒ. saluæ. M. ʒ. uuarum passarum detraetis uinaceis. ʒ. ʒ. cubebæ. ʒ. ij. ʒ. pyrethri. ʒ. iij. corticeis radiceis cappar. ʒ. ij. Decoquantur in aqua iustæ quantitatis ad tertias. Recipiantur iuris decocti libr. i. oxymelitos

DE MORB. INTER. CVR.

melitos scillini. 3.ij. misceantur, fiatq; gargarismus. Porro ne materia rursus accumuletur, pilulis sequentibus utendum. Recipe pilul. de hiera simpl. aut asai. 3.ij. agarici in pastillorum formam redacti. 3.ij. Misceantur, adiecto melle rosaceo. q.s. fingantur inde pil. vi. ponderis. 3. unius, e quibus sumantur tres, bis per singulas hebdomadas ab egrotante horis duabus à coena, cum se in lecto dormiturus componet. Si enim in pilulis, quæ summi debent, aliquid de scammonio, aut turpeto, aut aliquo alio id genus pharmaco uchementer laxatiuo fuerit, sumantur saltem quatuor horis à coena: si uerò totæ uchementer solutiue fuerint, sumende sunt circa noctis dimidium. Ea percurramus, quæ cerebrum peculiariter purgant, nunc ea dicenda sunt per quæ toti capiti robur addi potest, partim sumpta, partim admota. Hæc autem quæ sequuntur sumenda sunt. Recipe electar. diamoschi dul. in rhomborum aut tessellarum solidam formam redacti, 3.ij. Sumat egrotus tessellam unam duabus horis à coena, cum lectum ingreditur. Præterea sumat 3. i. theriacæ uet. manè horis sex ante pastum semel in hebdomada tempore frigido. Quibus autem diebus nihil aliud sumpturus est, utatur electario sequenti. Recipe pul. diambræ, pul. diamoschi dulc. ana. 3.ij. conferuæ acori, conferuæ florum stœchados, ana 3.ij. sacchari in stillicidio liquore sampsuchi dissoluti, q.s. fingatur electarium solidum in rhomborum figuram. Sint autem singuli ponderis, 3.ij. Sumat egrotus rhombum unum quotidie manè horis tribus ante pastum, siquidem aliud nihil sumpturus est. Si fortè egroto mollis consistentiæ electarium magis placeat, fiat in hunc modum.

Recipe

Recipe conferuæ acori col. conferuæ florum roris marini,
conferuæ stœchados, ana. ʒ. i. ʒ. pul. pliris cum moscho,
pul. diamoschi dul. ana. ʒ. ij. cubebarum, nucis moschatæ,
ana. ʒ. i. ʒ. Misceantur adiecto oxymelite scillino q. s. fiatq;
electarium molle, quo utatur loco electarij solidi prædi-
cti: & sumat de eo quotidie manè quando (ut diximus)
nihil aliud sumpturus est, instar auellane magnæ. Si quic-
quam adhuc è cerebro defluere uideatur, hoc pacto repri-
matur. Recipe spicæ nardi, ʒ. i. mastich. ʒ. ij. ʒ. boli Arme-
niæ lotæ in stillatitio liquore rosa. ʒ. ij. gummi tragacan-
thæ. gummi Arabici, ana. ʒ. i. sacchari candi (ad uolupta-
tem) ʒ. i. adiecto scrapio de ziziphis fingantur orbiculi
lupinis similes, qui retineantur in ore, noctu præsertim
inter dormiendum, quo quidem tempore destillationes
maximè uigent. Sola quoque spica in ore, interq; dentes
retenta, nocturno tempore, huiusmodi humorum deflu-
xum sistere potest. Quæ sequuntur exterius admotæ ca-
piti, ipsum roborant, materiâq; exsiccant. Recipe mel-
lissophylli, betonica, sampsuchi, origani, ana Manip. ʒ.
nucis moschatæ, caryophyllo sandaracæ, ana. ʒ. ij. cocci in-
sectorij, maceris, ana. ʒ. i. ʒ. thuris, mastichis, ana. ʒ. iij. ro-
sarum rubr. P. ij. hæc in tenuissimum puluerem redacta
panno sericeo rubro, & raro insuantur, fiatq; in pileoli
modum acu interpuncti, quem gerat, auferens interim
aliquid de cæteris capitis tegumentis, ne capite nimium
callescente rarefiant pori, sicq; facilius ab externis no-
cumentis lædatur: Qui quidem pileolus si displicue-
rit, eumq; gerere recuset, illius loco utendū sequenti pul-
uere, qui anteriori capitis parti inspergatur egroti, cum
lectum dormiturus adit. Recipe nigellæ Romanæ torre-
factæ,

G

factæ,

DE MORB. INTER. CVR.

factæ cocci infectorii, ana. drach. i. ß. corticis citri sicci,
drach. iij. caryophyllorum, drachm. ij. ß. agallochi, drac.
ij. melli. sophylli, sampsuchi sicci, ana. drach. i. rosarum
rubr. ℥. ij. fiat pulvis, quod utatur ut dictum est. Aestate
uerò addantur santalorum citreorum & baccarum myr-
ti, ana. drach. ij. Inopes uerò uiliore hoc utentur præsidio,
non minùs tamen utili. Recipe millij torrefacti partes
tres, salis torrefacti partem unam, è panno linco raro
fiant sacculi duo, qui calidè admoueantur parti antero-
ri capitis, alter post alterum ante pastum. Hanc quoque
adrem odorifera plurimum conferunt, qualia sunt hæc.
Recipe ladani, ℥. ij. styracis calamitidis, galliæ moschatæ,
ana. ℥. ß. agallochi, caryophyllorum, cubebæ, ana. ℥. i.
cum mucagine gummi tragachante extracta cum stilla-
titio liquore maioranæ fingatur globulus, qui in medio
perforetur, huncq; ægrotus frequenter odoretur, Nigella
quoque Romana torrefacta, panno aut lineo, aut sericeo
raro inclusa, sæpeq; olfacta confert. Non minori sunt
usui suffitus, in hunc modum parati. Recipe aristolochiæ
rotundæ, thuris, mastichis, caryophyllorum, ana. ℥. i. ß. ar-
senici citrei, ℥. iij. adiecto butyro, aut adipe uaccino fin-
gantur pilulæ, quæ pruris superponanturq; sumumq;
hauriat ægrotus ore & naribus, manè, & uesperis ante
pastum. Aut pyrethro, & arsenico citreo simul æquis
portionibus mistis, adiecto recenti butyro fingantur pilu-
læ, quibus superpositis prunis utatur ægrotus ut dictum
est. Aut ex arsenico, & pyrethro, addito oui recentis ui-
tello, fiat in conspersionis modum, qua panni albi parti-
culæ, linguæ figuram habentes oblinantur in acutiore
extremo, dein prunis superponatur extremum illud, quod
ubi

ubi mediocriter exustum fuerit, fumans in os immittatur. Fumum illum hauriat egrotus non unius tantum particule, sed plurium mane, & uesperis ante pastum, ut iam dictum est. Cum iam humoris defluxus minui uidetur, suffiatur lintheum asperum suffitu sequenti, & eo deinde mane ante pastum caput fricetur. Recipe thuris, mastichis, ladani, styracis calamit. ana. $\mathfrak{z}.\mathfrak{ss}$. Misceantur, & ex his suffitus fiat, ut dictum est. Capitis quoque lotio supra modum conducit. Laetetur igitur lotionem in hunc modum paratam. Recipe sampsuchi, betonicae, mellissophylli, ana. $\mathfrak{M}.\mathfrak{i}$. florum helichrysi, stæchados, florum roris marini, florum chamæmeli, ana. $\mathfrak{P}.\mathfrak{iij}$. nigellæ Romanæ, $\mathfrak{z}.\mathfrak{iij}$. Decoquantur in lixiuio facto de cineribus corni, & buxi, eo laetetur caput tonsum, dein siccetur, & accuratè tergatur lintheo aspero suffito, ut paulò antè dictum est, & rursum, mox ubi abstersum fuerit, stillatitio liquore uini laetetur, ipsum manu ualidè fricando. Quod si dicta parum aut nihil contulisse uideantur, persistatq; cataractus, cauterio hunc in modum utendum. Recipe cantharidum (abscissis capitibus & alis) $\mathfrak{z}.\mathfrak{ij}$. misceantur cum fermento, & anteriori capitis parti tonsæ adnoueantur. Vbi uescicæ extiterint, rumpantur, ipsisq; brassicæ folia incisa superponantur, aut ficus, ut totus inde aqueus humor expellatur.

Vel fiat sic.

Recipe olei rutæ, $\mathfrak{z}.\mathfrak{ij}$. sinapi, stercoris columbini, ana. $\mathfrak{z}.\mathfrak{ss}$. piperis sesquidrachmam, ceræ parum. Commistis omnibus fiat unguentum, quo pars anterior capitis tonsa ungatur. Licebit & candente ferro cauterium facere, ea in capitis anteriore parte, ubi digitorum maximus desti-

G 2 net,

DE MORB. INTER. CVR.

net, passamans, eiusq; radice nasi radici admota. Præterea non parum conducet manus, testes, pedesq; uirorum, mammas uerò mulierum manè & uesperis oleis sequentibus ungi. Recipe olei de lilio, olei chamæmelini, olei nardini, ana. ʒ. ij. Misceantur, fiatq; ut dictum est.

OPHTHALMIAE CVRATIO.

Cap. XXV.

Causa. Phtalmia duplex quidē est, una enim uera est, altera uerò non uera. Vera autem Ophthalmia phlegmone est tunicae, siue membranae, quae cohaerens, siue adnata appellatur, frequentius à sanguine, aut bile proueniens. Cum enim membrana illa, siue tunica, quae forinsecus adnata est alijs tunicis, quae oculum ipsum constituent, estq; toti oculo ligamentū ad circumiacentia ossa, inflammatione laborat, uera Ophthalmia est. Huius malitriplex potest esse causa. Aut enim ex plenitudine fit, quae uniuerso grauis est corpori, ob quam cohaerens membrana, humoribus quoque referta tenditur. Aut fit à biliosorum humorum acrimonia uehementer erodente. Aut ob crassorum humorum, & flatulentorum spirituum intensiōem. Si ex plenitudine haec inflammatio contracta fuerit, dolor ingens oculos affligit, tenduntur cum rubore, & calore permagno, magnaq; feruidarum lacrymarū defluit copia. Si uerò à biliosis humoribus orta sit, lacrymae fluentes salae sunt: & acres, calideq; corpus uniuersum prauis abundat humoribus, cacochymumq; est. Quòd si nihil horum apparuerit, è crassis humoribus, & flatulentis spiritibus esse dicemus. Cognoscetur autem haec affectio ex rubore membranae cohaerentis ob sanguinis confluxum, ex lachrymis quoque ex oculis resudantibus

dantibus, & purulentis sordibus in maioribus oculi angulis aceruatis. Moretur egrotus in aere obscuro, & tenebroso, quoniam humores lumen commouet, spiritusq; res soluit: sit autem pro causæ diuersitate aut frigidus, aut calidus, qui, si talis natura non est, industria paretur. Si liberos credere cælo egrotum sit necesse, linteam atrum, aut ceruleum, aut uiride oculis obducatur, hi etenim colores uisum recreant, si aut fatigatus, aut morbo affectus fuerit; Tenui autem prorsus utendum uictu, ciboq; parciori, ut inanitæ partes auidius quos habent humores retineant, ne at oculum confluant. Vino ad usque declinationem abstinentum, interea aut hordei, aut cinnamomi decoctum bibatur. Permittatur autem uinum, quando sanguinis copia crassioris in oculorum uenulis continetur sine plethorica in toto corpore dispositione, utpote sanguinem diffundens atque euacuare potens. suiq; motus uehementia obstructions aperiens. Præstat in hoc affectu quiescere, quam exerceri. Animi perturbationes procul absint, ut quæ humores inflamment. Cæterum, quæcunque Ophthalm. causa fuerit, uenæ sectio (si quidem uires & ætas, ceteraq; ad eam opportuna permiserint) confert, maior tamen, aut minor sanguinis missio fiat, pro humorum, causæq; ratione. Si igitur ex plenitudine, aut biliosis humoribus huius mali origo sit, principio incidatur cubiti uena exterior, quæ è directo est, mane opportuna hora, alio tamen prius iniecto enemate mollita. Si à plenitudine fuerit, eodem die à prandio sanguinis missio repetatur, eadē uena reclusa. Si uero à biliosis humoribus, nō item. Hoc autem enemate antè sanguinis missionem subducatur aluus. Recipe cas. recens extracte sacchari rub.

Viſus
ratio.

Curandi
ratio.

DE MORB. INTER. CVR.

an. 3. i. mel. uiol. 3. i. β. ol. uiolacei. 3. iij. Cum iure decocti
 quatuor herbarum aluum mollientium, et prunorum fiat
 enema, quod ante pastum iniiciatur. Eos fecibus eductis,
 incidatur uena, ut dictum est. Postridie, non expectata
 humorum concoctione, praesertim si à bile hæc lues pro-
 fecta sit, sumatur hora quarta matutina solutium phar-
 macum sequens: ne si tempus in humorum concoctione
 teratur, interea acris ille, & biliosus humor, oculi tunicas
 erodat. Recipe cas. recens extractæ. 3. β. electæ. de succo
 rosa. 3. iij. serapij uiolacei. 3. β. Excipiantur iure commu-
 nis medicinarum decocti, adiectisq; oxypheenicis. n. 3. vi.
 fiat potio purgans, quæ sumatur hora quarta matutina.
 Si locuples agrotus fuerit, utatur potius potione sequen-
 ti. Recipe rhabar. selecti. 3. iij. myrobalanorum flaua-
 rum conficatarum oleo amygdalarum dulcium. 3. ij. oxy-
 phæ. 3. β. Macerentur in stillatitio liquore intybi satiui
 latioris, & pauco uino albo, horis xij. Dein exprimantur,
 & colentur, adiectisq; serapij rosa. laxatiui. 3. ij. elec-
 tar. de succo ros. 3. i. fiat potio purgans, quæ hora quar-
 ta matutina exhibeatur. Recipe conscr. rosa. 3. β. sumat-
 ur postridie manè. Si uero à crassis humoribus, & fla-
 tulentis spiritibus hic morbus natus sit, uena quoque (ut
 dictum est) incidi potest, cæterum minor sanguinis copia
 mittenda, quàm si ex alijs iam dictis causis oriretur. An-
 te uero sanguinis missionem, faeces sequenti enema edu-
 cantur: quo etiam uetetur laborans quoties aluus, ut con-
 uenit, excrementa non deiciet. Recipe cas. recens extra-
 ctæ, catholici, an. 3. vi. mellis rosa. col. 3. i. β. hieræ Gal. 3. β.
 olei com. 3. iij. Excipiantur iure communis enematum
 decocti, fiatq; enema, iniiciatur ante pastum. Eo cieto se-
 cetur

cetur uena, ut dictum est. Materia deinde concoquatur, & purgetur, in hunc quidem modum. Recipe serapij de bisant. serapij adianti, serapij stœchad. ana. ʒ. i. ʒ. stillatitiorum liquorum euphrasie, fœniculi, buglossi, ana. ʒ. iij. Misceantur, & diluculò bibantur à ieiuno per triduum. Recipe diamoschi dul. ʒ. ʒ. utatur cum serapijs. Reci. pil. cocci. pil. aggregat. pil. lucis maior, ana. ʒ. i. Excipiantur stillatio liquore euphrasie, finganturq; pil. v. sumantur circa noctis dimidium. Eoq; die domi manendum est, quod in alijs pharmacis ualentioribus, (etiam si non dicatur) obseruandum: sumendum quoque lotorium hora opportuna, quale supra frequenter commemoratum est. Recipe confer. acori col. confer. bugloss. ana. ʒ. iij. Misceantur, & postridie à ieiuno sumantur. His peractis utendum collyrijs sequentibus. Recipe muccaginis seminis psyllij extractæ in stillatio liquore rosarum, tragacanthæ, gummi Arab. an. ʒ. iij. liquidioris humoris albi oui diu agitati, q. s. Misceantur, fiatq; collyrium, quo utatur egrotus mane, & uesperis, si à bilioso sanguine hic affectus, ortus sit. Porro si appareat sanguinem ad oculos defluere à cranio, per uenas externas, id quod indicat uenarum frontis, & temporū amplitudo, adinoueatur sequens cataplasma fronti, & temporibus, repellendi facultate præditum.

Recipe boli Armeniæ, sanguinis draconis, terræ sigillatæ, mastich. ana. ʒ. i. ʒ. Misceantur cum albo oui, & aceto, fiatq; ut dictum est. Vbi uerò morbus hic in augmento fuerit, adhibeantur oculis repellentia cum paucis resoluentibus, siquidem dolor non uehemens ualde fuerit, qui si uehemens foret, sequenti narcotico mitigetur, cui non addatur opium, nisi magna ad hoc necessitas compulerit.

G 4 Recipe

DE MORB. INTER. CVR.

Recipe rosarum, balaufti, ana Manipulum. ꝑ. seminis
papaueris albi, ꝑ. ij. Decoquantur in aqua plantaginis,
huiusq; decocti ius oculo imponatur. Si uero dolor non
ita uehemens fuerit, sequenti collyrio utendum. Reci-
pe collyrij albi Rasis sine opio. ꝑ. ij. dissoluatur in stilla-
titio rosarum liquore, & lacte muliebri. Eodem autem
tempore lac mulgendum, collyrioq; miscendum, quo im-
ponitur oculo. Horis dein post tribus, aut quatuor la-
uetur oculus stillatitio liquore rosarum. rursum idem
collyrium imponatur, postq; lauetur oculus iure decocti
foenograci, bis, aut ter loti aqua frigida, ut ab arena
purgetur. Hoc autem pathemate in uigore existente, id
quod ex calore, & palpebrarum conglutinatione cogni-
tu est facile, sic illi medendum. Recipe tuthie præpa-
rata. ꝑ. ij. caphura, lycij, ana. ꝑ. ꝑ. puluerentur, & cum
stillatitiis liquoribus rosarum, & foeniculi fiat collyrium,
quo utatur egrotus mane, & uespere. Plurimum quo-
que conducit lac muliebri oculo impositum, calens qui-
dem, ut ab ubere exit. Si uero dolor infestet, & lippi-
tudo, propterq; humoris acrimoniam huiusmodi fa-
ctæ fuerint, discutientibus uti oportebit. & uisum cla-
rificantibus, qualis est puluis hic citrinus. Recipe sar-
cocollæ nutritæ. ꝑ. x. aloes, ꝑ. ij. myrrha. ꝑ. i. lycij. ꝑ. i. ꝑ. re-
digantur in tenuissimum puluerem, qui oculo impona-
tur, aut solus, aut in stillatitio liquore euphrasie dissolu-
tus. Non parui quoque momenti erunt. ꝑ. ij. foenograci
loti aqua frigida bis aut ter, in qua deinde cocti, si in ea
calente, panno lineo duplicato immerso, aut spongia fo-
ueatur oculus, deq; eo iure dum fit fatus, aliquid oculum
ingrediatur. Lauatio denique in balneo, declinante mor-
bo,

bo, aptissima est, si à calore originem habeat: nam fluxionem, quæ ad oculos fertur, sistit, eius maxima parte inter lauandum per totum corpus excreta, quod autem relinquitur, contemperatur. Ouum quoque coquendo duratum, calens oculo superpositum, materiam coquit, & digerit. Ophthalmia uerò à frigiditate orta declinante, uini meracioris potus ex usu est. Ophthalmia autem non uera, intemperies tantum est oculi calida, cum rubore paucò, citra tumorem, nisi à casu, aut percussione fuerit. Excitatur autem hoc mali à causis externis, ut à casu, aut percussione, à sole, à fumo, ex humorum à uehementi motu corporis agitatione. Causa autem ablata, hæc quoque passio quiescere solet, siquidem corpus purum fuerit. Principiò, quæcunque fuerit prædictarum causarum, in acre frigido morari conferet, lac quoque mulieris puerum lactantis, cum stillatio rosarum liquore, & albo oui diu agitati, oculo inpositum, utile admodum est: humores enim hæc ab oculis depellent, eorumq; motum repriment. Si in incremento hoc mali fuerit, iure decocti rosarum (ad repellendum fluentem materiam) & seminis fœnogræci (ad eam, quæ iam fixa est, resoluendam) foueatur oculus. Sin in uigore, solius fœnogræci decocti ius satis erit. Ad ruboris autem reliquias tollendis, ouum coquendo durum factum, oculoq; calens admotum, ut paulò ante dictum est, eas reliquias potenter digeret. Pomum quoque (modò adstringenti facultate non sit) aut putre, aut coctum, & calens appositum, idem præstabit.

LACHRYMARVM EX OCVLIS

manantium Curatio. Cap. XXVI.

Hæ

DE MORB. INTER. CVR.

HAE lacrymæ nonnunquam sunt calidæ, nonnunquam uerò frigidæ, sensu autem satis distinguuntur. Calidæ autem ab externis cranij uenis plerunque fluunt: quarum curationem ab hoc linimento auspicabimur. Recipe sang. draconis, boli Armeniæ, mastich. ana. unc. i. Misceantur cum albumine oui, & pauco aceto, fiatq; linimentum, quo frons & tempore linantur. Si plenitudo in uniuerso corpore apparuerit, incidatur externa cubiti uena eiusdem lateris: sanguisq; pro medici arbitrio mittatur. Humores deinde concoquendi hunc in modum, & purgandi. Recipe serapij uiolacei, serapij intybi satiui latioris, serapij nymphææ, ana. unc. i. ß. stillatitiorum liquorum cichorij, euphrasie, oxalidis, ana. unc. iij. Misceantur, & à ieiuno, appetente diluculo per triduum bibantur. Recipe elect. trium santalo. 3. ß. utatur cum serap. Recipe cas. recens extractæ. 3. select. de succo rosa. 3. iij. serapij rosa. purgatorij sine scammo. unc. i. Cum iure communis medicinarum decocti, addendo oxyphœn. unc. ß. fiat potio purgans, quæ sumatur ad auro-ram, coq; die domi manendum est, & lotorio superius frequenter memorato utendum.

Aut sic.

Recipe rhabar. selecti, drachm. i. ß. oxyphœnic. unc. ß. myrobalanorum confricatarum, ol. amygdal. dulc. drach. ij. ß. quæ in stillatitio liquore intybi satiui latioris, & pauco uino albo, horis xij. maccrentur, deinde expri- mantur: liquori expresso, adijce serapij ros. purgatorij sine scammon. 3. ij. elect. de succo rosa. 3. iij. stillatitij li- quoris intybi satiui latioris. q. s. fiat potio purgans, quæ sumatur ad auro-ram: ut dictum est.

Aut

Aut sic.

Recipe pilul. de quinque generibus myrobala. pil. aggregatiu. pilul. sine quibus, ana. ℥.i. Excipiantur stillatio liquore intybi satiui latioris, singanturq; pil. v. quæ circiter noctis dimidium sumantur. Recipe conser. rosa. ℥.β. sumatur postridie manè. Corpore purgato, sequens collyrium, oculis manè & uesperis impositum, opem non poenitendam afferet. Recipe cerusæ ablutæ, sarcocol. nutritæ, lycij, acaciæ, libani, ana. ℥.ij. ossium myrobala. adustorum, coral. albi, & rubr. ana. ℥.i. margaritar. ℥.β. succi mali punici ad dimidij absorptionem coacti, q. s. fiat collyr. quo utendum ut dictum est. Solus quoque malorum punicorum succus coctus donec dimidium absumatur, hasce lacrymas calidas curat. Præstat idem uua acerba combusta, & puluerata, & oculis imposita.

LACRYMARVM FRIGIDARVM Curatio.

Lacrymæ uerò si frigide fuerint, sic curentur. Recipe mel. ros. col. ℥.ij. serapij stœchad. ℥.i. β. Stillatiorum liquorum betonicæ, euphrasiæ, fœniculi, an. ℥.iiij. Misceantur, & à ieiuno bibantur diluculo per triduum.

Recipe elect. diamoschi dulc. ℥.β. utatur cum serapijs.

Recipe pil. cocci. pil. lucis maiorum, an. ℥.β. cum stillatio liquore euphrasiæ singantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Recipe Theriacæ ueter. ℥.i. conser. buglos. ℥.i. β. Misceantur, & sumantur postridie manè sex horis ante pastum. Utendum deinde sequenti puluere ad cerebrum exiccandum. Recipe cyperi, caryophyllorum. ana. ℥.ij. corticis citri sicci. ℥.iiij. styracis calamiz

DE MORB. INTER. CVR.

lamitidis. 3. i. β. cocci infectorii, coriandri præparati, ana.
 3. iij. sampsuchi sicci, betonica sicca, ana. 3. β. rosa. rub.
 3. ij. fiat pulvis, qui anteriori capitis parti inspergatur,
 cum ægrotus lectum ingreditur. Utetur & collyrio se-
 quenti. Recipe Thuris, mastich. nucis cypressi, myrrhæ,
 aloes, ana. 3. ij. tuthiæ præparatæ, sarcocol. nutritæ, ana.
 drach. i. β. sanguinis draconis, rhois absoniorum, bacca-
 rum oxyacanthæ, rosarum rub. ana. 3. i. puluerentur te-
 nuissimè, et excipiatur stillatio liquore fœniculi, fiatq;
 collyrium, quod oculo flenti manè, & uesperti impona-
 tur. Quod si lacrymæ perseuerarint, nec prædictis reme-
 dijs cesserint, utatur ægrotus pil. sequentibus. Recipe
 pil. asaiet. 3. ij. pil. lucis maiorum pilu. sine quibus. ana.
 3. ij. Excipiantur serapio stœchad. finganturq; 3. iij.
 pil. vi. è quibus sumantur tres, tribus, aut quatuor horis
 à cœna, semel per hebdomadam.

HYPOCHYMATIS CVRATIO.

Cap.

XXVII.

Causæ.

Hic affectus aut proprio oculi uitio contingit, aut
 per consensum eius cum cerebro, aut uentriculo, aut
 parte alia. Per consensum oculi cum cerebro plerunque
 fit ob frigiditatem, per quã spiritus uisorii imbecilli fiunt:
 senibus igitur, & ijs, qui longis laborarunt morbis magis
 euenit. Hæc quoque passio interdum ob uehementiorem
 fit uomitum, & ictum. Sæpenumero per oculi cum uen-
 triculo consensum nascitur. Cæterum hæc suffusio à ue-
 ra suffusione, quæ proprio oculi uitio contingit, sic disci-
 minanda est. Si enim hoc mali ob humorum in uentricu-
 lo contentorum uitium obortum fuerit, uterq; oculus si-
 militer afficitur. Quæ uerò oculo proprio pathemate
 affecto

affecto apparent, neque simul in utroque apparere oculo incipiunt, neque similiter accidunt. Ex ipso quoque tempore discernuntur. Nam si quatuor, aut etiam pluribus mensibus hypochymatos symptomata apparuerint, contemplantique tibi pupillam, tenebrosam apparuerit nihil, à stomacho hoc mali procedere non temere dices. Si uero non ita pridem suffusionis symptomata apparere coeperunt, rogandus aegrotus, an ex quo hoc mali incipit, singulis diebus perpetuo similiter apparere perseuerarint, nullo interposito die, quo hoc malum mitius fuerit, & an ullo aliquo die exacte conualuisse sibi uisus sit. Nam assiduitas suffusionem ueram, intermissio uero est stomacho prodixisse indicat. Quod enim uentriculus melius concoxit, hoc suffusionis symptomata oculis debilius apparere, & ubi perfecte concoxit, nullum sibi uisum apparere si fateatur aegrotus, manifestissimum est indicium, huius mali fontem uentriculum esse: idque multo magis, si cum uisa apparent, in ore uentriculi dolorem mordicus percipit: maxime uero, si remordente post hæc uomendo eiecta mitigata symptomata fuerint. Vbi uero pupillarum altera non exacte pura uidetur, sed tenebrosior, aut turbidior apparet, uerae suffusionis initium esse censendum est. Cuius causa est lentus & crassus humor, glaciei modo concretus, iuxta pupillam inter corneam & crystalloidem collectus: quo uisus eatenus saltem impeditur, ut rerum discretas species, neque colores possit apprehendere. Hoc inchoante malo ueluti pusilli culices oculis obuersantur: interdum quasi lucentia quædam corpuscula, interdum uti caliginosa oculis se offerunt. Nonnullis ueluti lanarum filamenta, & arancarum tela apparent: quibusdam circa
lucernas

DE MORB. INTER. CVR.

lucernas circuli uidentur. Aucto autem malo, sympto-
mata quoque augentur. Hic quidem affectus si per oculi
cum cerebro, aut uentriculo, aut parte alia consensum
cōtingerit, parti primario affectæ primū quidem pro-
spiciēdum, deinde oculo: ubi uerò proprio oculi uitio, ue-
raq; est suffusio, si quidem absoluta, confirmataq; fuerit,
solius ocularij Chirurgi ope curari potest, qui eam acu
puncto ad angulum paruum oculo deturbabit, modò nec
liquidior sit humor, nec oculi tunicis tenacius hæreat, sed
mediocri sit consistentia, quā oculo aliquantisper com-
presso facile est obseruare. Vbi uerò nondum absoluta
est, citra Chirurgi operam curari potest. Quoniā autem
huius mali materia uaporosa est, & aquosa, uictus ratio
tota sit calida, & sicca. Sit itaque aer, in quo uersatur
ægotus calidus, et siccus aut natura, aut industria: talem
enim, si desit, & igni, & suffitibus moliri possumus. Vi-
ctus sit attenuans & exiccans: estq; huic malo inedia sa-
lubris. Quòd si ægotanti nō satis sit comedisse semel, le-
uissimè saltem cœnet. A uino toto medicationis tempore
abstineat ægotus, aquam mulsam bibat, aut cinnamomi
decoctum. Fugiat pisces, fructus, iuscula, & deniq; quic-
quid corpus humectare potest. Curandi ratio, nisi si quid
obstet, à uenæ sectione auspicianda. Incidatur igitur cubi-
ti humeralis uena eiusdem lateris: aluo tamen prius mol-
lita enemate sequenti. Recipe chamæmeli, meliloti stœ-
chad. Arab. ana. P. ij. furfuris frumenti. M. ß. cuphrasie:
herbæ foeniculi, ana. M. i. seminum anisi, & foeniculi, an.
3. ij. Decoquantur in s. q. aquæ usq; ad dimidij absumptio-
nem. Recipiantur iuris cocti. libr. i. ß. catholici, sacchari
semel duntaxat decocti, an. 3. i. mellis anthosati. 3. i. ß. hie-
re

Victus
ratio.

Curandi
ratio.

re Galen. 3. vi. olei chamameli, olei de lilio¹, ana. unc. i.
 ꝑ. salis fossilis. 3. i. ꝑ. Commistis omnibus fiat enema, quod
 ante pastum iniiciatur: eoq; eiecto fiat, ut dictum est, ue-
 ne sectio, præsertim si plenitudo magna appareat, alio-
 qui non facienda, ne per eam refrigeratum cerebrum
 aquas largius cumulet, ac in oculum transfundat. Ene-
 mate autem proximè dicto semel in hebdomada toto me-
 dicationis tempore, reuulsionis gratia, utetur ægrotus.
 Materia deinde in hunc modum concoquatur, & uacue-
 tur. Recipe oxymelitos scillini, serapij conseruationis
 acori, serapij stœchad. ana. unc. i. ꝑ. Stillatitiorum liquo-
 rum fœniculi, betonica, euphrasie, ana. 3. iij. Misceantur,
 & à ieiuno diluculo per triduum bibantur. Recipe dia-
 moschi dul. 3. ꝑ. utatur cum serapijs. Recipe pil. cocci.
 pil. lucis maiorum, ana. 3. ꝑ. cum stillatitio liquore fœni-
 culi fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.
 Recipe theriaca uet. 3. i. conseruæ bugloss. 3. i. ꝑ. Miscean-
 tur, & postridie sumantur sex horis ante pastum. Vta-
 tur & pil. sequentibus ægrotus: ut dicetur. Recipe pil.
 asacret. 3. ij. pil. sine quibus, pil. lucis maiorum, ana. 3. i.
 agar. in pastillorum formam redacti. 3. ij. Excipiantur
 melle rosa. finganturq; è drachma pil. vi. è quibus suman-
 tur tres, horis quatuor à cœna, semel in hebdomada. Le-
 ctum quoque ingressurus ægrotas, anteriori capitis par-
 ti pulucrem capitalẽ inspergat. Utq; uapores à cibo pro-
 hibeantur ad cerebrum ascendere, utatur pulcre sequen-
 ti. Recipe coriandri præparati. 3. ij. anisi, fœniculi, ana.
 3. i. ꝑ. cinnamomi. 3. iij. euphrasie siccæ. drachm. ij. pul.
 diacydonitæ sine odoramentis. drach. ij. ꝑ. pul. sene. 3. ij.
 maccros. drac. i. sacchari ad pondus omnium, fiat pul. quo
 utendum

DE MORB. INTER. CVR.

utendum statim à pastu, nihil post bibendo. Ad robur quoque uisui addendum, magni momenti est sequentis electarij usus. Recipe euphrasie, betonicae, ana. ʒ. i. seminis foeniculi. ʒ. ij. cubearum, maceris, caryophyllorum, cinnamomi selecti. an. ʒ. i. succi rutae depurati. ʒ. i. mellis depurati libr. i. pulueranda puluerentur, deinde mel & succus simul decoquantur usque ad idoneam absorptionem, in fine autem decoctionis addantur pulueres supradicti, fiatque electarium molle, de quo castancae paruae instar sumatur quotidie mane, quando aliud sumendum non est. Hoc praeterea cauterium occipitio, aut post aures appositum mirifice confert. Recipe cantharid. vi. abscissis capitibus et alis, misce cum fermento, admoueantur alteri locorum supradictorum, ibique teneantur, donec uesicae existant, quibus ruptis, applicentur ficus cum melle permixtae. Maneant autem apertae, si fieri potest, quinque aut sex mensibus. Adhaec sequentibus etiam collyrijs utendum. Recipe Stillatitij liquoris mel. libr. i. de quo guttam unam, aut alteram affecto oculo impone mane & uespere. Aut hoc utatur egrotus, quod multo uehementius est. Recipe pul. capitum hirundinum. ʒ. i. dissoluatur in stillatitio liquore mellis, & fiat collyrium, quod oculo, ut dictum est, imponatur. Fortius autem fiet, si adijciatur zinzib. ʒ. ʒ. Aut hoc utatur, praedictis longe ualidius. Reci. fellis perdicis, fellis bouis, ana. ʒ. ij. succi foeniculi depurati. ʒ. i. cum stillatitio liquore mellis fiat collyrium, quod oculo mane & uespere imponatur. Quod si inde nimius in oculo ardor oriretur, lac mulieris in oculum mulgeatur. Priusquam autem quis dictis collyrijs utatur, fumum decoctionis foenogr. maluarum, & althaeae oculis sustineat.

Aut

Aut sic fiant.

Recipe fœnogr. aqua frigida loti. \mathfrak{z} .i. β . seminis lini. \mathfrak{z} . β . seminis althææ. \mathfrak{z} .iij. conterantur, deinde pannis raris insuantur in sacculorum modum, acu interpunctorum, quibus aquæ calidæ immersis, foveatur oculus ante collyriorum impositionem.

FISTVLÆ LACRYMALIS

Curatio. Cap. XXVIII.

ORitur nonnunquam cauernosum quoddam hylcus in oculi angulis, cum foramine paruo, aliquando non sensili, cuius latera callosa sunt. Curari autem nullo pacto potest, nisi callositas illa prorsus auferatur. In maiore oculi angulos magis quàm in minore id fieri contingit, quòd in illo natura constituerit carnem quandam à cerebro prodeuntē, humiditatis retinendæ gratia, quæ humectando oculo necessaria est, qui in uigilijs semper mouetur. Exemplo nobis sunt duæ illæ glandulæ, quas in laringe ad humectandam linguam natura produxit. In minore autem oculi angulo caro talis non habetur. Atque hæc quidem caro pars est spermatica, regenerari igitur nequit. Ad hanc interdum maior quam par est aquæ copia confluit, quæ ibidem tandem putrescit: putrefacta, uicina sibi loca sua acrimonia erodit, hinc hylcus illud cauernosum fit, cuius latera indurantur. Sæpius autem à materia sit frigida, cuius curatio à concoctione humorum & purgatione auspicianda. Recipe scrapij stœchados, scrapij buglossi, mel. rosa. col. an. \mathfrak{z} .i. β . stillatitiorum liquorum fœniculi, betonicæ, lupi salictarij, ana. \mathfrak{z} .iij. Miscantur, & à ieiunio ad auroram, per triduum bibantur. Recipe diamoschi dul. \mathfrak{z} . β . utatur cum scrapijs. Recipe pil.

H

ag=

DE MORB. INTER. CVR.

aggregat. pil. cocci, pil. lucis maiorum, ana. \mathfrak{z} .i. cum stilla
titio liquore euphrasie, fingantur pilul. v. quæ circa non
etis dimidium sumantur. Recipe mithridat. \mathfrak{z} .i. conser-
ue buglossi, \mathfrak{z} .i. β . Misceantur, & postridie mane suman-
tur sex horis ante pastum. Utendum deinde puluere ca-
pitali sequenti. Recipe pul. capitalis, \mathfrak{z} .ij. adijce santali
citri, baccarum myrti, an. \mathfrak{z} .i. β . hæc puluerata & commi-
sta inspergantur anteriori capitis parti ægroti lectum
ingressuri. Lauandum præterea cauernosum hoc hulus
sequenti decocto, quoties à Medico ægrotum uisente rete-
getur. Recipe eupatorij, balaustij, fol. oliuæ, rutæ, par-
tes æquales. Decoquantur in uino rubro, hoc decocto la-
uetur hulus, ut dictum est. Quoniam autem foramen
paruum est, immittatur turunda de gentiana, aut spon-
gia, aut stupa, hermodactylorum puluere aspersa. Colly-
rio denique sequenti utetur. Recipe aloes, thuris, ana. \mathfrak{z} .
i. sarcocol. nutritæ, balausti, antimonij, sang. draco. alumi-
nis, ana. \mathfrak{z} .i. β . æruginis æris rasilis gra. v. cum decocto gal-
larum uiridium permisceantur, & guttæ tres alia post
aliam cum aliquo interuallo in hulceris foramen immit-
tantur. Iaceat deinde æger super partem oppositam
horas tres, aut quatuor. Post priorem purgationem, to-
to medicationis tempore, & aliquot etiam post mensibus,
utetur pilul. sequentibus. Recipe pilul. asacir. \mathfrak{z} .ij. pilul.
fumariæ, pil. lucis maiorum, pilul. sine quibus, ana. \mathfrak{z} .i.
cum serapio stœchad. fingantur è drachma pil. vi. è quibus
sumatur tres, tribus, aut quatuor horis, à cœna semel
in hebdomada.

SVRDITATIS CVRATIO.

Cap

XXIX.

Surdis

Surditas si à primo statim ortu hominem comitata fuerit, curationem non admittit. Si uerò non multò ost ortum, hominem prehenderit, fueritq; absoluta, immedicabilis quoque manet. Quæ uerò surditas absoluta uidem non est, diuturna tamen, aut curationem non admittit, aut sanè quam ægrè curatur. Omnes autem surditas aut ob biliosum humorem sursum uergentem continet, aut ob crudos crassosq; humores, auditum obstruentes. Si igitur ex crudis, crassisq; humoribus surditas pronata fuerit, non absoluta, neque ita diuturna, curari potest. Curatio autem ab humorem concoctione, & euacuatione auspicienda. Recipe oxymelitos scillini, 3. i. ʒ. serapij stœchad. 3. iij. iuris decocti betonicæ, sampsuchi, melissophylli, 3. viij. (Tempore autem hyberno, cùm herbarum copia non est, stillatitijs liquoribus utendum.) Misceantur, & à ieiuno bibantur diluculò per triduum, & essperi, cùm lectum ingredi uolet ægrotus. Repetantur altero triduo, si non satis concocti humores uideantur. Recipe diamoschi dul. sesquiunciam, utatur cum serapijs. Recipe electa. indi maior. 3. iij. cathol. 3. vi. serapij stœchad. 3. ʒ. Excipiantur iure communis medicinarum decocti, adiiciendo florum roris marini, & stœchados, ana. ʒ. i. fiat potio, quæ hora quarta matutina sumatur.

causæ.

Curandi
ratio.

Aut sic.

Recipe pil. cocc. 3. i. cum stillatitio liquore betonicæ ingantur pilul. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Recipe theriacæ ueter. ʒ. ij. conferuæ florum stœchad. conferuæ buglossi, ana. 3. i. ʒ. Misceantur, & postridie sumantur sex horis ante pastum. Similiter uacuetur ægrotus singulis mensibus: tempore autem intermedio uta

H 2 tur

DE MORB. INTER. CVR.
tur errhinis, apophlegmatismis, gargarismis, & sternu-
tamenta cientibus sequentibus.

Errhina.

Recipe succi sampsuchi, \mathfrak{z} .iij. uini albi, \mathfrak{z} .i. β . staphidis
agriæ pyrethri, ana. \mathfrak{z} .i. Misceantur, pulueratis pulue-
randis, & fiant errhina. Sinapi quoque, quo in mensis
uti solemus, in uino dissolutum, & naribus attractum,
idem præstabit.

Apophlegmatismi.

Recipe mastich. \mathfrak{z} .i. piperis, pyrethri, ana. sesquidrach-
mam. Misceantur, & per horæ dimidium manducen-
tur idq; ante pastum.

Sternutamenta cientia.

Recipe pyrethri, zinzib. ana. \mathfrak{z} .ij. ellebori albi, \mathfrak{z} .i.
fiat ex his commistis puluis, qui stando in nares immittat-
tur, quæ mox paulisper claudantur, idq; ante pastum fiat.

Gargarif-
mus. Recipe origani, calaminthæ, sampsuchi. ana. \mathfrak{M} .i. stœ-
chados Arab. \mathfrak{P} .i. β . sinapi, \mathfrak{z} .ij. Decoquantur in \mathfrak{s} .q. aquæ,
donec dimidium absumatur, accipiatur iuris decocti lib. i.
in qua dissoluantur oxymelitos scillini, \mathfrak{z} .ij. hieræ Gal. \mathfrak{z} .
 β . fiat gargarismus, quo utatur manè ante pastum. Utat-
tur quoque egrotus sequenti puluere statim à pastu,
prohibente fumos, & uapores ad cerebrum efferri. Re-
cipe coriandri præparati, \mathfrak{z} .ij. cari præbulliti in aceto,
anisi, fœniculi, cinnamomi selecti, ana. \mathfrak{z} .i. pul. diacydoni-
tes sine speciebus, \mathfrak{z} .iij. sacchari ad pondus omnium, fiat
puluis, quo utendum in fine pastus, multoq; post tempore
à potu abstinendum. Inspergat etiam puluerem capita-
lem anteriori capitis parti lectum ingressurus. Præte-
rea singulis hebdomadibus semel sequentibus pilul. uten-
dum.

dum. Recipe pilul. asaieret, agar. in pastillorum formam redacti, ana. ʒ. ij. cū oxymelite scillino fingatur ē drachma pil. vi. ē quibus tresumat egrotus cū lectū ingredi uolet, horis à coena tribus, aut quatuor. His peractis; præstedijs topicis utendum. Recipe olei amygdal. amararum, olei nardini, ana. ʒ. i. ʒ. succi cepæ. ʒ. ij. duæ ex his commistis guttæ tepide in aurem affectam immittantur manè, & uesperī. Aut sic fiat, & multo maioris est energiae. Recipe ellebori albi, instar ossis dactyli, misceantur cum melle, guttæq; una tepida in aurem manè, & uesperī immittatur. Aut aristolochiæ rotundæ, ʒ. ʒ. dissoluatur cum oleo baccarum lauri, unaq; aut altera gutta in aurem, ut dictum est, immittatur.

SVRDITATIS A CAU-

sa calida. Curatio.

Surditas à causa calida, ut à biliosis humoribus sursum uergentibus, plerunque post febres contingit, & nonnunquam malum hoc sua sponte soluitur, bile inferius descendente. Quòd si citra febrem hoc mali contigerit, bilioso abundante sanguine, qui sursum ascendens auditus meatus obstruxerit, à uenæ sectione curatio inchoanda. Incidetur igitur humeralis cubiti uena lateris eiusdem, si auris una altera magis sit affecta: si uerò utraq; ex æquo, ex humerali brachij dextri, sanguis mittatur. Materia deinde concoquatur, & uacuetur in hunc, aut similem modum. Recipe serapij uiolacei, serapij nymphaeæ, serapij intybi satiui latioris, ana. ʒ. i. ʒ. stillatitiorum liquorum cichorij, oxalidis, buglossi, an. ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuno bibantur diluculo per triduum. Recipe elect. trium santalo. ʒ. ʒ. utatur cum serapijs. Si egrotus rerum inops

H 3 sit,

DE MORB. INTER. CVR.

fit, hac uacuetur potione purgante. Recipe elect. de succo rosa. 3.ij. serapij rosat. purgatorij, 3.ij. excipiantur stillatitio liquore intybi satiui latioris, & nymph. fiatq; potio, quæ sumatur hora quartamatutina. Si uerò diues sit, hoc uacuabitur modo. Recipe rhabar. selecti. 3.iiij. oxyphœnicwn. 3.ß. macerentur in stillatitio liquore intybi satiui latioris, & pauco uino albo horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adiectisq; serapij rosatei purgatorij. 3.ii. fiat potio purgans, quæ sumatur ut dictum est.

Aut sic.

Recipe cas. recens extractæ. 3.ß. oxyphœnicwn. 3.iii. electarii de succo rosa. 3.ii.ß. cum sacch. fingatur bolus, qui antelucano tempore sumatur. Diuiti autem egroto pro elect. de succo rosa. substituuntur. 3.iiii. rhabar. Recipe conser. rosa. 3.ß. sumatur postridie manè. Remediis deinde localibus utendum est. Recipe ol. uiolacei, ol. nymphaeæ, ana. 3.i. Misceantur, duæq; guttæ tepidæ in aures manè, & uespèri instillantur.

Aut sic.

Recipe stillatitii liquoris lactucæ, aquæ uitis, quæ defluit cum putantur uites, ana. 3.ii. Misceantur, duæq; guttæ tepidæ in aures demittantur. Aut de lacte muliebri cum oui albo permisto similiter fiat.

Aut sic.

Recipe collyrii albi Rasis sine opio. q.v. misceatur cum lacte muliebri, in aures, ut dictum est immittatur.

Aut sic.

Recipe maluarum, foliorum uiolarum, foliorum salicis, foliorum altheæ, foliorum lactucæ, ana. M.i.

Deco.

Decoquantur in aqua, fumus in aures per infundibulum recipiatur.

PAROTIDVM CVRATIO.

Cap. XXX.

Tumores in glandibus, quæ auribus adiacent, emergentes. Parotidas appellare solemus. Oriuntur autem aut à sanguine copioso, calido: aut à bilioso: aut à pituitoso: aut à melancholico. Quæ à feruentis sanguinis copia existunt, phlegmonas referunt, uehementissimosq; pariunt dolores. Quæ à bilioso sanguine, erysipelata referre uidentur, nec ægrotum grauiter excruciant. Quæ autem à melancholico excitantur sanguine, duriuscule quidem sunt, cæterum nihil rubent, dolorq; non magno ægrotantem afficiunt. Quæ uerò à pituitoso sunt sanguine, fastigiatae tument. Oriuntur interdum Parotides citra capitis affectum à reliquo corpore per morbos, maxime per febres, morbi impetu illhuc per crissim conuerso, & tunc naturæ auxiliandum attrahentibus, nisi magno cum impetu influxus irrueret, tunc enim nihil tentandum, sed totum naturæ permittendum, eaq; facienda, quæ paulò post dicentur. Oriuntur plerunque ex capite, humoribus scilicet ei impactis, & se per eam partem expurgante. In Parotidibus non utendum inter initia repellentibus, & astringentibus, ac infrigidantibus, quale est ol. rosaceum, sed contrà attrahentibus (idq; corpore purgato,) cum natura pigra est. Nam si uehementi, ut dictum est, impetu influxus irrueret, nihil tentandum, totumq; naturæ permittendum, ne si aut cucurbitula, aut medicamenti admotis maior humorum copia ex alto ad cutem attraheretur, uehementior dolor hominem ap

Signa.

Cause.

Curandi
ratio.

DE MORB. INTER. CVR.

prehendat, unde subortis uigilijs, febribusq; intensiori-
bus effectis, uires exoluantur. Non igitur maior influ-
xus promouendus, sed dolor qui uehemens est, ubi causa
est calida, anodynus, hoc est medicamentis temperatè ca-
lidis ac humidis, mitigandus, corpore tamen prius uacua-
to, nisi doloris uehementia, ante corporis uacuationem,
doloris mitigationem postulet. Quæ quidem uacuatio,
hoc affectu non per crism oborto, à sanguinis missione
inchoanda est, facibus prius enemate iniecto eductis.

Recipe cas. recens extractæ, sacchari semel duntaxat
cocti, an. ʒ. i. olei uiolacei. ʒ. iij. cum decocto maluarū, alth.
uiol. betæ, prunorum, & quatuor seminum frig. fiat ene-
ma, quod ante pastum iniiciatur, eoq; eiecto incidatur
externa cubiti uena eiusdem lateris, sanguisq; pro ple-
nitudine, & uiribus mittatur. Vacuetur deinde, si pau-
per quidem sit, in hunc modum. Recipe serapij rosat.
purgatorii. ʒ. ij. elect. de succo rosa. ʒ. ij. cum stillatitio li-
quore intybi satiui latioris. q. s. fiat potio, quæ sumatur
hora quarta matutina. Si uerò diues sit, sic purgetur.
Recipe rhabar. select. ʒ. iij. oxyphœnicæ n. ʒ. vi. Mace-
rentur in stillatitio liquore intybi satiui latioris, & pau-
co uino albo, horis xij. Deinde exprimantur, et colentur,
adiectisq; serapij rosacei purgatorii. ʒ. i. ʒ. elect. de succo
rosa. ʒ. i. fiat potio, quæ sumatur, ut dictum est. Corpore
uacuato, dolore uehementi manente anodyna hunc in mo-
dum admouenda. Recipe uitellos ouorum ij. butyri re-
centis. ʒ. i. ʒ. olei oliuarū loti aqua calida. ʒ. ij. muccaginis,
seminis lini & fœnogræ. ana. ʒ. ij. Misceantur, & loco
dolenti admoueantur. Anodyna statim adhibenda sunt,
cum per crism impetu morbi illhuc conuerso, dolor est
uehe-

LIBER PRIMVS. 61

vehemens, siue multus sit humor, siue paucus, sed calidus, & interdum uenenosus. Mitigato dolore, humoreq; non cum impetu irruente, sed paucis, & eo maligno existente, naturaq; manente pigra, attrahentia apponenda, quibus si non satis pareat, cucurbitula affigenda. Tumor deinde suppurationem medicante, siue per crissim sit, aut secus discutientibus simul, & suppurantibus medicamentis utendum, quibus aut discutietur, aut ad suppurationem perducetur. Fiat igitur in hunc modum. Recipe pollinis. ℥.ij. farinae seminis lini, & fœnogræ. ana. ℥.i. β. axungia recentis porci. ℥.iij. carycarum pinguium incisarum. ℥.β. Misceantur cum decocto maluarum, althææ, & florum chamæmeli, fiatq; cataplasma, quod loco dolenti apponatur.

PAROTIDVM A FRIGIDA

causa, Curatio.

Parotidum uerò causa frigida cum fuerit, ut quia à sanguine pituitoso, aut melancholico, curatio à materia concoctione auspicanda. Recipe mel. rosacei col. oxymelitos scyllini, serapij, stœchados, an. ℥.i. β. stillatitiorum liquorū, betonica, melli ssophylli, buglossi, an. ℥.iij. Misceantur, et à ieiuno per triduum diluculo bibantur.

Recipe diamoschi dul. ℥.β. utatur cum serapijs. Recipe pil. cocci. ℥.i. cum stillatitio liquore betonica, fingantur pil. v. quæ sumantur circiter noctis dimidium.

Aut sic.

Recipe cathol. ℥. semissim, diaphœnici. ℥.iij. serapij stœchad. sesquiunciam. Excipiantur iure communis medicinarum decocti, cui tamen adijcere oportet stœchad. Arab. florū roris marini, an. P. i. fiatq; potio, quæ antelu-

H 5 cano

DE MORB. INTER. CVR.

cano tempore sumatur. Recipe theriacæ ueter. drach. i. conseruæ bugloss. drach. ij. Misceantur, & post ridie mane sumantur, siue potionem, siue pilul. egrotus sume pferit. Inspargatur deinde capitis pars anterior paluere capitali, cum lectum dormiturus ingredi uolet. Topica præterea post hæc adhibenda præsidia. Recip. olei de lilio, olei chamæmeli, ana unc. ij. Misceantur, & doloris locus illis calidis ungatur.

Aut sic.

Recipe axungie antiquæ (quantò enim antiquior, tantò calidior) anseris, & gallinæ, ana uncias duas, olei de lilio, & mellis, ana sesquiunciam. Misceantur, & illis calidis locus doloris inungatur.

Aut sic.

Recipe fimi caprini, unc. ii. decoquatur in uino, deinde addatur oleum de lilio, & mellis, ana sesquiuncia. Quibus commistis ungatur locus doloris. Quòd si discuti non possint, sed suppurari sit necesse, fiat ut sequitur. Recipe ceparum sub cineribus coctarum, unc. iii. farine fœnogræ. farine orobi, farine seminis lini, ana sesquiunciam. Permisceantur simul cum oleo de lilio, fiatq; cataplasma, quod apponatur. Senecio quoque herba supurationem accelerat. Dura nonnunquam materia illa efficitur, tenuiore exhalato humore, remanetq; circa aures pro parotidibus quædam cheradum species, quas sic curabis. Recipe seminis sinapi, seminis urticæ, sulfuris, spumæ maris, aristolochiæ rotundæ, bdellii, ammoniaci, ana. unc. ß. olei antiqui, ceræ, q. s. fiat emplastrum: diachyli, cui iris adiecta sint, unc. iii. additis. De quo super alutam pro magnitudine loci, ubi materia illa

la

la induruit, emplastrū fingendū, admouendumq; & decimoquinto quoq; die mutandum. Hoc autem emplastrū incredibilis est efficaciæ ad cheradas, nodos, & scirros.

HAEMORRHAGIAE E' NARIBUS

Curatio. Cap. XXXI.

Sanguinis e' naribus profluium, si criticum fuerit, sisti non debet, nisi copia uires prosternat. Agnoscimus autem criticum esse, ex morborum, qui præcesserunt constitutione. non criticum uerò sistendum: cuius causæ possunt esse partim externæ, ut casus ex alto, percussio, uehemens exercitium, aut longa in Sole mora: partim uerò internæ, ut sanguinis copia, qui cum impetu ruit ad ora uenarum, quæ sunt in capite & naribus, quas referrat, idq; maxime si acrem quampiam qualitatem habeat, qua uenarum ora erodit. Tenuitas quoque sanguinis huius profluij in causa esse potest. Sanguine etenim tenuato, tunicis oris uenarum rarefactis, sudoris instar transmittitur. Victus ratio si refrigerans, & uias per quas sanguis fertur astringens. Versetur in aere frigido aut natura, aut arte parato per acetum, stillatitium liquorem rosarum, folia uitis, rubi, salicis, nymphae, uio-
larum. Cibi sint boni succi, glutinosi tamen, qui sanguinē incrassent (præsertim ubi biliosus est & tenuis) quales sunt pedes, capita uituli, ueruecis, aliorumq; animalium, caseus recens, & pinguis. Coquantur cibi in aqua chalybata, sumantur autē ex omphacio, uino malorum punicorū, et aranciorū ad infrigidandum glaciandumq; sanguinem, ut sic ad fluendum reddatur ineptior. Idem præstat esus lactucarum, & portulacæ, utriusque intybi, quæ uias etiam densant, & contrahunt p quas sanguis fluit. Vino utendū crasso.

DE MORB. INTER. CVR.

crasso, & rubro, aqua chalybata diluto, non albo & tenui. Quiescendum tum corpore, tum animo: motus etenim utriusque humores exagitat, & ad fluendum concitat.

Curandi
ratio.

Curandi ratio ab ijs præsijs, quæ sanguinem ad alias corporis partes auertunt, inchoanda. Primum igitur si uires, ætas, & cætera sæpius memorata permiserint, incidatur cubiti lateris eiusdem uena externa, nec magna sanguinis quantitas detrahatur. Hora autem una intermissa, rursum modicè detrahes: sicq; post iterum atque iterum cum interuallo pro laborantis uiribus. Illis enim interuallis spiritus regenerantur, & uires reficiuntur, fricationes ualide manuum, brachiorum, et crurum plurimum conducunt. Cucurbitule quoque magnæ hypochondrijs affixæ, si ex dextra quidem nare super iecur, si ex sinistra uerò profluat sanguis super lienem, si ex utranque, super utrumque, erumpentem sanguinem potenter retinent. Collo quoque & inter scapulo cum scarificatu in fortibus, sine scarificatu in debilibus affixæ cucurbitulæ plurimum conferunt. Præterea uincula dolorifica brachijs, & cruribus iniecta, fluentem auertent sanguinem. His peractis, uacuanda bilis, quæ sanguini permista ipsum acriorem, tenuioremq; reddit, in hunc modum. Recipe serapij rosacei de rosis siccis, serapij ex cotoneis, serapij myrthæ, ana. ʒ. i. β. Stillatitiorum liquorum, portulacæ, oxalidis, plantaginis, ana. ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Recipe elect. trium santalo. ʒ. β. utatur cum serapijs. Recipe rhabar. selecti puluerati. ʒ. i. serapij rosacei purgatorij infusione rosarum. ʒ. ij. excipiantur stillatio liquore portulacæ q. s. fiat potio purgans, quæ sumatur in aurora. Adhibeatur deinde me-
dica

dicamenta astringentia fronti, & parti capitis anteriori hunc in modum. Recipe boli Armeniæ, sang. dracon. ana. ʒ.ij. cum albo oui, & succo plantaginis fiat cataplasma, quod partibus antè dictis admoueatur, & præterea etiam testiculis, si uir fuerit: si uerò mulier, mammis. In nares uerò sequentia medicamenta immittantur: Recipe thuris partes duas, aloes partem unam, in puluerem redigantur, deinde subigantur cum albo oui, & mollißimis pilis leporinis adiectis, fingatur turunda, quæ in nares immittatur. Quoties in nares medicamentum quodpiam immittitur, os liquore aliquo implendum est, puta, uino, uel aqua, ne in ipsum de medicamento quicquam incidat. Hoc quoque eximie conducit. Recipe pollinis, succi polygoni, succi plantaginis, ana. ʒ. i. ʒ. succi stercoris asinini. ʒ. ij. Misceantur, & turunda de lineo panno facta his madefacta in nares immittatur. Solum etiam stercus asinum aceto dissolutum, in nares immixtum sanguinem sistere compertum est. Idem præstat stercus porci, sed asinino debilius. Succus menthæ, succus ocymi sanguinis quoque fluxum cohibent. Omni sanguinis e naribus profluuio frigida medicamenta hepatis admota immodicè conferunt, qualia sunt hæc. Recipe stillatiorum liquorum intybi satiui latioris, rosarum, oxalidis, ana. unc. v. omnium santalo. ana. ʒ. i. trochisco. de caphura. drachm. i. ʒ. seminum oxalidis, portulacæ, intybi satiui latioris, ana. scrup. ij. spicæ nardi (ad naturalem partis temperiem tuendam) scrup. i. aceti parum. Misceantur, fiatq; hepatis epithema manè & uespè tepide.

Aut sic fiat.

Recipe

DE MORB. INTER. CVR.

Recipe cerati santalini. ℥. v. olei nymphaeae, olei rosacei. an. ʒ. ij. lauentur haec olea accuratè aqua frigida, deinde parum aceti addatur, cum spica nardi. ℥. i. Commista haec hepatis regioni tepidè admoucantur manè.

DIONYSII FONTANA

NONI DOCTORIS MEDICI

Mompessulensis. De morborum
internorum curatione.

LIBER SECVNDVS.

CYNANCHES CVRATIO.

Cap. I.



ST autem hic morbus inflammatio quædam in gutture, aut faucibus. Mælum autem est exitiosum admodum, atque acutissimum: uitæ nanque præsentaneum discrimen strangulatu infert. Latinis hoc mali Angina dicitur, cuius quatuor sunt differentie. Aut enim fauces, hoc est locus, ubi asperæ arteriæ, et gulæ partes extremæ conueniunt, inflamman-
tur: aut neque fauces, neque reliquæ oris partes, neque ulla externarum inflammata apparet, periculum tamen suffocationis in gutture percipit ægrotus: aut extrinsecus circa fauces inflammatio apparet: aut gutturis partes et internæ, et externæ similiter affectæ sunt. Superest et alius cervicis affectus, ubi cervicis uertræ ad
anterio

anteriorē colli partē luxantur, apparetq; in ceruice
 cavitās, percipiturq; dolor, si extrā attingatur. Inten- Causa.
 sos excitat angina dolores, cū à sanguine sit copioso, Signa.
 & calido. Spiritum non nisi recta ceruice, aut aegrē ad
 modum trahunt. Hiant ore aperto, atque ita aerem at-
 trahunt. Rubet plerunque facies, & collum cum tumo-
 re, & transglutienti difficultate, febreq; interdum labo-
 rant. Post quartum diem aut suppuratur, aut occidit.
 Auxilium ergo omnis præceptis Angina requirit. Fiat igi-
 tur uenæ exterioris cubiti sectio, eiusdem lateris cum
 parte, quæ magis affecta uidetur. Parcè autem, non con-
 fertim, sed interpositis interuallis detrahatur sanguis.
 Ex cumulata enim sanguinis missione, & non repetitis
 uicibus facta, periculum imminet leicothymie, & mate-
 riæ è faucibus ad pulmonem defluxus. Post has repetitas
 sanguinis missiones, eodem die uena, quæ sub lingua est,
 incidatur, præsertim si fluxio constitisse uideatur. Ante
 tamen dictas omnes sanguinis missiones, molliatur aluus
 enemate sequenti. Recipe cas. recens extractæ. 3. x. sacc.
 semel duntaxat cocti. 3. i. ol. uiolacei. 3. iij. cum iure com-
 munis enematum decocti fiat enema, quo immisso, et emis-
 so mittatur sanguis, ut dictum est. Postridie non expecta-
 ta humorum concoctione, propter periculum ex breuita-
 te temporis, sumat sequentem potionem purgantem.
 Recipe cas. recens extractæ. 3. vi. serapij uiolacei. 3. i.
 elect. de succo rosa. 3. ij. Excipiantur iure communis me-
 dicinarum decocti, adiecta oxyphœnicōn. 3. i. fiat potio,
 quæ sumatur hora quarta matutina. Quod si neque phar-
 macum, neque cibum sumere posset, ob dolorem, uia-
 rumq; angustia, affigatur supra secundā ceruicis uerte-
 bram

DE MORB. INTER. CVR.

bram cucurbitula:uias enim dilatabit, sicq; minore mo-
 lestia & cibum, & pharmacum cum offeretur sumet.
 Hocq; fiat, quoties horum alterum faciundum erit.
 Quod si neque sic quicquā transglutire queat, pro phar-
 maco iniiciatur sequens enema. Rec. cas. recens extra
 ctæ. sac. semel duntaxat cocti. an. 3. i. elec. de succo ros. 3. ʒ.
 ol. uiol. 3. iij. cū iure cōmunis enematū decocti fiat enema,
 quod iniiciatur, ut dictum est. Primo die ad dolorum, qui
 uehementes sunt, mitigationem, utendum gargarismo se-
 quenti. Recipe balaustiorum, psidia, gallarum, rhois
 obsoniorum, ana. 3. i. Decoquantur in stillatitio liquore
 plantaginis, accipiatur iuris decocti libr. i. in qua dissol-
 ue diamor. & dianuc. ana. 3. ij. (postrema hæc duo iuuant
 inflammationes oris, uue, & anginae; melle uerò rosar.
 die primo non utendum, ne inflammationem augeat) fiat
 gargarismus, quo morbi die primo utetur. Vbi eo semel
 atque iterum, aut etiam pluribus uicibus, usus fuerit, po-
 terunt addi (perseuerante dolore) serapij uiolacei. 3. ij. &
 eo gargarismo reliquo eiusdem diei tempore utetur. Ha-
 beat in ore diatragacantham frigidam. Sacculi quoque
 milio, & sale torrefactis pleni capiti apponantur. Eo-
 dem die pars colli anterior ungatur ol. chamæmel. aut ol.
 oliuarum calido, lana deinde succida tegatur. Repellen-
 tia in nullius anginae specie exteriùs admota cōueniunt.
 Secundo die utendum gargarismo sequenti, post potionem
 purgantem, aut enema, si potionem sumere non potuit.
 Recipe lentium non excorticatarum, balaustiorum,
 psidia, gallarum, ana. 3. i. rosa. rubr. P. i. Decoquantur
 in s. q. aquæ, donec dimidium absumatur. accipiatur iuris
 decocti lib. i. in qua dissolue diamor. dianuc. an. 3. i. ʒ. mel.
 ros.

ros.col. 3.i. (ad abstergendum) lactis mulieris, uel asine
 (propter dolorem) 3.ii. cas. recens extractæ. 3.ß. His com-
 mistis fiat gargarismus, quo utatur. Oleis uerò sequenti-
 bus colli partem anteriorem exterius calidè ungat, & po-
 steriorem: deinde lana succida tegatur. Recipe ol. de li-
 lio. ol. chamæmeli, ana 3.i.ß. fiat, ut dictum est. Tertiò
 uerò die sequenti gargarismo utendum erit. Recipe ca-
 ryas pingues. vi. balausti. 3.i. dactylos. ij. seminis lini, se-
 minis fœnog. an. 3.ß. Decoquantur in s. q. aquæ, donec ab-
 sumatur dimidium. accipiatur iuris decocti libr. i. in qua
 dissolue cas. recens extractæ. 3.ß. myrrhæ. 3.ii. croci 3.ß.
 lactis mulieris (propter dolorem) 3.ii. fiat gargarismus.
 Exterius autem admoucantur sequentia. Recipe nidi
 hirundinis. 3.iii. subigantur cum oleis de lilio, & amy-
 gdal. dul. fiatq; cataplasma, quod anteriori colli parti ad-
 moucatur. Quarto die gargarismo sequenti utatur
 egrotus. Recipe dactylos. ii. carycarum pinguium. 3.ß.
 chamæmeli. P. i. seminis lini, seminis fœnogræci, ana. 3.i.
 Decoquantur in s. q. aquæ, usque ad dimidii consumptio-
 nem, recipiatur iuris decocti libr. i. in qua dissolue pulue-
 ris hirundinum. drachm. iii. myrrhæ, drach. i.ß. croci.
 drach. ß. mel. com. 3.i.ß. fiat gargarismus. Quoniam
 autem eo die angina supurari solet, igitur post priorem
 gargarismum sequenti utetur. Recipe iuris decocti pro-
 ximè dicti libr. i. in qua dissolue uini cocti unc. ii. ster-
 coris asinis desiccati & puluerati. unc. i. fiat garg.
 Vbi suppurata uidebitur angina, addatur gargarismis
 sinapi & pyrethri, an. 3.i.ß. Abscessus autem ubi ru-
 ptus fuerit, gargarismi fiant ex hydromelite ad ab-
 stergendum, & mundificandum. Exterius autem appli-
 cetur

DE MORB. INTER. CVR.

cetur cataplasma sequens. Recipe pollinis. ℥. iij. farinæ seminis lini, farinæ seminis fœnogr. an. ℥. i. carycarum contusarum. ℥. β. nidi hirundinis. ℥. i. β. subigantur cum oleo de lilio, fiatq; cataplasma, quod anteriori colli parti sub mento apponatur. Victus in hoc affectu sit exquisitissimus, & refrigerans. In aere frigido moretur egrotus. In ediam biduo, si vires ferre possunt, sustineat: si minus, sola aqua mulsa pro cibo per triduum utatur. Quæ si egrotantis imbecillitati non respondeat, cremore solo ptysanæ, aut amylo aqua hordei soluto pascatur. Potus sit aqua mulsa, aut aqua hordei cum zulapio ros. aut maiorum punicorum succo. Vbi autem inflammatio remissa apparebit, faciliusq; deglutire incipiet egrotus, ouorum lutea perliquida exhibeantur. Omnino alimenta immodica uitentur, ac ea in primis quæ calfaciunt, & sanguinem augment. Somnus quoque summa diligentia uitandus, ne repens intrò sanguis, humorum ac locum patientem defluxum augeat.

CYNANCHES A CAU-

sa rigida Curatio.

Cynanches uerò causa si frigida fuerit, à pituitoso enim sanguine esse potest, eius quoque curatio, à uenæ exterioris cubiti sectione exordienda, si quidem plenitudo uideatur, vires quoque, & ætas permiserint. Multum autem sanguinis detrahendum non est, quoniam non euacuationis, sed reuulsionis tantū gratia fit hæc sanguinis missio. Qua facta, è uenis quoq; quæ sub lingua sunt, sanguis detrahatur. Quòd si nihil deglutire possit, pro phar macis solutiuus, enematis acutis uti oportebit in hunc modum. Recipe quinque herbarum communium, ana. Manip. i.

nip. i. centaurij minoris, sampsuchi, ana. Manip. β. radicis
 acori, 3. β. furfuris frumenti, M. β. florum chamemeli, flo-
 rum meliloti, florum stœchad. Arab. ana. P. i. Decoquan-
 tur in s. q. aquæ ad dimidij consumptionem, accipiantur iu-
 ris decocti libr. i. hieræ picræ compositæ, benedictæ laxat.
 ana. 3. vi. mellis anthosati, 3. i. β. olei chamemeli, 3. iij. salis
 fossilis, 3. ij. Commistis omnibus fiat enema, quod iniicia-
 tur ante pastum. Si uerò deglutire quicquam posset, quod
 etiam tentandum est, affixa secundæ cervicis uertræ cu-
 curbitula, exhibeatur potio sequens. Recipe catholici, 3.
 β. elect. indi maioris, diaphœnici, ana. 3. ij. mel rosa. col. 3.
 β. Excipiantur iure communis medicinarum decocti,
 adiecto stœchad. Arab. P. i. fiatq; potio, quæ sumatur hora
 quarta matutina. Catapotia, si deglutire possit, magis con-
 ferent. Sumat igitur, 3. i. pil. cocci. circa noctis dimi-
 dium. Cucurbitule loco dicto affigendæ sunt, quoties
 pharmacum, aut cibum sumit, qualem paulò antè memo-
 rauimus. Factis sanguinis missionibus, sumptoq; phar-
 maco solutiuo, aut eius loco iniecto enemate, utatur egro-
 tus gargarismis sequentibus. Hoc tamen uti poterit,
 post sanguinis missione. Recipe nucum cipressi, balau-
 stio. ana. M. i. mastich. 3. i. Decoquantur in aqua mulsa,
 recipiatur iuris decocti libr. i. in qua dissolue dianuc. 3. ij.
 mel. rosacci col. 3. ij. β. aluminis liqui, 3. ij. myrrhæ, cro-
 ci, ana. 3. β. fiat gargarismus, quo die primo utetur. Eo-
 dem quoque die colli pars anterior inungatur ole. de lil.
 & chamemelino. Alijs diebus sequentibus hoc garga-
 rismo utendum. Recipe uuarum passarum detractis
 uinaceis, 3. i. carycas pingues vi. seminum lini, & fœne-
 græ. ana. 3. β. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimi-
 dium

DE MORB. INTER. CVR.

dium absumatur, recipiatur iuris decocti libr. i. in qua dissolue pyrethri, sinapi, ana. ʒ. i. ʒ. myrrhæ, croci, ana. ʒ. ij. pul. hirundinum, ʒ. ij. fiat gargarismus, quo utendum: ut dictum est. Exteriùs uerò parti colli anteriori, sequens unguentum admoneatur. Recipe nidi hirundinum, ʒ. iij. unguenti dialthæ, ʒ. iij. Misceantur, fiatq; ut dictum est. Si non resoluatur hæc Angina, quod multò melius foret, quàm suppurari, gargarismo sequenti utetur ægrotus. Recipe carycarum pinguium, uuarum passarum detractis uinaceis, ana. ʒ. i. seminum lini, & fœnogr. ana. ʒ. i. ʒ. Decoquantur in s. q. aquæ, tantisper dum pars dimidia absumatur, recipiatur iuris decocti libr. i. in qua dissolue farinarum seminis lini, et seminis fœnogræ. ana. ʒ. ʒ. pul. hirundinum, ʒ. ij. fiat gargarismus. Exteriùs uerò admoneantur hæc. Recipe pollinis, farine seminum lini, & fœnogræ. ana. ʒ. i. ʒ. subigantur cum axungia porci non salita, & ol. amygdal. dulc. fiatq; cataplasma, quod parti anteriori colli apponatur, donec Angina suppuretur. Rumpatur deinde abscessus digito altius immisso, aut scalpello, si cerni potest, idq; quando abscessum intus rumpi est necesse, nec perfecta maturatio expectetur, propter periculum loci. Rupto abscessu, hylcus, gargarismo aquæ mulsæ tergetur, glutinandum deinde bolo Armeniæ in ore retenta. Si exteriùs abscessum rumpi contigerit, curetur, ut cætera exteriora hylcera.

TVSSIS CVRATIO.

Cap.

II.

causæ. **T**vsis multiplices sunt causæ: frequentiùs accidere solet ab humoribus ad asperam arteriam, itemq; ad pulmonem, à capite destillantibus: qui quidem nonnunquam

quàm sunt frigidi, crassi, & uiscidi, nonnunquam pituitosi, falsi, calidi, crassi, permisti cum frigidis: nonnunquam tenues & calidi. Si frigidi crassiq; & uiscidi fuerint, per ea quæ incidunt, et extenuant medebimur hunc in modum. Recipe serapij de glycyrrhiza, ʒ.ij. serapij de hyssopo, ʒ.i. ʒ. serapij stœchad. ʒ.i. Stillatitiorum liquorum helenij, betonica, buglosi, ana ʒ.iiij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Recipe diaireos simpl. in rhomborum formam, unc.ij. sumatur rhombus unus cum serapijs: sæpeq; in ore de eo, quod supererit, habeatur, sensim deglutiendo. Recipe pil. de agar. pil. cocci. ana. ʒ. ʒ. cum stillatio liquore hyssopi, fingantur pilul. v. quæ circiter noctis dimidium sumantur. Recipe theriacæ uet. ʒ.i. pul. iridis, ʒ. ʒ. conferuæ buglosi ʒ.i. ʒ. Misceantur, & postridie manè sumantur. Vacuato corpore, ea adhibenda, quæ materiam in pulmonibus conceptam expui facilem reddunt, quale est eclegma sequens. Recipe eclegmatis de pino, eclegmatis sani et experti, ana ʒ.iiij. penidiarum, ʒ.ij. pul. irid. Florentiæ, ʒ.ij. pul. hyssopi, ʒ.i. elect. diatragacanthæ frig. (ad temperandum calorem) ʒ.i. uuarum passarum detractis uinaceis, ʒ. ʒ. pulmonis uulpis preparati, ʒ.ij. seminis maluarum, seminis gossipij, ana. ʒ.i. cum serapio de glycyrrhiza fiat eclegma, quod sensim, leniterq; ori bacillo de glycyrrhiza illatum, deglutiatur. Errhino quoque sequenti dies aliquot utendum, corpore purgato. Recipe succi betæ, succi sampsuchi, ana. ʒ. i. ʒ. mellis, ʒ. i. zinziberis, ʒ. i. Misceantur, fiatq; errhinum, quod à ieiuno tepidum naribus attrahendum est. Nec non hoc unguento pectus ungendum est calidè manè ante pastum, uesperique quoque ante coenam. Recipe unguen-

DE MORB. INTER. CVR.

tiresumptiui, uncias duas, muccaginis seminis altheæ,
 & seminis lini, ana unc. i. ß. olei irini, olei amygdalarum
 dulce, ana unc. ij. ß. croci (pectus enim dilatat) scrup. i.
 adiecta cera q. s. fiat unguentum, quo utendum, ut di-
 ctum est. Pilulis præterea sequentibus utetur egrotus
 semel, aut bis, singulis hebdomadibus, cum lectum dormi-
 turus ingredi uolet. Recipe pilul. asacret, agar. in pa-
 stillorum formam redacti, ana drachmas duas, cum se-
 rapio de glycyrrhiza, fingantur pil. vi. è drachma, è
 quibus, tres sumantur: ut dictum est. Quoniam autem
 sunt leues, possunt statim à pastu sumi. Cerebrum etiam
 corroborandum, & exiccandum. Recipe nigellæ Ro-
 manæ, drach. i. ß. corticis citri sicci, drachmas tres, cype-
 ri, caryophyllorum, ana drach. duas, maceros, cocci in-
 fectorij, ana drach. i. styracis calamitidis, drach. ij. ß. (ad
 odorem) rosa. rubr. scrup. ij. fiat puluis, quo pars capi-
 tis anterior inspergatur, cum lectum ingredi uolet.
 Capitis quoque operimenta sequenti suffitu manè, &
 uesperis suffiantur. Recipe thuris, mastich. sandaracæ
 communis, ana. ʒ. i. styracis calamitidis, ladani, ana ʒ.
 ß. nigellæ Romanæ, ʒ. iij. Confringantur minutim,
 fiatq; ex his suffitus: ut dictum est. Perseuerante Tussi,
 utatur egrotus suffitu tradito Cap. de Catarrho, qui fit
 cum arsenico citrino. Declinante hoc affectu, humorum
 defluxus sistatur in hunc modum. Recipe boli armenicæ,
 ʒ. ij. ß. spicæ nardi, ʒ. i. mastich. ʒ. i. ß. gummi tragacanthæ,
 gummi Arabici, an. ʒ. i. sacchari (dulcedinis gratia) can-
 di, penidiarum, ana ʒ. ß. cum serapio de ziziphis (ad in-
 crassandum) fingantur orbiculi lupinis similes, quos in
 ore retineat egrotans, præcipue tempore somni. Tussi
 uerò

uerò ab humore pituitoso salso, calido quadantenus, & tenui, cum frigido & crasso permisto, sic medebimur, ab humorum concoctione auspicantes. Recipe serapij adianti, serapij uiolacci, serapij de glycyrrhiza, ana ʒ. i. oxymelitos simpl. ʒ. i. ʒ. stillatitiorum liquorum betonicae, intybi satiui latioris, hyssopi, ana ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Recipe diatrachanthæ frig. ʒ. iij. in solidam rhomborum figuram effictas, sumantur singuli rhombi cum serapijs, qui supererunt, in ore frequenter habiti, ueluti lambendo, paulatim deglutiantur. Tunc autem supini iaceant: corpore enim supino iacente, gula clauditur, aspera uerò arteria retegitur. Recipe pil. aggregat. (utranque enim materiam, & calidam, & frigidam euacuant) pil. cocci. pil. de agar. an. ʒ. i. cum stillatitio liquore adianti fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

Aut sic.

Recipe agarici recens in pastillorum formam redacti ʒ. i. rhabar. selecti ʒ. iij. spice nardi gr. v. macerentur in stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, buglosi, et paulo uino albo horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adiectisq; cas. recens extractæ ʒ. ʒ. diaphœnici ʒ. iij. serapij adianti ʒ. ʒ. cum decocto pectorali fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe theriacæ uet. ʒ. iij. conseruæ buglosi, conseruæ uiolac. (quoniam mista est materia) ana ʒ. i. ʒ. Misceantur, & postridie sumantur, sex horis ante pastum. Purgato corpore, danda opera, ut quæ in pulmonem defluxit materia facile expui queat: quod sequens eclegma efficiet. Reci. penidiarum. ʒ. iij. elect. diatrachanthæ frig. ʒ. i. ʒ. eclegmatis de pino ʒ. iij. dactylum. i.

1 4 uuarum

DE MORB. INTER. CVR.

uuarum passarum detractis uinaceis. 3.ß. pul. irid. Floren-
tiæ. drach. ij. seminis maluæ, seminis goßipij, ana drac. i.
cum serapio adianti fiat eclegma, quo utendum ut iam de
alijs eclegmatibus dictum est. Sequenti quoque puluere
caput inspergendum ægroti, cum lectum ingredi uolet.

Recipe corticis citri sicci, 3. iij. santali citrini, bacca-
rum myrthi, cyperi, caryophyllorum, ana. 3. i.ß. stiracis
calamitidis. 3. iij. coriandri præparati, cocci infectorij,
ana drach. i.ß. rosa. rub. 3. i. fiat puluis, quo ægrotus, ut di-
ctum est, utetur. Pectus præterea sequenti unguento un-
gendum, manè ante pastum, & uesperis ante coenam.

Recipe olei uiol. ol. amygdala. dulcium, olei irini, ana.
3. i.ß. unguenti resumptiui. 3. iij. butyri recentis. 3. ii. cro-
ci. 3. i. ceræ parum, fiat unguentum, quo pectus, ut di-
ctum est, ungatur. Et capitis operimeta hoc suffitu ma-
nè, & uesperis suffiantur. Recipe Thuris, mastichis,
ana. 3. iii. santalorum omnium, ana. 3.ß. styracis calamiti-
dis, ladani, rosa. rub. an. 3. ii. Cōfringantur minutim fiatq;
suffitus: ut dictum est. Ad hæc singulis hebdomadis se-
mel, aut bis, utatur pil. sequentibus, easq; sumat, cum le-
ctum ingredi uolet. Recipe pil. asaiet, agar. in pa-
stillorum formam redacti, ana. 3. i.ß. rhabar. selecti. 3. i.
cum serapio uiol. fingatur pil. vi. è drachma, è quibus su-
mantur tres ab ægroto: ut dictum est. Hoc declinante ma-
lo, humorum defluxus hunc in modum sistatur. Recipe
boli Armeniæ. 3.ß. spicæ nardi. 3.ß. fiat puluis, qui cū se-
rapio uiolaceo mistus, in cochleari sumatur ab ægroto
lectum ingredi uolente. Hi quoque orbiculi eandem ad-
rem plurimū conferunt sæpius in ore habiti, somni præ-
sertim tempore. Recipe boli Armeniæ. 3. iii. anili. 3. ii.
spicæ

Spica nardi. ℞. ii. gummi tragachanthæ, gummi Arabici, ana. ʒ. i. sacchari candi. ʒ. i. cum serapio uiol. fiat orbiculi lupinis similes, quibus utendum: ut dictum est. Affixæ prætereà cucurbitulæ natibus, poplitibus, deinde scapulis ante pastum, reuulsionis gratia plurimum cōducunt. La- uētur & crura decocto sequenti. Recipe saluæ, sampsi- chi, betonica, mellissophylli, stœchad. Arab. chamæmeli partes æquales. Decoquantur in s. q. aquæ, qua calida cru- ra lauentur manē, & uesp̄ri. Tussi uerò ab humorū te- nuum, & calidorum defluxu, hunc in modum prospicie- mus. Crassantibus enim materiam pulmonibus immer- sam utendum, ne tussientis conatum dissiliendo eludat, sed efflatione expellatur. Recipe serapij de ziziphis (nam incrassat materiā) serapij uiolacci, mellis rosacei col. ana ʒ. i. ʒ. stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris, florū uiol. bugl. an. ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuno per tridū di- liculò bibantur. Recip. diatragacanthæ frig. in solidam rhomborum figuram effictæ. ʒ. ij. sumatur rhombus unus cū serapijs. De eo quod superest, habeat frequenter ægro- tus in ore, supinusq; iaceat: eo enim corporis positu aspera arteria aperitur, gula uerò clauditur, itaq; ad pulmonem sumpta melius transinittūtur. Recip. rhabar. selec. ʒ. i. ʒ. spi- cæ nardi, gr. ʒ. Macrētur in stillatitio liquore intybi sa- tiui latioris, & pauco uino albo horis xij. deinde exprima- tur, & coletur, agarici in pastillorum formā redacti. ʒ. i. maceretur quoq; in oxymelite simpli. & stillatitio liquo- re buglosi horis xij. exprimatur deinde, & coletur, adie- ctisq; serapij rosacei purgatorij. ʒ. ij. & (si robustus qui- dem sit ægrotus) elec. de succo ros. diaphœ. an. ʒ. i. cum de- cocto pectorali fiat potio quæ sumatur hor. iij. matutina.

DE MORB. INTER. CVR.

Aut sic.

Recipe pil. aggregat. ℥.ij. rhabar. selecti, agar. in pa-
stillorum formam redacti, ana ℥.i. cum stillatio liquo-
re intybi satiui latioris fingantur pil. viij. quæ circa no-
ctis dimidium sumantur. Recipe mithridat. 3.℔. conser-
uæ bugloss. conseruæ rosa. ana 3. i. ℔. Miscantur, & à ie-
iuno postridie sumantur sex horis ante pastum. Sequens
elect. in ore sæpe habendum. Recipe pul. diatragacan-
thæ frigi. pul. diapapa. ana 3. i. ℔. sacchari dissoluti in stil-
latio liquore rosa. q. s. fingantur elect. solidum in rhom-
borum figuram, quo utendum, ut dictum est. Hæc quoque
serapia ore retinenda, & sensim ueluti lambendo deglu-
tienda. materiam enim expui facilem reddunt. Recipe
serap. uiol. serapij de ziziphis, ana 3. ij. serap. de papæ-
uere, 3. i. ℔. Miscantur, fiatq; ut dictum est. Cerebro de-
inde sic robur addemus. Recipe trium santalorum, bac-
charum myrthi, ana 3. ij. corticis citri sicci, drach. iij. ma-
ceros, drachm. i. cocci infectoriij, ℥. iij. coriandri præpa-
rati, drach. i. ℔. nigellæ Romanæ torrefactæ, drach. ij. ro-
sa. rub. ℥. ij. fiat puluis, qui parti capitis anteriori agro-
tantis, cum lectum dormiturus ingredi uolet, insperga-
tur. Ungetur præterea pectus unguento sequenti cali-
dè manè, & uespèri ante pastum. Recipe olei uiola-
cei, olei amygdalarum dulcium, butyri recentis, aut lo-
ti, si recens non habetur, ana 3. ij. unguenti resumptiui,
3. iij. muccag. seminis althææ, & tragacanthæ frigi. ana
3. i. ℔. croci ℥. i. adiecta cera fiat unguentum, quo pectus,
ut dictum est, ungatur. Declinante hoc affectu, hunc
in modum destillatio sistatur. Recipe boli Armeniæ,
drach. iij. amyli, drach. ij. gummi tragacanthæ, gummi

Ara

Arabici, ana 3.i. sacchari candi, penidiarum, ana. 3.ß. cum muccagine psyllij extracta cum stillatitio liquore rosa. fingantur orbiculi lupinis similes, qui in ore sæpe habeantur, somni præsertim tempore. Singulis prætereà hebdomadis sumet egrotus bis, aut semel, dimidiatam drachmam pilul. sequentium, cum lectum uolet à cæna ingredi. Recipe pil. asieret 3.ij. agar. in pastillorum formam reducti, 3.i.ß. oxyphœnic. rhabar. selecti, ana 3.i. Excipiantur serapio uiolacco, & fingantur pil. vi. è drachma, è quibus tres sumantur: ut dictum est.

HAEMOPTYSIOS CVRATIO.

Cap.

III.

Tussis ab altera harum causarum, hoc est à pituita aut crassa, aut tenui: & frigida, aut calida materia, sanguinis sputum aliquando excitat: quòd ubi contigerit, mittatur sanguis è uena interna, aut media, sanguinisq; 3. circiter iij. detrahantur, exeatq; è foramine angusto. Sputum uerò sanguinis si copiosum fuerit, exhibeatur 3.i. philonij Persici cum stillatitijs liquoribus plantaginis, & portulacæ ante pastum. Utatur prætereà eclegmate sequenti tantisper dum sanguis tußiendo excreabitur. Recipe conseruæ ros. antiquæ, elect. diatragæ canthæ frig. ana. 3.i.ß. boli Armeniæ lotæ in stillatitio liquore rosarum, drach. iij. amyli. 3.ij. Excipiantur serapio myrtheo, fiatq; eclegma, quod paulatim ueluti lambendo deglutiatur. Portulacæ folia sæpe mandantur. Ius quoque frigidum decoctorum ziziphorum, in quo candens ferrum extinctum fuerit, frequenter bibatur. Et quæcunque sumantur, sint actu frigida, propter sanguinis excreationem.

Asthma

DE MORB. INTER. CVR.
ASTHMATIS CVRATIO.

Cap. IIII.

Causa. **H**Oc malum crebram efficit respirationem citra fe-
brem, qualis est ijs, qui citatiore fatigati sunt cur-
su, ob tenacium, & crassorum humorum copiam pulmo-
Signa. nis branchijs, cartilaginibusue infartam. Qui hoc affe-
ctu laborant, magna quidem spirandi difficultate infe-
stantur, tuſſiuntq; ceterum purulentum nihil aut tuſſien-
do, aut excreando reiectant. Eoq; id mali interdum pro-
cedit, ut corporis partes, quæ supra thoracem sunt, rectas
habere cogantur, suffocari metuentes, nisi recta ceruice
Vitus ratio. spirent. Vitis ratio calida sit prorsus, & sicca. Aer igi-
tur uitetur frigidus, & humidus. Carnes sint non neruo-
sæ, nec pingues, sed concoctu faciles, quales sunt perdicũ,
montanarum auium, caporum, & pullorum gallinaceo-
rum, & id genus aliorum. Potus multus prodesse quidem
potest, quod humectatione multa indigeant, ut facilius
tuſſiendo efferantur humores crassi, & tenaces pulmoni-
bus infarti, sed iam medicamentis abstergentibus, & re-
purgantibus, tuſſes comouentibus, repurgati, & absterſi,
qui, nisi ualde humectentur, quauis absterſi et repurgati,
ob crassitudinem tamẽ non facile excreando reijciuntur.
Alias potus multus spirandi difficultatem auget, uentri-
culo multo potu distento diaphragma premente. Tutius
igitur in pastu parcẽ bibere, à pastu uerò aliquantisper à
potu prorsus abstinere, etiam si cordis calor minùs, quàm
oporteat, refrigerati, uehementem sitim excitet: sed os et
guttur potu colluere gargarisando licebit, & ex his quæ
sputum promouent, aliquid in arterias transmittere. Vbi
autem prior cibus uentericulum fuerit egressus, bibere
quidem

quidem liberè tunc licebit, neque quicquam oberit. Cum hic affectus in paroxysmo est, à fortibus medicamentis temperandum, alio tempore fiat, ut sequitur, materia uidelicet existente tenaci, & crassa, ac salsa, cum caliditate cordis, hepatis, & renum. Alius autem in primis mollienda hoc enemate, & laxanda, si quidem astricta fuerit.

Recipe cas. saccha. rubr. ana. \mathfrak{z} . i. mel. uiolacei. \mathfrak{z} . i. β . diaphœnici, hier. Gal. ana. \mathfrak{z} . β . olei chamæmelini, olei uiolacei, ana. \mathfrak{z} . i. β . salis parum, cum iure communis enematum decocti fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Humores deinde hunc in modum concoquantur. Recipe serapij de glycyrrhiza. \mathfrak{z} . ij. mel. rosa. col. \mathfrak{z} . i. β . serapij uiolacei, serapij stœchados, ana. \mathfrak{z} . β . stillatitiorum liquorum buglosi, hyssopi, betonicae, ana. \mathfrak{z} . iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculò sumantur. Recipe diaireos simpl. in rhomborum figuram. \mathfrak{z} . ii. sumat rhombū unum cum serapiis, de eo quod supererit habeat frequenter in ore. Recipe pilul. cocci. pilul. aggregat. pilul. de agar. (propter materiam, quæ ad pectus defluxit) an. \mathfrak{z} . i. cum stillatio liquore adianti fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Recipe aquæ mulsæ uncias sex, sacchari uncia semissem, bibantur sex horis à sumptione pilularum pro lotorio.

Aut sic uacuetur.

Recipe agarici recens in pastillorum formam redacti. \mathfrak{z} . i. β . maceretur horis xii. in oxymelite simpl. & stillatio liquore buglosi, in quo uuæ passæ decoctæ fuerint. Deinde recipiantur rhabar. selecti. \mathfrak{z} . ij. spicæ nardi gr. x. maceretur in stillatitiis liquoribus intybi satini latioris, buglosi, et pauco uino albo horis xii. deinde utraq;
expria

DE MORB. INTER. CVR.

exprimantur, & colentur, adiectisq; cas. recens extractæ
 ʒ.ß. elect. de succo rosa. diaphœnici, ana drachm. i. serapij
 adianti ʒ.ß. cum decocto pectorali fiat potio, quæ sumatur
 hora quarta matutina. Licebit autem ægrotanti per
 horam post potionis sumptionem dormire, quod itidem
 licet quoties solutuum, quod sumitur, forte est. Recipe
 mithridat. ʒ. ij. conseruæ rosa. conser. bugloss. ana drac. i.
 ʒ.ß. Misceantur, & postridie sumantur sex horis ante pas-
 tum. Eo modo uacuetur ægrotus, proximè dicta potione
 utens, tertio quoque mense: medio autem tempore utatur
 pil. sequentibus singulis hebdomadibus semel, in introitu
 lecti. Recipe pil. asacret. agar. in pastillorum for-
 mam redacti, ana ʒ. i. ʒ. rhabar. selecti drach. i. Excipian-
 tur serapio uiola. finganturq; è drachma pil. vi. è quibus
 sumantur tres: ut dictum est. Vacuato corpore, utetur
 dies aliquot ægrotus errhino sequenti, omiſſis apophleg-
 matismis, & gargarismis. Recipe succi radicis betæ,
 succi sampsuchi, ana ʒ. i. ʒ. aquæ mulsæ ʒ. ij. cubebarum, ni-
 gellæ Romanæ, nucis moschatæ, ana ʒ. i. uini albi ʒ. i. Mi-
 sceantur, & tepida per nares attrahantur manè ante pas-
 tum, quinque, aut sex dies, statim post purgantem po-
 tionem. Partium quoque inferiorum fricationes fiant an-
 te pastum: cucurbitulæ sine scarificatu affixæ spatulis ho-
 ris matutinis ante pastum per dies aliquot plurimum
 etiam conferunt. Conducet & crurum in sequenti deco-
 cto lotio. Recipe saluæ, sampsuchi, betonicæ, ana M. ij.
 florum stœchad. Arab. chamæmeli, & meliloti, ana M. i.
 Decoquantur in s. q. aquæ, fiatq; ut dictum est. Atque, ut
 materia in pulmonibus cõcepta facilius expui possit, uta-
 tur ægrotus eclegmate sequenti. Recipe eclegmatis de
 pino,

pino, eclegmatis sani & experti, ana unc. β. pulue. iridis Florentiæ drach. ij. β. diatragacanthæ frigide, penidiarum, ana ʒ. i. β. conferuæ uiol. conferuæ adianti, ana unc. i. pulmonis uulpis præparati drach. i. uuarum passarum detractis uinaceis unc. i. Excipiantur serapio de glycyrrhiza, fiatq; eclegma, quo utetur ægrotus, & paulatim ueluti lambens deglutiat, ori bacillo de glycyrrhiza illatum.

Aut sic.

Recipe serapij de glycyrrhiza unc. iiij. serapij de hyssopo unc. ij. Misceantur, eisq; pariter, ut dictum est utendum.

Aut sic.

Recipe glycyrrhizæ, radicis fœniculi, ana un. i. adianti recentis. Manipul. β. hyssopi tertiam partem. Manip. i. uuarum passarum detractis uinaceis, carycarum pinguium, ana ʒ. i. croci scrupul. i. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absumatur: accipiat iuris decocti lib. i. adiectisq; saccharo, & melle q. s. fiat serapium perfectè coctum, quo utetur ægrotus, ut superius dictum est, lambendo. Puluis quoque sequens, si obsoniis, & iusculis immisceatur, magno erit usui. Recipe glycyrrhizæ, adianti recentis, ana ʒ. i. β. (minutim incidantur) cinnamomi drach. i. pulmonis uulpis præparati drachm. ij. croci ʒ. i. sacchari ad dimidium ponderis omnium, fiat puluis quo utatur ægrotus, ut monuimus. Hoc præterea unguento pectus calidè unguendum ante pastum manè, & uesperis, mammam tamen sinistram, hoc est cordis regionem ne attingat, ne inflammetur.

Vnguentum.

Recipe

DE MORB. INTER. CVR.

Recipe mucaginis seminum altheæ, & fœnogr. ana. ʒ. i. ʒ. olei amygdal. dulc. olei de lilio, butyri recentis (aut loti, si recens desit) ana. ʒ. i. ʒ. olei irini. ʒ. i. croci. ʒ. i. adiacera fiat unguentum, quo ungatur pectus: ut dictum est. Asthma autem si fuerit à materia tenui, & aquosa, quadantenus frigida, decumbente in pectus, unde flatus cum in cavitae pectoris, tum in uentriculo excitentur, indeq; uapores sursum ferantur, cuius paroxysmus eructatione, & uaporum emissionem curatur, ei hunc in modum prospiciemus, dum paroxysmus quidem adest. Primum enim leuia quedam, humores in pectore conceptos, faciles expui reddentia, sumantur: ut diatragacantha in ore retenta, penidiæ, serapium uiolaceum, aut de ziziphis, aut de adiantho, paulatim ueluti lambendo deglutita. Manus, & pedes leniter fricentur. Vitandus supinus corporis positus, flexum agrotantem genibus magis inniti expedit. Si rubor in facie cum quadam totius corporis inflammatione apparuerit, cum multa uaporem elevatione, incidatur uena interior, aut media dextri brachij, detrahanturq; duæ, aut tres sanguinis. ʒ. Rarentur loquatur agrotans. Victu admodum tenui utatur. Solum hordei, glycyrrhizæ, & uuarum passarum decoctum bibat. Si uerò in longius tempus paroxysmus protrahatur, iure puli, lacte amygdal. dulciū cum farina hordei, & pauco croci utatur. Neque eclegmata, neque pil. neque quicquam aliud, quod euacuet, exhibendum. Quietis uerò tempore materia hunc in modum concoquatur, & uacuetur. Recipe mellis rosacei col. ʒ. ij. serapij adiat, serapij uiolacei, ana. ʒ. i. serapij de ziziphis. ʒ. i. ʒ. Stillatitiorum liquorum buglossi, oxalidis, hyssopi, ana. ʒ. iij. Miscantur, & à ie-

iuno

iuno per triduum diluculo bibantur. Recipe diatragacanthæ frig. in rhomborum figuram 3.ij. sumatur rhombus unus cum serapijs. De eo, quod supererit, sæpe habeat ægrotans in ore. Recipe pil. asaiet, pil. de agar. ana 3.ß. cum stillatitio liquore adianti fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Quod si ægrotantis aluus non facile solvatur, pro pil. asaiet. substituatur, pil. aggreg. & cocci. ana. 3.i.

Aut sic.

Recipe agar. recens in pastillorum formam redacti 3.i.ß. maceretur in oxymelite simpl. & stillatitijs liquoribus betonicæ, buglossi, adianti, deinde exprimatur, & coletur, rhabar. selecti macerati in stillatitijs liquoribus in tybi satini latioris, buglossi, & pauco uino albo cum specie nardi gr. v. horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adiectis cas. recens extractæ 3.ß. diaphœnici 3.i.ß. serapij adianti. 3.ß. cum decocto pectorali fiat potio, quæ sumatur hora quarta manè. Recipe mithridat. 3.ij. conseruæ adianti, conseruæ buglossi, ana 3.i.ß. Misceantur, & postridie manè sumantur sex horis ante pastum. Eo modo bis quotannis uacuetur ægrotus, ad Februarij finem, & Septembris initium. Medio uero tempore his utatur pilul. singulis hebdomadibus semel, cum dormiturus lectum ingredi uolet. Recipe pilul. asaiet Auicennæ, 3.ij. agar. in pastillorum formam redacti 3.i.ß. rhabar. selecti, 3.i. cum serapio uiolac. fingantur pilul. vi. è drachma, è quibusumat tres, ut monuimus. Vacuato corpore utatur errhino sequenti diebus octo. Recipe succi betæ 3.ij. aquæ hordei 3.i.ß. nigellæ torrefactæ 3.ß. fiat errhinum, quo tepido utetur ieiunus, ut dictum est. Nec apophlegmatif-

K mis,

DE MORB. INTER. CVR.

mis, nec gargarismis hoc in affectu utendum. Sequens autem eclegma magno usui erit sensim deglutitum ueluti lambendo, glycyrrhizæ bacillo ori illatum. Recipe uuarum passarum detractis uinaccis ʒ.i.ß. seminis fœnogreci loti accuratè ʒ.ij. penidiarum ʒ.ij. Excipiantur serapio uiolaceo, fiatq; eclegma, quo egrotus utetur: ut dictum est. Sequens quoque puluis ferculis mistus ad hunc affectum non parui momenti futurus est. Recipe glycyrrhizæ, adianti, ana ʒ.i.ß. pulmonis uulpis loti & macerati in stillatitijs liquoribus scabiosæ, & adianti, deindeq; exiccat ʒ.ij. anisi, cinnamomi selecti, ana ʒ.i. croci ʒ.i. sacchari ad pondus omnium: fiat puluis, quo cum obsonijs & iusculis utatur. Ungendus & uenter uenti sequenti unguento calidè, manè, & uesperis ante pastum.

Recipe olei absinth. olei nardini, olei mastich. olei ex cotoneis, ana ʒ.i. coral. rubri, caryophyllorum, ana ʒ.i.ß. spicæ nardi, iunci odorati, ana ʒ.ß. rosarum rubr. ʒ.ij. adiecta cera q.s. fiat unguentum, quo uentriculi regio unguatur, ut dictum est. Crura prætereà lauentur decocto saluie, stœchados Arab. chamæmeli, & roris marini. Cauterium uesticæ excitans, quale superius sæpe commemoratum est, post aures admotum, aut radici manus, ipsiq; palmæ, humorem illum defluentem ui magna reuellit. Petus èt manè, & uesperis ante pastum calidè, caliditate quidem temperata, unguendum unguento sequenti, regione cordis uitata, ne inde inflammetur. Recipe ol. amygdal. dulcium, butyri recentis, ana ʒ.ij. olei de lilio (propter uapores) olei chamæmeli (ad resoluendum) ana ʒ.i. croci ʒ.i. adiecta cera q.s. fiat unguentum, quo ut dictum est, utendum. Nec cerebri hoc in affectu negligenda cura, sic igitur

igitur in tempore roboretur. Recipe pulueris capital. superius traditi ℥.ij. eo pars capitis anterior inspergatur egroti, cum lectum ingredi uolet. Aut pulueris loco fingatur pileolus, in quo quæ sequuntur, insuantur. Recipe sampsuchi, betonicæ, ana M.ß. coriandri præparati ℥.ß. cocci insectorij ℥.ij. omnium santalorum, ana ℥.i.ß. mace- ros, ℥.i. rosarum rub. ℥.ij. caryophyllorum ℥.i.ß. conte- rantur, rubroq; sericeo panno insuantur, unde fiat pileo- lus, qui gestetur.

PLEVRITIDIS CVRATIO.

Cap.

V.

Membrane interioris latera, costasq; succingentis inflammatio, propriè signateq; pleuritis dicitur. Non enim omnis lateris dolor est pleuritis. Fit ferè pleu- Causæ. ritis à sanguine copioso, & calido, ad dictam membra- nam præter naturam fluente, nonnunquam à bilioso, aut pituitoso, aut melancholico: id quod sputum demonstrat. Si enim rubrum, cruentumue fuerit, sanguinem exuperare indicat. Sin flauum, & sub pallidum, flauam bilem. Si al- bum, leuiterq; spumosum, pituitam. Si sub nigrum, hu- morem melancholicum in sanguine excedere ostendit. Pleuritidis ueræ, quæ à sanguine bilioso magna ex parte fit, curandi rationem primum aggrediemur: deinde illius, quæ à pituitoso est sanguine: postremo non ueræ pleuri- tidis curande methodum docebinus. Veræ autem pleu- Signa. ritidis notæ sunt, spirandi difficultas, tußis, febris con- tinua, dolor uehementer pungens, pulsus durus, & ferræ modo asper. Viçtus ratio hoc in affectu tenuis admodum Viçtus ratio. sit, siquidem uires ferræ poterunt, ad quartum usque diem, contentumq; egrotum expedit esse hordei succo.

K

2

Si ui-

DE MORB. INTER. CVR.

Si uires tot dies uictum tam tenuem ferre nequeant, duos certè dies feratur. Deinde ad septimum usque diem pane loto, ad salis, & fermenti calorem tollendum, aliq; aqua cocta, sacchari, et butyri exigua portione ad saporis gratiam adiecta, uescatur. Post septimū diem, lacte amygdalarum, aut hordeo ex iure pulli cocto. Si ueres tamen nimium collabi uiderit Medicus, pleniore egrotum uictu uti permittat, ut pullorum, aut aliarum carniū cum mica panis contuso. A uino abstinendum, saltem ante septimum diem. Potus sit aqua decoctionis hordei, & glycyrrhizæ, cum serapijs uiolaceo, & adianti. Si uerò materia tenuis ualde, subtilisq; sit, addatur dictis serapijs, serapium de ziziphis, ut sic cum serapij uiol. & serap. adianti, ana ʒ.ij. mista ʒ.i. serapij de ziziphis. Omnia autem quæ bibet, actu calida sint. Cuncta enim quæ in phlegmone pulmonis, aut thoracis, aut hepatis, aut uentriculi, aut renum, aut uteri bibenda exhibentur, actu calida esse debent, quoniam semper aliquid aut insensiliter, aut per sudores resoluitur, quam quidem resolutionem potus frigidus prohiberet: frigida enim poros addensant. Aqua frigida summe uitetur, quod sputum in crudefcere faciat. Virium autem imbecillitas, aut consuetudo uinum si ægroto bibendum dare cogat, sit oligophoron, & dulce, aquaq; saccharata diluatur, nisi lienis, aut hepatis phlegmone affuerit, aut obstructio, quam dulcia & excitant, & augent. Cumbet ægrotus in latus affectum, quod is decubitus sit indolentior: eoq; maior calore ea in parte queratur, quo maior materia copia resoluitur. Animi perturbationes uiten-
Curatio.
tur, & cuncta, quæ phlegmonem augere possunt. Curandi ratio aut à calorificis fotibus, aut à uenæ sectione in-
choan-

choanda. Corpore enim neque plethorico, neque cacochy-
mo existente, medicamentis & fomentis calorificis mox
inter initia utendum, quæ dolorem & mitigant, & discu-
tiunt. Sanguinẽ enim ibi collectum extenuant, & per hali-
tum digerunt. Duoq; inde oriuntur commoda, & quod
sanguinis pars uacuatur, parsq; affecta propterea minus
distenta, mitius dolet. Atque eis fotibus mitigato dolore,
uenæ sectio fiat, ut paulò post dicetur. Corpus uerò egro-
tantis si plethoricum sit, aut malo succo redundans, per
eos calorificos fatus curatio non auspicanda, fluxionem
enim ad partem affectam maiorem excitarent, quæ illis
calefacta plus traheret, quàm euaporaret, fieretq; inde
dolor acerbior. Præuacuandum igitur uenæ sectione cor-
pus, calorifica deinde fomenta admouenda. Incidatur igi-
tur uena iccoraria, aut media, eo in brachio, quod lateris
dolentis è directo est. sequenti enemate iniecto, si quidem
alius sua sponte excrementa, ut conuenit, non deiecerit.
Recipe cas. recens extractæ, sacchari rubr. ana. ʒ. i. ol. uiol-
lacei, ʒ. iij. salis parum, cum iure decocti quatuor herba-
rum remollientium, adiectis prunis x. & hordei M. i. fiat
enema. Quo iniecto, & eiecto, incidatur uena, ut dictum
est, quæcũque hora dici fuerit, sanguisq; pro plenitudine,
& uiribus mittatur. Die post tertio, aut ad summum
quarto, eadem rursus incidatur uena: sanguisq; auferen-
dus donec color quouis modo mutetur. Siue enim primò
bonus, syncerusq; sanguis exeat, dein sequatur malus, aut
contrà, mox uenæ foramen, unde fluit sanguis obturan-
dum. Post quartum diem sanguis mitti non debet, quod eo
tempore, sputum plerunque multiplicari incipiat, quod
sanguinis missio impediret, nisi magna admodum plenti-

K 3 tudio

DE MORB. INTER. CVR.

tudo foret. Si uerò ægrotans puer fuerit annorum xiiij. aut senex annorum lx. cucurbitulæ natibus, & scapulis affigantur, uenæ autem sectio non fiat, nisi eo essent robore, ut ei pares esse possent. Sanguine misso, calorifica medicamenta, & fomenta lateri dolenti extrinsecus hunc in modum admoventur. Recipe maluarum cum radicibus, florum chamæmeli, florum meliloti, ana Manip. i. seminis lini, seminis fœnogræ, ana ʒ. i. ʒ. Decoquantur in s. quantitate aquæ. Decoctum autem illud calens in uesicam impositum, lateri dolenti admoventur semel atque iterum. Aut sponsia magna, mollisq; prædicto decocto immersa, deinde expressa, calens lateri affecto apponatur, eaq; semel, atque iterum foueatur. Ceterum præstat fôtus è uesica eo decocto plena, quòd rara sit, & ferè carnea. Sanguis uerò si biliosus uisus fuerit, & tenuis, fôtus fiat ex solo maluarum, & florum chamæmeli decocto, aut sola aqua calida, pro periti Medici arbitrio. Vbi autem latus affectum prædictis medicamentis fôtum fuerit, sequentibus oleis ungatur. Recipe olei chamæmeli, olei amygdalarum dulcium, ana ʒ. ij. Miscantur, eisq; calefactis post fôtum latus dolens & pectus ungantur. fôtus autem, & unctiones sæpe fiant, longè tamen à pastu. Eactiam adhibenda, quæ ad sputi facilem excreationem conducunt. Recipe diatragacanthæ frigide, penidiarum, ana sesquiunciam. Miscantur sæpeq; in ore habeantur.

Aut hoc eclegma.

Recipe penidiar. ʒ. ij. elect. diatragacanthæ, sesquiunciam, uuarum passarum detractis uinaceis ʒ. i. seminis maluarum, seminis gossipij, ana sesquidrachmam. excipiantur

tur serapio uiolaceo, fiatq; eclegma, quod sensim, ueluti lambendo, deglutiatur. Quoties autem aluus excrementa, ut conuenit, sua sponte non deiciet, utatur egrotus enema supra tradito, aut cas. bolo. Solutiuum pharmacum hoc in affectu minimè conuenit, nisi ubi materia fluxit, quod die quarto plerunque factum est, quoniam solutiuum pharmacum humores mouet. Quod si detur, leue admodum sit. Tutius autem erit omnino, nisi præsens periculum aliter suadeat, ante diem septimum, solutiuo pharmaco non uti. Interea autem materia hunc in modum concoquenda. Recipe serapij adianti, serapij uiolacei, serapij de ziziphis, ana sesquiunciam, iuris decocti hordei, uuarum passarum, & glycyrrhizæ, ʒ. ix. Miscantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Quod altero triduo repetatur, usque post septimum diem. Post quem detur sequens potio purgans. Recipe rhabar. selecti macerati in stillatitio liquore intybi satiui latioris, & buglossi, sesquidrachmam. deinde exprimatur, cui adde cas. recens extracta, aut manna, ʒ. i. serapij uiolacei, ʒ. semissem, cum glycyrrhizæ, hordei, & uuarum passarum decocto: fiat potio purgans, quæ sumatur hora quarta matutina.

Aut sic.

Recipe cas. recens extracta. ʒ. i. elect. de succo rosar. ʒ. ij. serapij uiolacei, ʒ. ʒ. excipiantur decocto prædicto, fiatq; potio, quæ sumatur, ut dictum est. Solutiuis pharmacis modò dictis nō utendū, si febris uehemens, corpusq; extenuatum fuerit. Satis sit uenæ sectio, cum enema, aut cas. bolo, enematis loco. Pleuritidi uerò, si à sanguine pituitoso fuerit, hunc in modū medebimur. Primum iniicia-

K 4 tur

DE MORB. INTER. CVR.

tur enema sequens. Recipe maluarum, linozostidos, helxines, ana M.i.ß. brassicarum rub. M.i. florum chamæmeli P.i.ß. Decoquantur in s.q. aquæ, donec dimidium absumatur: accipiat iuris decocti lib. i.ß. in qua dissolvantur cas. recens extractæ, saccha. rubri ana ʒ. i. hier. e Gal. ʒ. ʒ. mellis uiol. ʒ. i.ß. ol. com. ʒ. iiij. fiat enema, quod antepastum iniiciatur. Eodem utatur ægrotus, quoties aluum astrictum mollire fuerit opus. Encimate ciccto incidatur uena interior, aut media, brachij lateris eiusdem. Maior autem uenæ diductio fiat, quam in superiore pleuritide. Latus deinde affectum sequenti decocto foueatur.

Recipe maluarum cum radicibus, helxines, florum chamæmeli ana M.i. seminis lini, seminis fœnogræ. ana ʒ. ij. Decoquantur in s.q. aquæ. Decocto autem foueatur latus affectum aut spongiæ, aut uesticæ adminiculo, ut paulò antè dictum est. Decumbat etiam ægrotus in latus affectum. Post fœtus calorificos ungatur latus dolens sequenti unguento.

Vnguentum.

Recipe olei amygdal. dulcium, olei de lilio, olei chamæmelini, ana ʒ. i.ß. muccaginis althæa, & seminis lini, ana ʒ. ij. croci ʒ. i. adiecta cera q.s. fiat unguentum, quo latus affectum, & pectus calidè ungantur, manè, & uespèri longe à pastu, idq; pluribus diebus. Sitis tempore hordei decoctum bibatur, cum serapio adianti, serapio uiolaceo, serapio de glycyrrhiza, & oxymelite simplici. Misceantur autem serapij adianti. & uiol. ana ʒ. ij. cum oxymelit. simpl. & serapij de glycyrrh. ana ʒ. i. Aut eadem cum aqua mulsa, in qua glycyrrhiza decocta sit, misceantur, & bibantur. Non enim tantum hæc sibi prospiciunt,

ciunt, sed & ad sputi facilem excreationem conferunt. Quam quidem ad rem, & sequentes eclegma admodū est utile. Reci. eclegmatis de pino ʒ.β. penidiarū ʒ.ij. pul. iri. florent ʒ.iiij. elect. diatrag. frig. ʒ. i. β. uuarum passarū de tractis uinaceis ʒ. i. seminum maluarum, & gossipij, ana ʒ. i. excipiantur serapio de glycyrrhiza, fiatq; eclegma, quod egrotus paulatim ueluti lambendo deglutiāt. Post septimum diem pharmacum solutiuum exhibendum, humoribus ante diem septimum hunc in modum concoctis.

Recipe serapij uiolacci (propter febrē) serapii adiant. ti. oxymelitos simpl. ana ʒ. i. β. stillatitiorū liquorum buglossi, hyssopi, scabiose, ana ʒ. iii. Misceantur, & per triduum à ieiuno diluculo bibantur. Quod altero triduo repetatur, usque post septimum diem. Recipe diatrid. sim. ʒ. iii. utatur cum serapiis: & de eo quod supererit, habeat egrotus sepe in ore. Post septimum diem humoribus, ut dictum est concoctis, sumatur sequens potio purgans.

Recipe cas. recens extractæ ʒ. vi. diaphœnici ʒ. iii. serapii adianti unc. semissem. cum decocto pectorali fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

Aut sic.

Recipe agar. recens in pastillorum formam redacti ʒ. ii. macerentur in oxymelite simpl. aut scillino (si febris ualde remissa sit) & stillatitiis liquoribus adianti & buglossi horis xii. deinde exprimantur, & colentur, adiectaq; serapii adianti ʒ. i. cum decocto pectorali fiat potio purgans, quæ sumatur hora quarta à noctis dimidio.

Recipe conseruæ bugloss. conseruæ adianti, ana ʒ. ii. pul. irid. ʒ. semissem. Misceantur, & postridie manē sumantur. Quod si Pleuritis ad diem decimum quartū per-

K 5 uenerit,

DE MORB. INTER. CVR.

uenerit, nec humor pleuritidem efficiens prædictis auxilijs resolui potuerit, permutationisq; in pus signa apparuerint, eam permutationem coadiuuabit Medicus, primum quidem leuioribus utens auxilijs hunc in modum extrinsecus. Recipe maluarum, althææ cum rad. ana M. i. ficorum pinguium ʒ. ii. florum chamæmeli, florum meliloti, ana M. semissim. seminis lini, seminis fœnogr. ana ʒ. ij. Decoquantur in s. q. aquæ calentiq; decocto immersa sponsia exprimatur, eaq; calida latus dolens foueatur sæpe, longeq; à pastu. Ungueto deinde sequenti ungatur.

Recipe ol. chamæmeli. ol. amygdalarum dulc. axungie gallinæ, ana ʒ. i. ʒ. olei de lilio, muccaginis seminum lini, & fœnogr. ana ʒ. ij. muccaginis seminis cotoncorum ʒ. i. ʒ. croci. ʒ. ʒ. adiecta cera q. s. fiat unguentum, quo latus dolens post fotum ungatur. In eundem usum parctur & hoc emplastrum. Recipe radicis lilij in conspersione modicæ subactæ ʒ. iij. farine seminis lini ʒ. ij. farine fœnogr. ʒ. i. ʒ. ficos pingues. vi. axungie gallinæ, & anseris, ana ʒ. i. ʒ. axungia porci ueteris ʒ. ij. ʒ. commistis omnibus fingatur emplastrum, quod lateri dolenti admoueatur, eiq; post fotum semper hæreat. Intrinsecus autem hæc sumpta suppurationem iuuant. Recipe serapij de glycyrrhiza, serapij de ziziphis, serapii adianti, ana un. ʒ. decocti hordei, uuarum passarum, & glycyrrhizæ, uncias iii. Misceantur, & à ieiuno manè bibantur. Idemq; quotidie facere pergat egrotus, donec materia suppurata sit. Interea quoque temporis, cum sitiet misceat cum glycyrrhizæ, & hordei decocto serapii adianti, serapii uiolacei, serapij glycyrrhizæ, ana unc. ʒ. & bibat. Vbi autem pleuritis suppurata fuerit, quod cognoscitur
cūm

cum ex febris, tum ex doloris remissione, fiant extrinsecus quæ sequuntur ad abscessum rumpendum. Recipe herbam uitri, hoc est, ex qua uitrum conficitur, (sondant appellant) subigatur cū axungia porci antiqua, & butyro, fingaturq; emplastrū, quod lateri dolenti apponatur.

Aut sic.

Recipe radicis lilii in conspersione modum subactæ, unc. iij. ficos decem, simi columbini, unc. ij. fermenti, unc. iii. axungie porci antiquæ, butyri, ana unc. ii. Miscantur simul, & subigantur, fingaturq; emplastrum quod lateri affecto admoueat. Hæc quoque sumpta ad rumpendum abscessum ualde conducunt. Recipe fermenti tritici, aut hordei, q. v. fiat puls cum ficorum decocto, & edatur. Idem præstat puls è farina cicerum rubrorum. Panis quoque fermentatus ualde, & in aceto, aut in aqua mulsa maceratus, eandem ad rem utilis. Oua quoque forbilia sumpta, & lac ut exit ab ubere adhuc calens. Fici in pastus principio sumpti, pityides uerò in fine. Si uerò per hæc non rumpatur, uomitus irritetur, & sternutamentum, corpusq; uehementer concutiat. In cubili mobili iaceat, quod uehementer, celeriterq; moueatur. Quod si circiter diem uigesimum non rumpatur, desperatus est agrotus. Si uerò rumpatur, habita ratione loci, ad quem pus decumbit, tergendum est. Si enim in pectus, & pulmones defluerit, per sputum expurgetur, hisq; præsiidiis eliciatur. Recipe eclegmatis de brassicis, eclegmatis de pino, eclegmatis sani, & experti, ana unciam. ß. penidiarum, drachmas duas, pulueris irid. Florentie, drachm. ii. carniū dactylorum, unc. unam, uuarum passarum detractis uinaceis, unc. i. ß. excipiantur

DE MORB. INTER. CVR.

cipientur serapio de glycyrrhiza, fiatq; eclegma, quod
 egrotus ueluti lambendo deglutiat. Sequens quoque apo-
 zema summè est efficax ad pectus à pure & sanie purifi-
 candum. Recipe glycyrrhizæ, ℥.i. ziziphorum, mixto-
 rum, ana ℥.℞. ficorum pinguium, uuarum passarum de-
 tractis uinaceis, ana ℥.i.℞. seminum althææ, & goßipij,
 ana ℥.iij. adianti recentis Manip.i.℞. hordei Manip.℞.
 Decoquantur in s.q. aquæ, tantisper dum dimidium absu-
 matur, accipiantur iuris decocti colo transfusi lib.i.℞. &
 adiectis penidi, & melle. q.s. dulcedo inducatur. depure-
 tur, & ℥.ij. pul. irid. admistis cum ℥.i.℞. cinnamomi selecti,
 sapore & odore iucundiore reddatur. Eo dies quinque
 ieiunus calido utetur: & repetatur usque ad perfectam
 pectoris purificationem.

Aut sic.

Recipe oxymelitos simpl. serapij adianti, serapij de
 glycyrrhiza, ana ℥.℞. stillatitiorum liquorum scabiosæ,
 buglosi, hyssopi, ana ℥.i. Miscantur, & à ieiuno manè
 bibantur, & repetantur usque ad integram pectoris ab-
 stersionem. Si uerò pus ad urinæ uias decubuerit, hunc in
 modum purificentur. Recipe quinque radic. commu-
 nium maceratarum in uino albo, ana ℥.i. glycyrrhizæ
 ℥.i.℞. quatuor seminum frig. maiorum, ana ℥.℞. adianti
 recentis, Manip.i. cicerum rubr. M.℞. Decoquantur in
 s.q. aquæ usque ad dimidiæ partis absorptionem, adie-
 ctoq; saccharo q.s. dulce fiat. depuretur, & ℥.ij. pulueris
 diarrhodi abbatidis additis, iucundiore & sapore, & odore
 reddatur. Hoc apozemate utetur egrotus diebus quin-
 que manè ante pastum: & repetatur donec pus plane
 expurgatum fuerit. Sumat interdum egrotus ℥.i. cas-
 siosæ

dissolutam in decocto proximè tradito. Si autem ad intestina defluxerit, hoc aut simili enemate abstergantur, & lauentur. Recipe iuris decocti hordei, & furfuris, libr. i. ß. in quo dissolue sacchari rub. mellis rosacei col. ana ʒ. i. fiat enema, quod ante pastum iniiciatur: eoq; sepius utendum. Sumatur præterea matutinis horis serapium quodpiam astringens, quod intestina à pure exulcerari prohibeat, quale est, hoc quod sequitur. Recipe serapij rosacei de rosis siccis, ʒ. i. ß. stillatitij liquoris plantaginis, ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuno sumantur: idq; pluribus diebus repetendum. Pleuritis uero si notha fuerit, & non uera, cucurbitula dolenti lateri affigantur, quæ materiam foras, & ad partes externas trahant: id & sequens efficiet emplastrum, lateri affecto admodum. Recipe florum chamæmeli, P. i. ß. farine seminum lini, & fœnogr. ana ʒ. iij. radicis irid. in consersionis modum subactæ, ʒ. iij. fimi columbini, ʒ. i. ß. axungie gallinæ, ʒ. ij. olei de lilio, olei chamæmeli ana ʒ. i. ß. Misceantur, & adiecta cera fiat emplastrum, quod lateri dolenti admoueat. Vbi autem apparente tumore materia ad cutem attracta uidebitur, eius suppurationem hunc in modum coadiuuabimus. Recipe farine tritici, & fabarum, ana ʒ. ij. ficuum contusarum, ʒ. iij. axungie porci ueteris ʒ. iij. croci ʒ. ij. farine seminum lini, & fœnogr. ana ʒ. i. ß. uitellos ouorum tres. Commistis omnibus fiat cataplasma, quod lateri affecto apponatur, super locum tumentem. Facta suppuratione, uocato Chirurgus rumpatur abscessus. Cætera omnia, ut enemata, uenæ sectio, & alia inter initia in hoc quoque affectu facienda, ex his quæ paulò antè tradita sunt, petantur.

Perip-

DE MORB. INTER. CVR.
PERIPNEVMONIAE CVRATIO.

Cap. VI.

Peripneumonia, pulmonis est inflammatio, cum febre acuta, difficultate spirandi, grauitate, distentioneque thoracis citra dolorem, nisi ipsius pulmonis membranae, quae thoraci secundum longitudinem connectuntur, inflammatae fuerint, dolor enim tunc percipitur.

Causa. Omnis inflammatio ex affluente fit sanguine, qui nonnunquam biliosus, nonnunquam pituitosus, nonnunquam melancholicus existit: id quod ex sputo, ut dictum est superiori Cap. discernitur.

Signa. Hoc malo correptis tota facies rubet, intumescunt oculi, fit nasus in summo, sinus tussis sicca, linguaeque adest siccitas. Calidam praeterea sentiunt sic affecti expirationem, quocirca ubi plurimum efflant, iuuari uidentur, aquam frigidam, magis uero multum aërem frigidum attrahere concupiscunt. Si mortale malum hoc fuerit, uigiliae adsunt perpetuae, aut somnus certe perquam breuis est, frigent extrema, linescunt ungues, & incuruati uidentur. Hi quarto, aut septimo ad summum die intereunt. Si uero ad salutem permutetur, sanguinis abundans eruptio, aut alui sequitur perturbatio, biliosis multis, ac spumosis deiectionibus exeuntibus. Interdum etiam inflammatione in pus commutata, si per urinarum meatus, aut uentrem pus excernatur, omni statim molestia liberantur. Si uero acruatim in pulmonem iruperit, aut suffocat, aut in tabem permutatur.

Curatio. Curatur autem hoc pathema, iisdem remedijs quibus pleuritis: nisi quod ea parti thoracis anteriori sunt admoenda.

PALPITATIONIS CORDIS

Curatio. Cap. VII.

Cordis

Cordis palpitatio, seu tremor, motus est cordis de-
 prauatus, cum uidelicet præter naturam dilatatur,
 aut constringitur. Proficiscitur ab omni intemperie, siue Causæ.
 cum humoris uitio, siue sine humore. Fit nonnunquam
 ab humore in pericardio contento, cor ne attollatur im-
 pediente. Hac cordis palpitatione, ab humore in mem-
 brana cor ambiente contento nata, affecti, uenæ sectione,
 quæ in cubito fit, & extenuante uictus ratione, medica-
 mentisq; tam sumptis, quàm admotis, quibus extenuandi,
 et corroborandi facultas inest, liberantur. Oritur autem
 plerunque hic affectus à causa calida, ut à sanguine mul-
 to, & calido, aut à fumis, & uaporibus multis ad cor ela-
 tis. Si à sanguine fuerit, incidatur cubiti dextri interior
 uena, sanguisq; pro plenitudine, uiribus, & ætate mittatur.
 Cor deinde tam sumptis, quàm admotis roboretur. Si Curatio.
 uerò à uaporosa repletione, incidatur iecoraria uena si-
 nistri cubiti, cordi deinde robur adiiciatur medicamentis
 tam sumptis, quàm admotis. Sin à bilis copia huius mali
 origo sit, concoquatur primum deinde uacuetur lenibus
 quidem medicamentis, nam à corde uacuatio forti medi-
 camento fieri non debet. Recipe serapij de succo oxa-
 lidis, serapij intybi satiui latioris, serapij acetati simpl.
 ana ʒ. i. ʒ. stillatitiorum liquorum buglossi, cichorij, cir-
 sii, ana unc. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum di-
 luculò bibantur. Si autem caliditas multa foret, pro se-
 rapio de intybo satiui latiore, substituatur serapium de
 acetositate citri, aut deribes. Recipe diam. frig. ʒ. ʒ. utatur
 cum serapiis. Recipe rhabar. select. ʒ. i. ʒ. myrobala-
 norum flauarum confricatarum oleo amygdalar. dulc. ʒ.
 ij. (astringunt enim cum ita confricantur) oxyphœ-
 nicon

DE MORB. INTER. CVR.

nicen 3.ß. maceretur in stillatitiis liquoribus intybi sæ-
 tiui latioris, buglossi, & pauco uino albo horis xii. dein-
 de exprimantur, & colentur, adiectisq; serapii rosacci
 purgatorii de infusione rosarum 3.ii. fiat potio, quæ ho-
 ra quarta matutina sumatur. Recipe conseruæ rosa.
 conseruæ radicis buglossi, ana 3.ii. Misceantur, et post tria
 die manè sumantur. Vacuato corpore sequenti electario
 molli utendum quotidie matutinis horis ante pastum, par-
 uæ castaneæ instar: quod ubi deglutitum fuerit, bibatur
 parum stillatitiorum liquorum bugl. et oxalidis. Reci.
 conseruæ uiolarū, conser. rosa. cōseruæ rad. cirsi, ana 3.i.
 pul. diarrhodi abb. pul. trium sant. pul. diamar. frig. ana
 3.ii. corallii rub. 3.i.ß. margaritarū, fragmentorum pre-
 ciosorum communium, an. 3.ii. compositionis diamoschi
 dul. 3.ß. excipiantur serapio de acetositate citri, aut de ri-
 bes, fiat electar. molle, quo utendum, ut dictum est. Aut
 fiat electar. solidum. Recipe pul. diamarg. frigid. pul.
 trium santalor. pulu. diarrhodi abb. ana 3.i.ß. trochisco-
 rum de caphura 3.ii. pul. diambæ 3.ß. conseruæ rosarū,
 conseruæ radi. cirsi, ana 3.ii. sacchari in stillatitio liquo-
 re rosarum dissoluti q.s. fingatur elect. solidum in tes-
 sellarum figuram: sint autem singule ponderis 3. ii.ß.
 Sumat egrotus tessellam unam quotidie manè, & uespe-
 ri ante pastum horis ii. qua deglutita, parum stillatitii
 liquoris buglossi bibat: Fiat deinde cordi sequens epithe-
 ma. Recipe stillatitii liquoris rosarum lib.ß. stillatitio-
 rum liquorum oxalidis, & bugloss. ana 3.iiii. utriusque
 corallii, omnium santalorum, ana 3.i.ß. caphuræ gra.ii.
 pul. diamar. fri. 3.i. croci. 3.i. aceti parum, fiat epithema
 cordi manè, & uesperis ante pastum tepide. Aut fiat sac-
 culus

culus pyramidalis figura, de sericeo panno raro, cui pulueres sequentes insuantur. Recipe rosa. rubrarum siccarum florum buglossi, & cirsii siccorum, ana ʒ. i. omnium santalorum, an. ʒ. ij. corallii rub. ʒ. i. ʒ. bichen, albi, & rub. ana drach. i. ʒ. fiat puluis, qui sacculo, ut dictum est, insuatur. Irrigetur autem stillatitij liquoribus rosarum, & buglossi. & regioni cordis applicetur. Possunt autem hæc cordi, corpore etiam nondum uacuato, extrinsecus admo- ueri. Palpitatio uero cordis si à causa frigida, ut à pituita redundante fuerit, æger ualde pallidus apparet, pulsum habens tardum: frigetq; & grauis est. Materia pri- mum concoquatur, deinde uacuetur. Recipe mel. rosa. col. ʒ. ij. serapij de duabus rad. ʒ. i. serapij de buglossi. ʒ. i. ʒ. stil- latitiorum liquorum mellissophylli (cor à melancholica materia purificat) hyssopi, sampsuchi, ana ʒ. iij. Miscean- tur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Recipe elect. diamoschi dul. ʒ. ʒ. utatur cum serapijs. Reci. agar. recens in pastillorum formam redacti ʒ. i. ʒ. maceretur in oxymelite simpl. & stillatitij liquoribus mellissophylli, & buglossi. per noctem. deinde exprimatur, & coletur. a. licetis deinde cath. ʒ. vi. serapij de buglossi. ʒ. ʒ. cum decocto pectorali fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

Aut sic.

Recipe cathol. ʒ. ʒ. diaphœnici ʒ. ij. serapij de buglossi. ʒ. ʒ. cum decocto pectorali fiat potio, quæ sumatur, ut dictum est. Recipe theriacæ ueter. ʒ. i. conseruæ radicis cirsii ʒ. ij. Misceantur, & postridie mane sumantur, sex horts ante pastum. Si pilulis uti quis uoluerit, sumat pil. de hie- ra simpl. aut de agar. aut alephang. Quæ uero sequun- tur sumpta, cordi robor adijcient. Recipe corticis citri,

L saccha.

DE MORB. INTER. CVR.

saccha. conditi. unc. ij. conseruæ rad. cirsi. 3. i. β. pulueris diamb. pul. diamoschi dulc. pul. letitiæ Gal. ana. 3. i. β. compositionis de hyacintho. drach. ij. seminis citri (cor enim corroborat) drach. i. corallij rub. 3. iij. myrobalanum unam empeliticam conditam (si diues sit) cum serapio cōseruationis corticis citri fiat electarium molle, de quo parua castaneæ instar sumatur manè, & uesperis tribus horis ante pastum, quo deglutito parum uini minimè diluti bibatur. Si quis electario solido magis delectetur, hunc in modum paretur. Recipe diamoschi dul. pul. diamb. pul. elect. de gem. ana. drachm. i. β. corticis citri saccha. conditi conser. rad. cirsi. ana. drachm. ij. sacchari dissoluti in stillatitiis liquoribus melissophylli, & buglos. q. s. fingatur electarium solidum in tessellarum figuram, sintq; singule ponderis, drach. ij. β. Sumatur tessela una manè, altera uesperis, duabus aut tribus horis ante pastū. Quibus deglutitis parum mox uini meri bibatur. Cordi uerò sequens epithema fiat. Recipe stillatitiorum liquorum buglos. & melissophylli, ana. libr. β. uini aromatici, aut aruisii. unc. iij. pul. electarij de gem. caryophyllorum, ana. drachm. i. β. pul. diamb. 3. iij. seminis citri, behen albi, & rub. ana. 3. ij. croci. 3. i. Misceantur, fiatq; cordi epithema calidè, manè, & uesperis ante pastum. Palpitatio cordis per uentriculi consensum nonnunquam contingit. Qui sic afficitur,umat alternis diebus unam, aut duas, aut tres pilul. de hiera simpl. aut alephang. per horam ante coenam. Præterea compositionibus sumendis, paulò antè dictis utatur, & potissimum superius proximè tradita, adiecta pulueris aromatici rosa. maioris à Gabriele traditi. drac. i. Ventriculo etiam robur adijciatur
empla

emplastris, unguētis et sacculis posteriùs dicēdis, cū de illius affectibus dicetur. Si biliosus humor in uētriculo cōtineatur, uacuetur medicamētis traditis in palpitatioe à cā calida. Palpitatio cordis si p cōsensū aliorū mēbrorū fit, curetur illorū affectus: cor deinde roboretur: ut dictū est. Palpitationis cā si uermes fuerint, interficiātur sumpto pulucre, qui posteriùs tradetur in Fame Canina.

SYNCOPE CVRATIO. Cap. VIII.

P Ræceps uirium lapsus, Syncope appellatur: cuius Cau causa sunt multiplices. Nonnunquam fit ob crudorum humorum redundantiam in ore uentriculi. Qui in Syncopen, hanc ob causam incidunt, his hypocondria inflantur totumq; corpus maiore apparet mole, quàm pronaturæ modo, color ad albidius mutatur: corpus, ut scemel dicam, aqua inter cutem laborantibus est simile: interdum tamen ad nigrus, aut liuidius accedit. Nonnunquam uerò ob uitiosorum humorum, & acrium copiam hoc mali contingit. At hi qui horum causa Syncopen incurrunt, assiduus in ore uentriculi mordicationes, & uellicationes sentiunt. Interdum etiam Syncope corripitur nonnulli ob tenues quosdam succos, ori uentriculi ingruentes, ceterum citissimè exhalātes, in his sanè facies illa mortifera ab Hippocrate depicta, nasus acutus, oculi caui, & cætera, celeriter apparent. A Cordis quoque uitio hoc mali sæpenumero originem trahit, cum uehementer intemperatum est. Accidit & frequenter ob multam sanguinis excretionem, sudores copiosos, uehementem motum, nimiam uentris inanitionē, multas uigilias, dolores insignes, ob omnes denique immoderatas euacuationes, animiq; perturbationes. 3 gna. Syncope autem

L 2 laborant

DE MORB. INTER. CVR.

Curandi
ratio.

laborantibus rarus, obscurusq; pulsus est, extremæ partes frigent, circa faciem sudor exilit, cutis nitor pristinus aufertur, anguntur animo, corpusq; iactatur. Causæ si externæ fuerint, auferendæ: si internæ illis medendum modis, in Cordis Palpitatione dictis, aut posterius dicendis, cum de uentriculi affectibus sermo erit. Paroxysmo uerò hunc in modum succurrendum. Primum inspergatur faciei stillatitius rosarum liquor moschatus, si haberi potest: sin minus, solus stillatitius rosarum liquor, aut cum aceto permixtus: utriusque defectu, sola aqua frigida. Ab alto autem demittatur in faciem, ut sopiti spiritus excitentur, & si qui adhuc in partibus externis remanserint, resolui prohibeantur: & hæc maximè fiant si ab aestu, aut febris incendio, aut alia causa calida Syncope sit, non autem si à causa frigida, aut immodico alui fluore, quem frigida intrò comprimens auget. Secundò, nares, & os comprimantur, ut inspiratus aer interiora petens, & paulò mox egredi uolens, calfactus ad cor redeat, ipsumq; cal faciat, spiritusq; reficiat, & excitet. Tertiò, partes extremæ, ut crura & brachia uinculis uehementer constringantur, linteisq; modicè asperis perfricentur, ut spiritus qui ad cor se receperunt, reuocentur. Cæterum hæc non fiant proximè dicta, ubi syncopes causa foret immodica uentris inanitio, aut sudores copiosi, aut fames, aut immoderata alia quæpiam euacuatio, ne pauci illi spiritus, qui supersunt, seque ad cor receperunt, dissoluantur. Porro qui hanc ob causam Syncope corripuntur, hausto (ut post dicetur) uino, & odoribus admotis, cæteris remedij omittis, quieti permittantur. Quartò, detur uinum aromaticum bibendum, nisi à fame, aut immodica aliqua euacuatione

tione Syncope sit, tunc enim edendum panis frustulum, ui-
 no diluto immersum exhibeatur: quod si comesse nequeat,
 sorbendum exhibeatur ius pulli, aut pullæ, aut aliarum re-
 centium carniū cum uino. Cū sit Syncope à spirituum
 resolutione, quæ famem, & immodicas euacuationes con-
 sequi solet, uinum quod exhibetur, crassum sit, sed aqua
 dilutum: ab alijs uerò causis si fuerit, tenui sit & colo-
 re, & substantia. Huiusmodi etenim uinum, spiritus ce-
 leritur instaurat, & reficit. Iucundis præterea odoribus
 facultate quidem calidis, si Syncope causa sit frigida, spi-
 ritus instaurandi, alendiq; sunt, qui non solum naribus
 ægrotantis sunt admouendi, ut olfaciat, sed etiam inflan-
 do naribus immittenda odora menta id tenuissimum pul-
 uerem redacta. Algalia, moschus, styrax calamitis, lada-
 num, & id genus alia permulta boni odoris, hanc ad rem
 sunt idonea. Syncope uerò causa si calida sit, odoretur
 ægrotus santala præsertim citrina, quod magis odorifera
 sint: rosas, caphuram, & alia odorifera simili facultate
 prædita. Syncope uerò si à præfocatione ex utero sit, à
 iucunda illis odoribus abstinendum, quin grauitè olen-
 tia naribus quidem iniucunda, sed ori uentriculi grata,
 adhibenda ipsis naribus sunt, ut eorum odore percepto ma-
 trix subsidat, suauiter autem olentia uulua admoveantur.
 Quintò sternutamentum prouocetur: spiritus enim exci-
 tat, & à corde, quò se receperunt, ad exteriora membra
 reuocantur. Sextò, os digitorum, aut cunei, aut cuiuspiam
 alterius rei immiissione diducatur, linguaq; theriaca, aut
 mithridatio fricetur. Septimò, uociferationibus, altisq;
 clamoribus spiritus circa cor sopiti, excitandi.

DE MORB. INTER. CVR.
DOLORIS VENTRICVLI

Curatio. Cap. IX.

Ventriculi dolor à flatibus in ipso generatis plerū
que fit. Generantur autem, aut ex pituitosis humo-
ribus in eo contentis, aut ex cibis in uapores ab imbecillo
calore resolutis. Vnde magna uentriculi grauitas senti-
tur, & distentio, propter quā spirandi difficultas adest,
uentriculo distento septum transversum comprimente.
Leuantur cibo infimas ad uentris partes descendente, &
flatibus siue per ructus. siue per aluum exclusis. Hic au-
tem dolor summo studio statim anodynus placandus, quod
exacto sensu tactus præditus sit, os præsertim ipsius,
quod munus quoque ipsius sit alimentum in chylum toti
corpori communem mutare, quo in sanguinem mutato,
uniuersæ corporis partes nutriuntur. Hæc igitur ad dolo-
ris mitigationem fiant. Recipe florum chamæmeli, & me-
liloti. ana. M. i. seminum lini, & fœnogr. ana. ʒ. ij. seminū
anisi, cari, & fœniculi, ana. ʒ. ij. absinthij, rosarum rub.
ana. tertiam partem Manipul. i. Decoquatur in s. q. aque,
in qua calida madesiat spungia, quæ deinde expressa, uen-
triculo admoueatur, eaq; foueatur. Recipe ol. chamæme-
li, olei anethini, olei de lilio, ana. ʒ. i. ʒ. His cōmistis inun-
gatur uentriculi regio post fotum. Humores deinde uacue-
tur, hunc in modum. Recipe pil. de hiera simp. aut ale-
phāgina, ʒ. ij. agarici in pastillorum formam redacti, ʒ. i.
ʒ. mastich. ʒ. ʒ. Excipiantur melle rosaceo, finganturq;
pilul. vi. ē drachma, ē quibus tres per horam ante cœnam
semel, aut bis, singulis hebdomadis sumantur. Humor uerò
si multus fuerit, uentriculoq; tenaciter hærens, atque
ægotans robusto fuerit corpore, hunc in modum uacue-
tur

tur. Recipe diaphœnici unc.ß. aut drach.v.cum saccharo fiat bolus, qui potionibus maturius sumatur. Venter deinde tam sumptis quàm admotis, roboretur. Sumptis quidem hunc in modum. Recipe elect. mollis aromatici rosa. maioris lib.ß. sumatur castaneæ instar quotidie manè, & uesperis duabus, aut tribus horis antè pastum, uno aut altero die per hebdomadam intermisso. Recipe coriandri præparati unc. iij. anisi, cinnamomi selecti, fœniculi, cari, ana. unc.ß. maceros drach. ij. maceros. 3.ß. pulueris diacydonites sine speciebus 3. ij. sacchari ad pondus omnium, fiat puluis, quo in fine pastus sumpto bibendum non est. Extrinsecus autem uentriculo hæc admoueatur.

Recipe cerati Gal. stomachici, hoc est emendatis uitia stomachi, olei nardini, ana. unc. ij. His commistis, uentriculi regio linatur calidè manè, & uesperis ante pastum.

Aut sic.

Recipe olei absinthij uncias. ij. olei nardini, olei mastich. uel lentiscini, olei ex cotoneis, an. 3. i. caryophyllorum, menthe sicce, cardamomi, corallij rubri, mastich. an. 3. i.ß. rosarum rub. 3. ij. Adiecta cera. q. s. fiat unguentum, quo uentriculi regio ungatur manè, & uesperis ante pastum. Odoris autem gratia addi potest spica nardi drach.ß. styracis calamitidis, ladani, ana. drach. i.ß.

Aut fingatur emplastrum.

Recipe emplastri de mastich. emplastri pro stomacho, an. 3. i. galangæ 3. ij. styracis, calamitidis, ladani, an. 3. i.ß. subigantur cum oleo absinth. & fingatur emplastrum ea figura, qua sunt, quæ uulgo Medicorum scuta stomachalia appellatur, regioniq; uentriculi admoueatur.

Aut fingatur sacculus.

L 4

Recipe

DE MORB. INTER. CVR.

Recipe absinth. sicci. menthæ siccæ. sisymbrij, ana M. ß. coriandrè præparati 3. iij. caryophyllorum, cinnamo. selecti, ana 3. ij. ladani 3. i. ß. corallij rub. 3. iij. maceris 3. i. cocci infectorii 3. ß. terenda, & pulueranda puluerentur: commista deinde omnia panno sericeo purpurco insuantur, fingaturq; sacculus acu interpunctus. figura scuti (ut loquuntur) stomachalis, qui uentriculi regioni admoveatur.

DOLORIS VENTRICVLI

à frigida causa Curatio.

Dolor uentriculi si à causa fit frigida, calidis illi medicamentis succurrendum. Sed si hepar sit calidum, uerendum ne dum uni mederis, alteri noceas, & calidis medicamentis uentriculum iuuans, hepatis caliditatem augeas. Fiat igitur hunc in modum. Primum mitigetur dolor anodynis suprâ traditis: obseruandum tamen ne hepatis regio fomentis illis attingatur. Mitigato dolore, his pilul. utendum, bis singulis hebdomadibus. Recip. pil. de hiera simp. (aloe lota in stillatitio liquore intybi satiui latioris) 3. iij. rhabar. selecti, oxyphœnicon, ana 3. i. Excipiantur scrapio rosacco purgatorio, finganturq; è 3. pil. vi. è quibus tres per horam ante coenam sumantur. Ventriculus deinde tam sumptis, quàm admotis roboretur. Sumptis quidem hunc, in modum. Recipe pul. aromat. rosa. maioris à Gabriele traditi, 3. ij. pul. electar. trium santal. pul. diarrhodi abb. ana 3. ij. conser. rosarum, corticis citri saccharo conditi, ana 3. ij. ß. sacchari stillatitijs liquoribus rosa. & absinthij dissoluti q. s. fingatur electarium solidum in rhomborum figuram, sintq; singuli ponderis 3. ij. ß. Sumatur unus quater per hebdomadam, horis

ris tribus ante pastum mane: quo deglutito, bibatur pa-
rum uini rubri modicè diluti.

Aut fiat electarium molle.

Recipe corticis citri saccharo conditi, ʒ.ij. conseruæ
florum cicho. conseruæ rosa. ana ʒ.ʒ. electar. mollis aro-
matici rosa. maioris ʒ.ij.ʒ. pul. electar. trium santalo. pul.
diarrhodi abb. ana ʒ. i.ʒ. pul. diagalangæ ʒ. i. Excipiantur
serapio adianti, fiat q; elect. molle, de quo parue castaneæ
instar quater per hebdomadam sumatur mane tribus ho-
ris ante pastum. Poterit etiam, qui uolet, componi cum
serapio conseruationis myrobalanorum empeliticarum.
Extrinssecus autem uentriculo admoueantur aut unguen-
ta, aut emplastra, aut sacculi, quorum paulò antè formu-
le sunt traditæ. Hepati uerò extrinssecus sequentia ad-
moueantur. Recipe cerati santalini unc. iiij. olei rosa-
cei, olei nymphææ, ana unc. i.ʒ. Lauentur aqua frigida,
aut stillatitio liquore rosa. deinde adijciatur spicæ nar-
di ʒ. i. regioni hepatis tepidè simul mista admoueantur
mane ante pastum, bis singulis hebdomadibus, toto medi-
cationis tempore.

Aut sic.

Recipe stillatitij liquoris intybi satiui latioris ʒ. viij.
stillatitij liquoris rosarum ʒ. iiij. omnium santalorum, an.
ʒ. i.ʒ. trochiscorum de caphura, ʒ. ʒ. seminum oxalidis,
portulacæ, & intybi satiui latioris, ana ʒ. ij. spicæ nar-
di ʒ. i. Commistis omnibus fiat epithema hepati tepidè
ante pastum mane, bis per hebdomadam.

Aut fingatur sacculus.

Recipe rosa. rubrarum, florum nymphææ, florum uio-
larum, ana. P. i.ʒ. seminum portulacæ, oxalidis, & intybi

L 5 satiui

DE MORB. INTER. CVR.

satiui latioris, an. ℥.ij. spodij. ℥.ij. trochiscorum de caphura. ℥.℞. spice nardi. ℥.i. omnium santalorum, ana ℥.i. insuantur sericeo panno purpureo & raro, singaturq; sacculus acu interpunctus, qui irrigatus stillatitijs liquoribus rosa. & intybi satiui latioris regioni hepatis applicetur tepide, ante pastum manè. Vbi autem frigescece coeperit, rursus tepesiat: idq; bis per hebdomadam fiat. Utè dum & sequenti puluere in fine pastus. Recipe coriandri præparati. unc. iij. anisi, cinnamomi selecti, fœniculi, ana. ℥.ij. ℞. pul. diacydonites sine speciebus. ℥.ij. maceris. ℥.i. sacchari rosacei ad pondus omnium. Fiat puluis, quo in fine pastus sumpto, à potu abstinendum.

DOLORIS VENTRICVLI

à bili, Curatio.

Ventriculi doloris, bilis nōnunquā causa est, quæ si uentriculo innatet, uomitu euacuanda, qui hunc in modum eliciatur. Recipe aquæ tepidæ. ℥.vi. serapii acetati simpl. unc. i. ℞. Misceantur & post cibum bibantur, digito deinde aliquantò post in os, & fauces immisso, aut penna, uomitus eliciatur. Si uerò egrotus suapte natura non facile uomat, euacuetur sumpta potione sequenti. Recipe serapij rosacei purgatorii ℥.ij. rhabar. puluerati. drachm. i. myrobalanorum flauarum. drach. i. ℞. Excipiantur stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, & absinth. fiatq; potio, quæ hora quarta matutina sumatur. Si uerò bilis ab hepate in uentriculum per interualla transmitti uideatur, utendum elect. molli sequenti.

Recipe carniū cotoneorum conditarum saccharo sine speciebus. unc. ij. conseruæ rosarum, conseruæ oxalidis, ana. ℥.i. pul. electar. trium santalorum, et diarrhodi abb.

ana.

ana. drach. i. ß. myrobalanum unam conditam. Excipiantur serapio rosarum de rosis siccis, fiatq; elect. molle, de quo sumatur parua castanea instar, manè tres horas ante pastum alternis diebus. Præterea uentriculi regio sequentibus oleis ungatur. Recipe olei myrthei, olei ex cotoneis, ana. q. v. olei mastich. parum, ungatur regio uentriculi calide ante pastum. Alterantia deniq; hepatis regioni admouenda, quorum formulæ ex superius traditis petende sunt.

VOMITVS CVRATIO.

Cap.

X.

Vomitus, ac uomendi cupiditas, inanisq; irritatio fit Causæ.
 unt à uitiosis humoribus calidis, aut frigidis in uentriculo contentis: qui aut in ipsius uentriculi amplitudine innatant, aut in eius tunicis infarti sunt. Iiq; humores, aut crassi sunt, & lenti, uiscidiq; ac tunicis uentriculi instar uisci adhærent, ægreq; auelli possunt: aut serosi, & uelut aqua in spongia uentriculi tunicis immerguntur. In cavitae uerò uentriculi eo contineantur, an uerò eius tunicis sint infarti, ita dignoscemus. Nam si uentriculi amplitudine innatent nausæamq; excitent, uomitio signa.
 magna ex parte sequitur, quæ nobis ostendit humorem uentriculo molestum, quod eius pars una cum cibis interdum euomatur. Si uerò uentriculi tunicis aut hæreant, aut immersi sint, uomendi quidem cupiditatem inducunt, sed inanem, idq; magis ante cibum, quam eo sumpto. Atque hi humores aut in ipso uentriculo, ob eius intemperiem, nascuntur: aut ex aliqua corporis parte male affecta, puta ex iecore, liene, aut capite, interdum ex uniuerso corpore se expurgante in ipsum confluunt. Si ab
 uniuerso

DE MORB. INTER. CVR.

uniuerso corpore in ipsum transmittantur, quod contingit ubi uniuersum corpus uitiosis humoribus plenum est, id quod cum ex colore, tum ex pustulis circa cutem erumpentibus, & urina cognoscitur, prior cura totius corporis habenda, deinde uentriculi. Si uerò ex aliqua alia parte male affecta, itidem in primi illius habenda ratio: quarum curandarum methodum partim superius diximus, partim posterius dicetur suo quidem loco. Si ab intemperie uentriculi, uitiosi in ipso nascantur humores, intemperies illa primum curanda, si calida, frigidis: si frigida, calidis. Humor deinde in uentriculo contentus purgetur. Qui si frigidus, pituitosusq; fuerit, siue in uentriculi cauitate innatet, siue eius tunicis hæreat, uitanda illius uacuatio uomitu, qui sic eliciatur. Recipe radicis raphani, unc. ij. seminis atriplicis, seminis anethi, ana ʒ. i. Decoquantur in libr. ii. aquæ, donec dimidium absumatur, accipe iuris decocti ʒ. vi. oxymelitis scillini, ʒ. i. ʒ. Commisceantur, & bibantur post cibum quidem, si materia uideatur uentriculo ualde adhærens, aliàs ante cibum. Deinde deambulandum hora dimidiata, aut una. Quod si sua sponte uomendi cupiditas non accedat, penam oleo imbuta ori, et faucibus imittatur. Vbi uomuerit, os uino rubro colluatur. Deinde enemate sequenti utendum. Recipe maluarum, betæ, linozostidos, helxines, chamæmeli, ana M. i. centaurii minoris, M. ʒ. seminum anisi, & fœniculi, an. ʒ. ii. Decoquantur in s. q. aque usque ad partis dimidiæ absumptionem. acciplantur iuris decocti lib. i. ʒ. cas. saccha. rubri, ana ʒ. i. elect. indi maioris, aut diaphœnici unc. ʒ. olei chamæmeli ʒ. iii. salis cum ʒ. i. ʒ. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum iniiciatur.

iciatur. Purgantibus quoq; medicamentis uacuanda pⁱtuita, sed prius diffecanda oxymelite simplici, in quo ali-
quod ex medicamētis, quibus incidendi, & extenuandi fa-
cultas inest, sit decoctum, ut hyssopus, iridis radix, satu-
reia, origanum, marrubium. Vacuetur deinde sumptis hie-
re picre simpl. Gal. 3. vi. aut unc. i. horis duabus ante pa-
stum manē, aut sequentibus pil. Recipe pilul. de hiera
simpl. aut alephang. drach. i. cum stillatitio liquore ab-
sint. fingantur pil. v. quæ post cœnam frugalem circa ho-
ram decimam sumantur. Materia uerò si multa fuerit,
sumatur unc. 3. diaphœnici cum sacchar. in formam bo-
li, hora quarta matutina.

Aut sic.

Recipe diaphœnici unc. 3. mel. rosa. col. 3. i. Excipian-
tur stillatitio liquore absinth. fiatq; potio, quæ sumatur
antelucano tempore. Pilulæ & boli in uentriculi affecti-
bus magis probantur, quàm potiones. Roboretur dein-
de uenter sumptis compositionibus in dolore uen-
triculi traditis. Extrinsecus autem hæc admoucantur.

Recipe absinthii, iunci odorati, ana M. i. rosarum rub.
P. i. caryophyllorum, mastich. ana 3. ii. cinnamomi, nucis
moschatæ, ana 3. i. cyperi 3. ii. 3. Decoquantur in uino
rub. aromatico, in eoq; calido madefacta spongia, & ex-
pressa foveatur uentriculi regio manē, & uesperī. Un-
gatur deinde unguento sequenti. Recipe olei absinth.
olei nardini, olei mastich. olei ex cotoneis, ana unc. i. co-
rallii rubri, menthæ siccæ, caryophyllorum, ana 3. i. 3. spi-
cæ nardi 3. ii. rosarum rubr. 3. i. adiecta cera q. s. fiat un-
guentum, quo ungatur uentriculi regio manē, & uesperī
ante pastum post fotum. Aut unguenti loco fingatur ce-
raturum

DE MORB. INTER. CVR.

ratum hunc in modum. Recipe mastich. ʒ. ij. ʒ. ladani ʒ. ij. coriandri præparati, corallij rub. caryophyllorum, an. ʒ. ij. spicanardi, ʒ. ss. styracis calamitidis ʒ. i. olei absinth. olei nardini, ana parum, adiecta cera. q. s. fingatur ceratum, quod uentriculi regioni post fotum superius traditum applicetur.

VOMITVS A' BILIOSO HV-

morc, Curatio.

Vomitvs interdum biliosus humor in causa est, quæ testantur oris amaritudo, sitis uentriculi morsus, ructusq; nidorosi. Vomitu præterea, si biliosus is humor in uentriculi sinu contineatur, foras portio quædam effertur. Si uero uentriculi tunicis infartus sit, uomendi quidem cupiditatem irritat, sed inanem, idq; ante cibum præcipue. Gignitor hic humor interdum in ipso uentriculo, ob eius intemperiem interdum uero ab aliqua parte, puta hepate in ipsum transmittitur, id quod per interualla fit, ieiuno uentriculo. Siue autem hic humor in uentriculi cauitate innatet, siue eius tunicis sit infartus, eius uacuatio uomitu primum tentanda est, hunc in modum. Recipe aquæ tepidæ unc. vi. sera. acetati simpl. ʒ. i. ʒ. Misceantur, & post cibum bibantur præcipue si uentriculi tunicis is humor infartus sit. Concoquatur deinde, & euacuetur hunc in modum. Recip. serap. de omphacio, serap. acet. simpl. sera. intybi satiui latioris simpl. ana ʒ. i. ʒ. stillatiorum liquorum oxalidis, cichorij, rosarum, ana ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Recipe elect. trium santalorum unc. ss. utatur cum serapis. Recipe myrobalanorum flauarum confricatarum oleo amygdal. dulc. drachm. ij. macerentur in stillatio

titio liquore plantag. horis duodecim: deinde exprimantur, & adiectis rhabar. puluerati (sic enim maiorem habet) scrup. iij. scrapij rosacei purgatorij unc. i. ss. fiat portio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe carum cotoneorum, saccharo cōditarum, sine speciebus uncias duas, sumuntur drach. ij. statim à pastu. Si autem bilis in uentriculum ab hepate confluere uideatur, ei sic prospiciendum. Recipe cerati santalini unc. iij. olei nymphææ, olei rosacci, ana ʒ. i. ss. Lauentur aqua frigida, deinde adijciatur spica nardi, scrup. i. Misceantur, & hepatis regioni tepide applicentur ante pastum. Deniq; compositiones uentriculum roborantes, fotus, & unguenta, petenda ex capite uomitus sanguinis paulò post dicendo.

SINGVLTVS CVRATIO.

Cap: XI.

Singultus uentriculi motus est, ab expultrice facultate noxia extrudere uolentis excitatus. Fit plerunq; à plenitudine, cui uomitus optimum est remedium. Aliquando ab inanitione, qui conuenientis alimenti assumptione sanatur, & per ea, quæ defectū explent. Oris quoque uentriculi frigiditas, cibiq; corruptio, singultum frequenter inducūt, idq; maximè in pueris. Spiritus autē retentio, quæ calorem auget, singultui à frigiditate præsens remedium est. In febribus nonnunquam fit singultus, aut stomacho, aut aliquo alio uicino uiscere inflammato. Fit plerunque ob acrium humorem mordacitatem, atq; ob cibum corruptum, in mordacemq; qualitatem mutatum. Piper quoq; & quæ eiusdem sunt facultatis, immodicè ingesta singultū excitant, iis præsertim quibus oris uentriculi facilis est sensus. Singultus aut ab humorib. acris,

Cause.

& more

DE MORB. INTER. CVR.

Et mordacibus eorum uacuatione curetur, primum quidem per uomitum hunc in modum. Recipe aquæ tepide ℥.vi. serapij acetati simp. ℥.i.ß. Misce intur, et bibantur: fiatq; ut de alijs uomitum elicientibus superius dictum est. Potione deinde hac purgante utendum. Recipe rhabbar. selecti ℥.i. maceretur in stillatitio liquore intybi satiu latioris, et pauco uino albo horis xij. adiectisq; serap. rosa. purgatorij ℥.ij. fiat potio, quæ appetente diluculo matur. Dies deinde complusculos elect. trium santalo. manè ante pastum utendū. Si uerò à pituitosis humoribus sit, curetur præsidij in uentriculi doloribus à pituita dictis.

CHOLERAE MORBI CVRATIO.

Cap.

XII.

Cholera morbus est, quo uomitibus, et deiectionibus biliosa deijciuntur, tanto interdum impetu, ut cum humoribus, multis quoque uacuatissimis spiritibus, uires admodum langueant, sitiant ægrotantes ac sudent, tremor cordis, ac syncope succedant, nonnunquam et mors. Ex alimentorum prauitate aliquando oritur, plerumque autem ex uitiosorum humorum copia, ut à bile admodum corrupta, aut à pituita salsa putri. Hoc autem malum acutissimum est, danda igitur opera, ut ei acurate sine mora succurratur. Moretur ægrotus in aere temperate calido, et temperate frigido, parumq; luminoso. Nam lumen, et calor humores exagitant, et spiritus resoluunt. Frigus uerò etsi spiritus resolui prohibet, materias ad uentriculū, et intestina protrudens, nocet. Si metus sit, ne uires prosternantur, cibus paucus, coctusq; facilis exhibeantur: sin minus, cibo abstinendum. Principio quæ efferuntur cohibenda non sunt. Quin si nauseabundus est ægrotans

nec

nec liberè uomat, iuuandus est, propinandaq; ei aqua tepida cum serapio acetato simp. ut superius saepe diximus. Materia autem maiori ex parte uacuata, quod in horis uiginti quatuor plerunq; fit, leniter huiusmodi cohibitionem incipere licebit. Bibet igitur agrotus sitis tempore aqua coctam cum serapijs de acctositate citri, ex cotoneis, rosarum de rosis siccis, æquis inter se portionibus cum aqua cocta mistis. Utatur & electa molli sequente. Recipe conserua rosarum antiquæ, conserua oxalidis, an. ʒ. i. ʒ. carnium cotoneorum conditarum saccharo, siue speciebus ʒ. ij. pulueris crystalli ʒ. ij. omnium sant. ana ʒ. i. semin. citri ʒ. ij. excipiantur serapio conseruationis myrobal. empeliticarum, fiatq; elect. molle, de quo sumatur instar dimidiatæ castaneæ per horam ante pastum manè, & uesper. Extrinsecus autem sic roboretur uenterculus. Recipe olei è baccis myrthi. olei ex cotoneis, ana ʒ. ij. olei mastich. ʒ. i. ʒ. boli armenia ʒ. ij. corallij rubri, coriandri preparati, santali citrini, ana ʒ. i. ʒ. rosarum rub. ʒ. ij. hypocistidos, acacia, ana ʒ. i. his commistis & temperatè calidis ungatur regio uentriculi manè, & uesper. ante pastum. Plerunq; contingit ut post largiorem esum melonum, cucumerum, & aliorum id genus fructuum, uenterculus grauiter laboret, euomanturq; uiscida quedam, & pituitosa laborantisq; facies mortuo sit persimilis. Ceterum nihil Medicus terreri debet, quòd nihil inde periculi grauioris impendeat. Cum autem natura uomitu se expurgare contendat, hunc in modum iuuanda est. Recipe aquæ tepidæ ʒ. vi. oxymelitos simpl. ʒ. i. ʒ. Misceantur, & bibantur, fiatq; ut de aliis uomitum elicientibus, superius saepe dictum est. Venterculus autem uomitu ubi expurga-

M tus

DE MORB. INTER. CVR.

tus fuerit, tam sumptis, quàm admotis roboretur. Sumptis quidem hunc in modum. Recipe corticis citri saccharo conditi. ʒ. ij. conseruæ rosarum antiquæ. ʒ. ʒ. radice heptaphylli, radice betonica, ana. ʒ. i. ʒ. seminis citri. ʒ. i. carnium cotoneorum conditarum cum speciebus. unc. ʒ. cornu cerui usti. ʒ. ij. boli Armenia lotæ in stillatitio liquore rosarum. ʒ. iij. excipiantur serapio conseruationis corticis citri, fiatq; electarium molle de quo sumatur castaneæ instar ante, & post pastû. Extrinsecus uerò sequenti unguento roboretur. Recipe olei nardini, olei absinth. olei mastich. olei cotoneorum, ana. ʒ. i. menthæ siccæ. ʒ. i. caryophyllorum, cardamomi, agallochi, corallij rub. ana. ʒ. i. ʒ. adiecta cera. q. s. fiat unguentum, quo uentriculi regio ungatur manè, & uesperis ante pastû calidè.

Aut utatur emplastro sequenti.

Recipe emplastri de mastich. emplastri pro stomacho, ana. ʒ. i. ʒ. galangæ, corallij rubri. ana. ʒ. i. ʒ. Adiecto oleo nardino subigantur, singaturq; emplastrum in figuram stomachalis, ut loquuntur, scuti: quod uentriculi regioni applicetur.

ANOREXIAE CVRATIO. Cap. XIII.

Causæ.

Fames naturalis fit ob sensum exuctionis uenarum, qui quidem sensus si aut obtundatur, aut amittatur, aut exuctio ipsa non fiat, tunc Anorexia, hoc est Appetitiæ amissio contingit. Si corpus quoq; non inaniatur, accidere solet. Idem contingit, uentriculo intemperie calida laborante: aut sanguine immoderatè misso: aut si uenter, intestinaq; immodicè fluxerint. Plerunq; uerò appetitiæ prosternitur, humorum aut biliosorum, cum intemperie uentriculi calida, aut pituitosorum cum intemperie frigida,

frigida, in uentriculo contentorum uitio. Qui autem ob signa. biliosos humores cibum auersantur, uentriculi morsu torquentur, siti, nauseaq; infestantur. Quod si biliosus is humor in uentriculi cauitate contineatur uomitu uacuetur: qui sumptis ieiuno uentriculo. 3. vi. aquæ tepidæ, & sesquiuncia. serapij acetati simpl. eliciatur, digitos etiam, aut pennam, ut superius sæpe dictum est, in os & fauces immittendo. Si uero in uentriculi tunicis infartus sit, experiri dum quoque an uomitu educi possit, ipsum eliciendo, ut proxime dictum est. Quo quidem modo si non educatur, potionem sequenti uacuetur. Recipe rhabar. selecti. sesquidrachmam. spicæ nardi gr. vi. myrobalano. flauarum confricatarum oleo amygdal. dul. drachm. ij. maccerentur in stillatitio liquore intybi satiui latioris, & pauco uino albo per noctem, deinde exprimantur, & colentur, adiectisq; serapij rosacci purgatorij de infusione rosarum unc. ij. cum stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, & oxalidis fiat potio, quæ antelucano tempore sumatur.

Aut sic.

Recipe mannae granulosi unc. ij. cas. recens extractæ drach. vi. serapij uiolacci unc. i. excipiantur iure communis medicinarum decocti, aut stillatitio liquore intybi satiui latioris, fiatq; potio, quæ sumatur diluculo, Bilioso humore uacuato, calidi uentriculi intemperies hunc in modum alteretur. Recipe serapij de malis punicis, aut serapij de succo oxalidis, aut serapij de persicis unc. ij. sumantur horis duabus ante pastum. Persica quoque in pastus principio sumpta appetentiam irritant, si à causa calida prostrata sit. Serapium autem de persicis sic fit.

M 2

Recipe

DE MORB. INTER. CVR.

Recipe succi persicorum, quæ nondum plenam maturitatem sunt adsecuta, libr. iij. Decoquantur usque ad dimidij consumptionem, permittantur subsidere feces, deinde adijciantur succi malorum punicorum. unc. vi. sacchari q. s. simul perfecte coquantur, depurentur, adiectisq; santalis citrinis. q. s. suauis odore reddatur. De hoc serapio sumantur unc. ij. manè, & uespèri duabus horis ante pastum. Si persica desint, pro illis substitui potest succus pomorum acidorum redolentium, minimè dulcium. Aut horum loco utatur ægrotus elect. molli sequente.

Recipe conseruæ rosarum, conseruæ oxalidis, ana scesquiunciam corticis citri saccharo conditi unc. semissem, carniū cotoneorum saccharo conditarum sine speciebus. unc. ij. pul. elect. trium santalo. ℥. iij. coralliorum rub. ℥. i. excipiantur serapio omphacino, aut de malis punicis, fiatq; elect. molle, de quo sumatur castaneæ instar, manè & uespèri horis duabus ante pastum.

Aut sic.

Recipe absinth. q. s. decoquatur in aceto forti, accipiat tur decocti illius lib. i. adiecto saccharo. q. s. fiat serapium perfecte coctum. depuretur, adiectisq; santalis citrinis. q. s. odore suauiore reddatur. De hoc serapio sumantur. ℥. ij. ante pastum manè, & uespèri: Ventriculus præterea fotu, sequenti foueantur. Recipe rosarum rubrarum M. i. foliorum oxalidis, & intybi satiui latioris, ana M. semissem, absinth. sicci tertiam partem. M. i. coriandri præparati unc. semissem, omnium santalorum, ana scesquidrachmam, baccharum oxyacanthæ drach. ij. Decoquantur in s. q. aquæ, adiectis succi cotoneorum unc. ij. aceti parum. Huic decocto calido sponsia immergatur, deinde
exprie

exprimatur, eaq; calente uentriculi regio foueatur mane, & uespero ante pastum. Ungatur deinde sequenti unguento. Recipe olei ex cotoneis, olei rosacei, olei myrthei, an. ʒ. i. ʒ. olei absinth. ʒ. i. corallii rub. coriandri præparati, santali citrini, & rubr. an. ʒ. i. ss. trochiscorum de caphura. ʒ. i. ʒ. rosarum rubr. ʒ. ii. aceti parum, ceraq; adiecta. q. s. fiat unguentum, quo uentriculi regio ungatur mane, & uespero post fotum. Huius autem unguenti uicem, ceratum santalinum deplere potest.

ANOREXIAE A PITUITOSO

humore Curatio.

ANorexia uero si à pituitoso humore in uentriculo contento, cum intemperie frigida orta sit, siue is humor in uentriculo tunicas sit impactus. siue secundum internam spatij latitudinem in eo contineatur, experiri-
dum an uomitu educi, indeq; auelli possit. Eliciatu-
tem, ut in uomitus curatione ab humore pituitoso dictū
est. Qui si uomitu non perfectèeductus fuerit, incidatur,
extenueturq; hunc in modum, deinde uacuetur. Reci-
pe oxymelitos simpl. aut scillini (si quidem humor uiscia-
dus ualde, crassusq; fuerit) ʒ. iij. mellis rosacei col. unc. i.
ʒ. stillatitiorum liquorū absinth. menthæ, fœniculi, ana
ʒ. iii. Misceantur, & à ieiuno diluculo per triduum bibā-
tur. Repetantur autem donec materia probè cocta ui-
deatur. Recipe aromatici rosa. maioris. ʒ. ʒ. utatur agro-
tus cum serapiis. Recipe hieræ picræ Gal. ʒ. ʒ. aut. ʒ. vi.
cum saccha. fingatur bolus. Aut dissoluantur in iure cice-
rum rub. sumanturq; circiter diluculum. Prandeat au-
tem egrotus neque maturius neque serius, quod huius
medicamenti operatio in diem sequentem plerunq; dif-

M 3 fera

DE MORB. INTER. CVR.

feratur. Quod si hieræ amaritudo displicuerit, sumat pilularum alephang. aut de hiera simpl. drach. i. cum stillatitio liquore absinth. fingantur pilul. v. quæ horis quatuor à cœna sumantur. E drachma quoque prædictarum pilul. fingantur vi. pilulæ, è quibus tres per horam ante cœnam semel, aut bis, singulis hebdomadibus sumantur. Cæterum si humores è cerebro in uentriculum defluant, sumantur ab ingrediente lectum ægroto post cœnam. Ventriculo deinde robur addatur tam medicamentis sumptis, quàm admotis. Sumptis quidem, hunc in modum. Recipe serapij de absinth. libr. ß. hauriat quantum duo argentea cochlearia capere possunt horis duabus ante pastum manè, & uespèri. Poterit, qui uolet, misceri cum stillatitio liquore chamæmeli, qui plurimum cōducit ad appetentiam irritandam. Loco autè serapij prædicti, utendum nonnunquàm elect. sequenti. Recipe corticis citri, saccharo conditi. ʒ. ij. compositionis mollis aromatici ros. maioris. unc. iij. compositionis de cinnamomo. ʒ. i. ß. pul. rosatæ nouellæ à Nicolao traditæ, corallij rub. ana drach. ij. Misceantur, & excipiantur serapio conseruationis corticis citri, fiatq; elect. molle, de quo sumatur castaneæ instar, duabus horis ante pastum manè, & uespèri. Quo deglutito bibatur parum uini meri. Poterit aromaticum rosa. maius in tessellarum figuram formatum sumi alternis cum electa. molli prædicto. Naturam enim uarijs. eadem tamen facultate præditis, uti iuuat. Extrinsecus autem uentriculo hæc admoueātur. Recipe absinth. M. i. menthæ, si symbrij origani, calaminthæ, an. M. semissim, seminum cumini, anisi, fœniculi, ana. ʒ. ij. caryophyllorum, nucis moschatæ, cinnamomi, ana. sesqui-drach.

drachmam. Decoquantur in uino mero, in quo calēte spō-
gia, aut lana succida madefacta, & expressa foueatur uē-
trculus manē, & uesperī ante pastum. Ungatur deinde
unguento sequenti. Recipe olei nardini, olei mastich.
ana. sesquiunciam, olei absinth. unc. ij. olei ex cotoneis. 3.
i. uini decoctionis absinthij expressi unc. iiij. Decoquan-
tur simul usque ad uini absorptionem. His adijce men-
tiæ sicca, caryophyllorū, cardamomi, iunci odorati, agal-
lichi, ana. sesquidrachmam. adiecta cera. q. s. fiat unguen-
tum, quo uentriculi regio ungatur post fotum manē, &
uesperi. Aut unguenti loco utatur emplastro sequenti.

Recipe emplastri de mastic. emplastri pro stomacho,
ana. sesquiunciam, corallij rub. sesquidrachmam, absint.
sicci 3. i. galangæ 3. ij. Subigantur cum oleo nard. & singa-
tur emplastrum in scuti, ut uulgus Medicorum loquitur,
figuram: quod uentriculo post fotus applicetur. Aufera-
tur autem cum cibum egrotus sumere uolet, hoc est, prae-
dij, & cœnæ tempore, ne sua stipticitate cibum in uentri-
culi fundum descendere prohibeat. Idq; obseruandū in om-
nibus emplastris, quæ uentriculo roborandi gratia admo-
uentur. Ceratum Gal. emendans stomachi uitia, illius em-
plastri uicem deplere poterit. Præterea pastus initio, pa-
ne aso, ænosaccharo macerato utatur egrotus: in pastus
uero sine puluere sequenti. Recipe coriandri præpa. 3.
iiij. pul. diacydonites cum speciebus 3. iiij. anisi, cinnamomi
selecti ana. 3. ss. pellicularum uentriculorum, gallinarum
preparatarum 3. ij. ss. maceros 3. i. saccha. ad pondus om-
nium, fiat puluis, quo in fine pastus utendum.

VOMITVS SANGVINIS CVRA-

tio.

Cap.

XIIII.

M 4

Euomi-

DE MORB. INTER. CVR.

signa.

EVomitur nonnunquam sanguis, uentriculi uenis à co-
pia sanguinis cum impeturuentis apertis, (idq; ma-
ximè si uenarū ora imbecilla fuerint) à uicioso, aciq; san-
guinerosis. Qui ex uentriculi uenis sanguis uomitur, con-
cretus nō est, nec inde magna sanguinis eruptio pōt con-
tingere, quòd graciles uētriculi uenæ sint. Aliquando qui
uomitur sanguis à remotis corporis partibus in uentri-
culò defertur: ut si cui mēbrū quodpiā excisum fuerit, na-
tura nō minus sanguinis quā anteā generante, sanguis
quo mēbrum illud ali debuit ad uentriculū defertur. A io-
to quoq; interdū corpore in uentriculum transmittitur.
Interdū à iecore, aut liene: uerū tūc adest in dextro, aut
sinistro latere tumor. Contingit nonnunquā hic sangui-
neus uomitus ex suppressione mensiū, hæmorrhoidū, aut
hæmorrhagiæ è naribus fluere solitæ. Ex aliis partibus
qui defertur ad uentriculū sanguis, cum euomitur, cōcre-
tus est. Si sanguinis uomitus ob mēbrum aliquod excisum
fuerit, aut ab uniuerso corpore in uētriculū deferatur, in-
cidatur dextri cubiti uena media. Si ab hepate, interior
dextri cubiti incidenda. Si à liene, eadem incidatur uena,
sed in sinistro cubito. Si à mensium suppressione, sophena
pedis dextri: si uerò ab hæmorrhoidum consueto fluxu
retento, ischiadica uena, in parte sinistri pedis minimo di-
gito uicina, incidatur. Si ab hæmorrhagiæ è naribus soli-
to fluore suppresso, ex exteriori cubitu uena sanguis mit-
tatur eiusdem lateris cum nare, unde sanguis, fluere sole-
bat. In hoc pathemate, quacunque à causa ortum sit (quo-
niā uires eo laborātis imbecillæ plerunq; esse solent) mo-
dica uenæ, dū inciditur, diductio fiat, ne maior, quā par
sit, spirituum resolutio fiat. Parcè prætereā detrahatur
sanguis,

curatio.

sanguis, idq; repetitis uicibus. Ante uenæ sectionem alio sequens enema infundatur, si sua sponte (ut conuenit) excrementa non deiecerit. Recipe cas. recens extractæ, sacchari rubri, ana unc. i. olei uiolacei uncias iij. salis parum cum decocto, quatuor remollitiuorum, prunorum, & hordei fiat enema, quod ante pastum iniiciatur: quo electo, fiat sanguinis missio, ut dictum est. Adhibeantur deinde tam intrinsecus, quam extrinsecus astringentia. Recipe lapidis hæmatit. drachmas duas, corallij rubri drach. i. ß. acaciæ, equiseti, an. ℥. iij. baccarū myrthi ʒ. i. ß. fiat puluis ex his comistis, & contritis, de quo sumatur. ʒ. i. cū stillatio liquore plantaginis & modico aceti uentriculo uacuo mane, & uesperis adiecta serapij ros. de rosis siccis. ʒ. i.

Aut sic.

Recipe conseruæ rosarum antiquæ, conseruæ symphyti magni, ana. ʒ. i. ß. boli Armeniæ lotæ in stillatio liquore rosarum, lapid. hæmatit. ana. drach. ii. acaciæ corallij rubr. ana. drach. i. ß. excipiantur serapio ex cotoneis, fiatq; electar. molle, de quo sumatur castaneæ instar, tribus horis ante pastum. Sumatur aliquando serapij omphacini, aut serapij ex cotoneis, aut serapij ex oxyacantha, aut serap. e succo cerasiorum syluestrium acidorum quantum duo cochlearia capiunt. Extrinsecus autem hæc fiant. Crura ualide fricentur, eisq; uincula dolorifica iniiciantur, ipsis quoque cucurbitulæ sine scarificatu affigantur. Si ab hepate sanguis in uentriculū deferatur, supra hepar cucurbitula affigatur: si à liene, supra lienē: si uerò à matrice, supra matricē affigatur. Sumpto cibo, si ægrotus ipsum retinere nequeat, cucurbitula uentriculi regioni affigatur. Fotu deinde sequēti utendū.

M 5 Recipe

DE MORB. INTER. CVR.

Recipe balaustiorum, psidia, gallarum, rhois obsonio-
rum, baccarum myrti, rosarum rub. an. q. s. Decoquantur
in aceto, aut stillatitio liquore plantag. hoc in decocto ca-
lente sponsia madesiat, qua expressa uentriculi regio fo-
ueatur: sequenti deinde unguento ungatur.

Recipe olei ex cotoneis unc. iij. succi plantag. aut
stillatitij liquoris eiusdem unc. iij. Decoquantur usque
ad consumptionem succi, aut liquoris stillatitij, adie-
ctisq; acaciae, hypocistid. boli Armeniae, coral. rubr.
baccarum myrthi, ana drachm. i. s. aceto pauco, & ce-
ra q. s. fiat unguentum, quo uentriculi regio post fotum
ungatur calide.

Aut sic.

Recipe olei myrthi, olei ex cotoneis, olei mastic. an.
3. i. s. equiseti drachm. i. boli Armeniae, hypocistidos, aca-
ciae, ana drachm. ij. aceti parum. Cum modico cere fiat
unguentum, quo uentriculi regio mane, & uesperis post
fotum ungatur.

APPETENTIAE CANINAE CVR.

ratio. Cap. XV.

causa.

Multiplex huius affectus causa esse potest, aut .n.
fit à nimia corporis dissolutione: aut à sola uentri-
culi intemperatura frigidiora, aut ab humoribus acidis,
quos uentriculi os exorbuit: aut à lumbricis, interdum à
nimio aut alui, aut mensium fluore. Quod ubi contigerit,
aluus astringatur, menses sistantur. Nimia autem
corporis dissolutio fit, aut à nimio calore, aut à sudore su-
perfluo. Qui hoc malo, has ob causas infestantur,
aere utantur frigido, non autem fricatione, neque exer-
citio: uictus sit glutinosus, & incrassans. Porro quoniam
niam

Vicius
ratio.

nam is calor à bile multa sanguini permista, oritur, sic
curetur. Recipe serapij ex cotoneis (ad astringendum)
serapij omphacini, serapij rosacei de rosis siccis, ana
unc. i. ß. stillatitorum liquorum oxalidis, plantaginis, in
tybi satiui latioris, ana. unc. iij. Misceantur, & à ieiunio
diluculo bibantur per triduum. Repetantur alijs tri-
bus uicibus. Recipe electar. trium santalorum unc. i.
utatur cum serapijs. Dein potione sequenti purgante
utendum. Et quoniam in hoc affectu euacuantia astringere
debent, fiat igitur hunc in modum. Recipe cortic
cum myrobalanorum flauarum confricatarum oleo de
mygd. dulc. drach. vi. corticum myrobalano. empeliticarum
similiter confricatarum unc. ß. macerentur in stilla-
titio liquore plantagi. in quo uux passæ decoctæ fuerint,
boris xij. adiectis rhabar. selecti puluerati scrup. iij. spicæ
nardi gran. v. stillatitorum liquorum intybi satiui latio-
ris, oxalidis, & plantag. q. s. fiat potio, quæ sumatur ho-
ra quarta matutina. Recipe elect. solidi trium santa-
lorum unc. i. ß. sumat tessellam unam quotidie manè, quæ
deglutita, bibat parum stillatitij liquoris plantaginis.

Recipe cerati santalini libr. ß. inungatur tota spina
dorsi tepidè manè, & uesperis. Præterea linteamina, &
subucule egrotantis inspergantur puluere baccarū myr-
thi, & rosarum rubrarum. Calida fugiat, frigida amet.
Bulimos uerò si à uentriculi intemperatura frigidio-
re, aut ab acidis humoribus, pituitosis, aut melancho-
licis, ori uentriculi infartis (hæc autem est uera Appe-
tētia Canina) ab utrauis harū causarum fuerit, uini mul-
tum calefacientis potione sanatur. Cum ad prandium hoc
pathemate laborantes accedunt, primum illis edulia pin-
guia

DE MORB. INTER. CVR.

guia apponantur, & quaecunque, ex multo oleo, aut buty-
ro, aut adipe gallinae, & similibus parantur. Huiusmodi
nanque os uentriculi asperum complanant. Vinum dein-
de aut flauum, aut rubrum, dulce, potenterq; calefaciens,
et si nō sitiunt, bibant, quo uentriculi os calefiat. Sic enim
appetentia illa Canina sedatur statim, tantiq; uictu si lō-
go tempore utantur, omnino cessabit. Nihil autem illis
aut austerum, aut acerbum offeratur. Humor autem ille
acidus siquidem pituitosus fuerit, qui uentriculi tunicis
infartus est, hunc in modum euacuetur. Recipe pil. de
biera simp. agarici in pastillorum formam redacti, ana.
drach. i. β. cum melle ros. fingantur pil. v. ē drachma, quae
sumantur horis quatuor, aut quinque à coena. De eo autē
quod reliquum erit, fingantur ē drachma pilul. vi. ē qui-
bus sumantur tres per horam ante coenam semel in heb-
domada. Humor autem ille acidus, pituitosus, si multus sit
leuiq; medicamento dicto non cedat, hunc in modum ua-
cuetur. Recipe diaphoenici unc. β. cum saccharo fiat bo-
lus, qui antelucano tempore sumatur.

Aut sic.

Recipe diaphoenici unc. β. cum decocto uuarum passa-
rum, trium florum communium, carycarum pinguium,
fiat potio, quae sumatur ut dictum est. Recipe theriacae
ueter. scro. ij. conseruae buglossi drac. ij. Misceantur, & po-
stridie mane sex horis ante pastum sumantur. Utendum
praeterea electarijs, fotibus, unctionibus & emplastris
traditis in Dolore uentriculi, exceptis absinthio, & men-
tha quoniam appetentiam augent. Si uerò is humor aci-
dus, qui appetentiā caninam excitat, melancholicus fue-
rit, à liene ad os uentriculi largius transmissus, qui os
uentriculi

uentriculi immodicè contrahat, & exugat, hunc in modum: primum concoquatur, deinde euacuetur, uictus ratione superius tradita. obseruata. Recip. serapij de buglos. unc. ij. serapij fumarie, serapij scolopendr. ana. un. i. ß. stillatiorum liquorum lupi salictarij, tamaricis, buglosi, ana. unc. iij. Misceantur & à ieiuno per triduum diluculo sumantur. Repetatur alijs tribus uicibus, aut donec materia uideatur concocta. Recipe diamosc. dul. unc. ß. utatur cum serapijs. Recipe catho. drac. vi. compositionis hamech. drach. iij. serapii de bugloss. unc. ß. cum communi medicinarum decocto, adijciendo folliculorum scennæ orientalis, polipod. quer. ana. unc. ß. fiat potio, quæ hora quarta matutina sumatur. Recipe diamoschi dulc. tessellam unam, postridie manè sumatur.

Aut sic.

Reci. pil. de fumaria, pi. indarū, an. ʒ. ß. cum stillatitio liquore buglosi fingatur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumatur. Postridie quoq; sumatur tessella una elect. solidi diamoschi dulcis manè. Utendū prætereà p aliquot hebdomadis pil. sequētibus. Reci. pil. de hiera simpl. agar. in pastillorū formam redacti, folliculorū senæ orientalis. an. ʒ. i. excipiantur serap. de scolopen. fingaturq; pil. vi. ē drachma, ē quibus sumantur tres per horam ante cœnam semel in hebdomada. Si uerò lien, à quo hic humor transmittitur: affectu aliquo laborare uideatur, curetur præstis suo loco, posterius dicendis. Appetentia hæc immoderata à lumbricis uix dum deuorata depascentibus interdum excitatur. Necandi igitur, deinde expellendi.

Eos igitur primum sic neci dabimus. Recipe seminis citri, seminis contra uermes, seminis brassicarum, ana. ʒ. i. ß.

DE MORB. INTER. CVR.

*℥.i.β. cornu cerui usti. ℥.ij. santonici ℥.i. rhabarbari ℥.β. pul. diamargar. frig. aut corallij rubr. ℥.i. sacchari ad dimidium ponderis omnium, fiat puluis, de quo ℥.i. sumatur mane ante pastum, excepta stillatio liquore graminis, aut portulacæ. Aegrotus autem si pauper fuerit, pro rhabar. agaricum substituere licebit. Absinthium, quanquam lumbricis aduersatur, in Appetētia Canina ob lubricos, uitandum est, quoniam appetentiam, ut diximus, auget. Unguento simul sequenti utendum, ut & intrinsecus & extrinsecus expugnentur. Recipe olei absinthij, ol. rutæ. olei amygdal. amararum, ana unc. i.β. olei rosa. (si febris adsit) unc. i. aloes, farina lupinorum, santonici, an. ℥.i.β. seminis contra uermes ℥.iiij. aceti ℥.β. adiecta cera fiat unguentum, quo & uentriculus, & uentris regio superior, ut in inferiorem fugiant, ungatur calide ante pastum, mane, & uesper. Hoc quoque cataplasma eandem ad rem summe conducit. Recipe farina lupinorū, aloes, ana. ℥.β. santonici ℥.ij. seminis contra uermes ℥.iiij. cum succo uermicularis (si febris adsit) & pauco aceto fiat cataplasma uentri. Enecati autem expellantur, ne putridis uaporibus febres, aut Epilepsiam, aut alia symptomata grauiam inducant. Expellentur autem aloe, aut agarico, aut rhabarb. liquore aliquo amaro solutis, aut in catapotia formatis. Miram autem in enecandis, & educendis lumbricis catapotia pestilentialia, Rufi appellata, efficaciam obtinent. Enemata quoque plurimum conferunt, quale hoc, quod sequitur. Recipe sacchari rub. sesquiunciam, mellis rosacei cola. unc. i. cum hordei decocto, aut iure pulli fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Debet enema dulce esse ad uermes euacandos, si adhuc uiui sint.
Ne fiat*

Ne fiat autem è lacte, quoniam in intestinis coagulatur, grauiaq; nonnunquam inducit symptomata.

HYDROPI CVRATIO.

Cap. XVI.

FIt hoc mali ob insignem hepatis refrigerationem, ipso aut primario affecta, aut per consensum. Ob Causæ. huius enim uisceris refrigerationem, cibus qui reliquis corporis partibus distribui debet, in sanguinem mutari non potest. Quinetiam cum ipso uniuersi corporis uenæ refrigerantur. Coafficitur autem hepar lien, renibus, ieiuno, ac tenui intestino, mesenterio, septo transuerso, pulmone. Contingit etiam hæc passio, ubi plurimus per hæmorrhoidis sanguis excernitur, aut ob immodicū muliebri profluium, aut cum retinentur menstrua, aut ob aliam ingentem uteri dispositionem, aut ex intempestiua aquæ frigide potatione, iecur affatim refrigerat. Atq; his omnibus de causis, aqua inter cutem hominē uexari contingit, nullo in hepate præter naturam tumore existente, sed sola in principio refrigeratione iecur afficitur, post uerò aliquando et durum fit. Coeliacā præterea affectionem, & dysenteriam, icterum, & cachexiam Hydrops nonnunquam consequitur. A podagra quoque, & coxendicum dolore uexati complures, aquam intercutē incurrerunt. Hoc morbo correpti spirandi difficultate ferè laborant, tument, graues sunt, uitiatoq; colore, ex uiriditate nimirum albicantes. Signa. Cibum fastigiunt, ceterum largioris potus appetentes sunt, ij præsertim, qui ascite à causa calida laborant: atque etiam quòd is humor, qui in ipsis abundat, salsus est, & putrefactus, quare & ple-

DE MORB. INTER. CVR.

Vidus
ratio.

plerunque febriunt. Tres autem sunt Hydropis species,
Ascites, Tympanites, Anasarca. Omnium periculosissi-
mus Tympanites, secundum locum obtinet Ascites, Ana-
sarca uero ceteris est curatu facilior. Victus ratio calida
sic & sicca. Viuat igitur egrotus in aere calido, & sicc-
co aut natura, aut industria luculentis ignibus, & suffi-
tibus parato. Cibus sit concoctu facilis, ut perdices, tur-
di, pulli gallinacei asi, oua forbilia. Condiuntur cibi pi-
pere, caryophyllis, & similibus aromatis. Panis sit cliba-
nites, cui foeniculum, anisum, & cuminum misceantur.
Vinum bibatur album, & tenue, sed paucum. Sit autem
uiuosum, nisi hoc mali à causa calida sit ortum. Nam hu-
ius morbi, duæ potissimum species. Ascites, & Tympani-
tes, ab intemperie interdum oriuntur calida, spiritum na-
turalem resolvente, & absumente, quo deficiente, aqua
pro sanguine generatur: tunc itaque minus calidis & cie-
bis, & medicamentis, quam dum à frigidis causis est abo-
lita significatio, pugnandum est. Exercitatio quiete salu-
brior, & uigilia somno. Quod ad curandi rationem at-
tinet, initio statim humor redundans uacuandus, & pur-
gatoriis & urinam cientibus medicamentis. Quæ autem
ad singulas particulatim pertineant post dicentur, cum
quibus præsidii curandæ sint, persequemur. Ascites
si quem corripuerit, ei uenter, totumq; abdomen intume-
scit, quo concusso, talis auditur sonus, qualem uter semi-
plenus efficit. Aliæ uero corporis partes, præcipue su-
periores, in ascite haudquaquam inflantur. Venter au-
tem ideo intumescit, quod id spaciū quod inter peritoneū,
& partes ei subiacentes est, aquoso humore impletur.
Curandi autem ratio à purgantium medicamentorum
usu

usu auspicianda. Si igitur Ascites à causa calida: ut dictum est, ortum habeat, materia hunc in modum concoquatur, & uacuetur. Recipe serapij acetati compos. serapij eupatorij. serapij intybi satiui latioris compositi, ana. unc. ij. stillatitiorum liquorum: halicacabi, absinthij, cichorij, ana. ℥. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo sumantur. Recipe diarrhod. abb. ℥. β. sumatur tessella una cum serapijs.

Aut fiat Apozema sequens.

Recipe. v. rad. com. maceratarum in aceto, ana. ℥. β. eupatorij, v. herbarum capil. ana. M. i. intybi satiui latioris non loti, cichorij, ana M. β. absinthij tertiam partem M. i. asari, aristolochiæ rotundæ, cas. lignæ, ana drachm. ij. quatuor seminum frig. maiorum, ana drach. i. β. seminum anisi. apij, fœniculi, ana. ℥. i. florum sambuci, & genistæ. ana. P. i. medullæ cnici, agarici in pastillorum formam reducti, ana. ℥. β. Decoquantur in .s. q. aquæ, tantisper dum pars dimidia absumatur: accipiatur iuris decocti lib. i. β. adiectisq; succi apij, succi intybi satiui latioris. ℥. ij. sacch. q. s. fiat serapium mediocris consistentiæ: depuretur, deinde addantur rhabar. selecti. ℥. iij. spicæ nardi. ℥. i. Iucundioris autem & odoris, & saporis gratia adijciatur cinamomi selecti. santali citrini, ana. ℥. i. Hoc utatur apoze mate egrotus dies quinque, appetente diluculo. Recipe rhabar. selecti. ℥. i. β. agarici in pastillorum formam reducti. ℥. i. spicæ nardi gr. vi. Macerentur in stillatio liquoze intybi satiui latioris, & pauco uini albi horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adiectisq; cathol. ℥. β. diacnici. ℥. iij. serapij adianti. ℥. β. cum communi medicinarum decocto, cui seminum anisi, apij, & fœniculi, ana.

N

℥. i.

DE MORB. INTER. CVR.

3.i. quatuor seminum frig. maiorum, ana 3.ß. sint addita,
fiat potio, quæ hora quarta matutina sumatur. Utatur
deinde sequentibus, hepar roborantibus, obstructionsq;
aperientibus. Recipe pul. elect. trium santalo. pul. dia-
curcumæ maioris, pul. diarrhodi abb. ana. drach. i.ß. sac-
chari dissoluti in stillatitio liquore halicacabi. q. s. singa-
tur elect. solidum in rhomborum figuram, sintq; singuli
rhombi ponderis 3.ij.ß. sumatur unus manè horis tribus
ante pastum. Vbi dies aliquot quicuerit ægrotus, repe-
tatur apozema, cū pharmaco solutiuo. Interea uerò hæc
uentri ad exiccandum admoucantur. Recipe æris usti,
farinæ orobi, put. rad. iridis, ana 3.i. cum succo cucumeris
agrestis fiat linimentum, quo uenter manè, & uespero an-
te pastum calidè linatur, uitata hepatis regione. Fiat quo-
que sequens epithema hepati. Recipe cerati santalini
libr.ß. spicæ nardi 3.ß. Misceantur, & bis in hebdomada
tepidè applicentur hepati manè ante pastum. Cū au-
tem huius pathematis declinatio manifesta apparebit,
utatur ægrotus pil. sequentibus semel, aut bis in hebdoma-
da. Recipe pil. de hiera simpl. aloë lota in stillatitio li-
quore intybi satiui latioris, agar. in pastillorum formam
reducti, ana drach. i.ß. rhabar. selecti 3.i. Excipiantur se-
rapio intybi satiui latioris, singanturq; è drachma pil.
vi. de quibus tres sumet circa noctis dimidium. Ascites
uerò quæ est à causa frigida, minorè inducit sitim, quàm
ea quæ est à causa calida, & in hac à causa frigida cali-
diore uictus ratione, calidioribusq; medicamentis uten-
dum. Primum concoquantur humores, deinde uacuentur.

Recipe serapii de radicibus, serapij de eupatorio, sera-
pii adianti, ana 3.ij. stillatitiorum liquorum absinthii,
apii,

apii, florum sambuchi, ana ʒ.iiij. Misceantur, fiat q; Zula-
pium depuratum, quod adiectis cinnamo. selecti drach.ij.
suauiore, & odore, & sapore reddatur. Eo utetur ægro-
tus dies quatuor, appetente diluculo.

Aut ut atur apozemate sequenti.

Recipe quinque rad.com. maceratarum in uino albo,
an. ʒ.i.β. filipendule, pentaphylli, eupatorij v. herbarum
capil. pimpinellæ, pilosellæ, ana M.i. absinth. M.β. asari,
cas. lignæ, ana ʒ.ii. pul. cicadarum ʒ.ij.β. seminum apij,
anisi, fœniculi, ana ʒ.i.β. cicerum rubr. M.β. florum sam-
buchi, & genistæ, ana P.i. polypod. quer. medullæ cnici,
ana ʒ.vi. Decoquantur in s.q. aquæ, donec dimidium absu-
matur: accipiatur iuris decocti lib.i.β. adiectisq; serapij
de eupator. serapij de rad. ana ʒ.ii. & saccharo q.s. fiat se-
rapium mediocris consistentiæ, depuretur, additisq; cin-
namomi selecti ʒ.ij. spicæ nardi ʒ.ij. suauiore reddatur,
& odore, & sapore. Eo utatur egrotus dies quatuor ap-
petente diluculo. Deinde hunc in modum uacuetur. Reci-
pe cathol. ʒ.β. diacnici ʒ.iii. serapii adianti. ʒ.β. Cum com-
muni medicinarum decocto, adiectis florum sambuchi. P.
i. seminis absinthij tertia parte M.i. fiat potio, quæ sum-
atur hora quarta matutina.

Aut sic.

Recipe pil. de agar. ʒ.ij.β. pil. de thymelæa ʒ.β. cum
stillatio liquore absinth. fingantur pil. v. quæ circa no-
ctis dimidium sumantur. Recipe theriacæ ueter. com-
positionis diacurcumæ maioris, ana drachm.β. conscrue
adianti. drach. i.β. Misceantur, & postridie manè suman-
tur. Præterea de compositione diacurcumæ maioris sumā-
tur quotidie manè ʒ.ij. Aut sequenti electario utatur.

N 2 Recipe

DE MORB. INTER. CVR.

Recipe pulueris dialacæ, pulueris diacurcumæ maioris, ana. ʒ. ij. sacchari dissoluti in stillatitio liquore absint. q. s. fingatur elect. solidum in tessellarum figuram, sintq; singulæ ponderis. ʒ. iij. sumatur una quotidie manè. Sequens emplastrum uentri admoueaturn calidè. Recipe emplastri de granis lauri libr. i. Misceatur cum stercore caprarum aut uaccarum, & fingatur emplastrum. Cera tum autem santalinum hoc in affectu à causa frigida hepatis admouendum non est. Tumentia uerò crura lixiui, in quo ebuli folia decocta fuerint, lauentur. Tympanites uerò si quem corripuerit, intumescit uenter, distenditurq; qui concussus tympani sonum reddit: reliquæ uerò corporis partes macilentiores fiunt.

Victus
ratio.

Victus ratio ea sit, quam prædiximus. Flatulenta autem omnia summa cura uitentur. Exercitia, fames, sitis quoque uehemens, si ferantur, laboranti mirificè auxiliantur. Hoc malum à causis calidis ferè suboritur. Curandi ratio à concoctione humorum, & uacuatione inchoanda. Recipe serapij de radic. serapij intybi satiui latioris compositi, serapij de eupator. serapij acetati compositi, ana. unc. i. ʒ. stillatitiorum liquorum apij, intybi satiui latioris, cichorij, ana. unc. iij. Misceantur, fiatq; zupium mediocris consistentiæ, quod depuretur, & adiectis cinnamomi selecti, & pul. diarrhodi abb. ana. drach. i. ʒ. ori iucundius reddatur. Eo utetur ægrotus diebus quatuor manè.

Aut utatur Apozemate sequenti.

Recipe quinque radic. com. maceratarum in aceto, ana. unc. ʒ. origani, calaminthæ, folio, absint. ana. tertiam partem. M. i. intybi satiui latioris non loti, quinque herbarum

rum card. ana. M. i. filipendulae M. β. asari, cas. lignea, spicae nardi, an. 3. i. β. seminum anisi, apij, foeniculi, ana. 3. ij. quatuor seminum frig. maiorum, ana. 3. i. β. florum sambuci. P. i. β. Decoquantur in. s. q. aquae, usque ad dimidij consumptionem accipiatur iuris decocti lib. i. β. cui sacchari adiectione. q. s. dulcedo inducatur: depuretur, & additis cinnamomi selecti, & pul. diarrhodi abb. an. 3. i. β. & odore, & sapore iucundiore reddatur. Eo utatur dies quatuor aut quinque appetente diluculo. Deinde uacuetur. Vehementes autem non debent esse uacuationes. Recipe pilul. de hiera simpl. rhabarb. selecti, pilul. de agar. ana. 3. i. stillatitio liquore intybi satiui latioris excipiantur, singanturq; pilul. v. quae circa noctis dimidium sumantur.

Aut sic.

Recipe rhabar. selecti scrup. iij. spicae nardi 3. i. β. agar. in pastillorum formam redacti 3. ij. Macerentur in stillatitijs liquoribus absinth. intybi satiui latioris, & pauco uini albi horis duodecim, deinde exprimantur, & colentur: adiectisq; diacnici. 3. i. β. serapij adianti unc. β. stillatitiorum liquoribus absinth. & intybi satiui latioris q. s. fiat potio, quae antelucano tempore sumatur. Sequentis quoque electar. usus illi plurimum conducet. Recipe pul. diacurcumae 3. ij. pul. diarrhodi abb. pul. electar. trium santal. ana. 3. i. β. sacchari dissoluti in stillatitijs liquoribus apij, & intybi satiui latioris q. s. fingatur electar. solidum in rhomborum figuram, sintq; singuli ponderis. 3. iij. Sumatur unus quotidie mane.

Aut sic.

Recipe compositionis mollis diacurcumae maioris, lib. β. pul. elect. trium santalo. pul. diarrhodi abb. ana. 3. ij.

N 3 Excipiantur

DE MORB. INTER. CVR.

Excipiantur serapio intybi satiui latioris cōpositi, fiatq; electarium molle, de quo ℥.ij. quotidie manē sumantur, loco electar. solidi prædicti. Illa autem uentri admoueātur.

Recipe milii partes tres, salis commun. partem unam, seminum anisi, & fœniculi, ana partem dimidiam. miliū, & sal torreatur, deinde cum cæteris mista pannis lineis raris insuantur, singanturq; sacculi duo, qui uentri alter post alterum ante pastum calidē admoueantur.

Aut utatur emplastro sequenti.

Recipe emplastri de baccis lauri libr. i. Misceatur cū stercore caprarum, aut uaccarum, singaturq; emplastrū, quod uentri applicetur, hepatis regione declinata, quæ ante pastum linimento sequenti linatur. Recipe cerati santalini ℥.v. spicæ nardi ℥.i. Misceantur, & bis in hebdomada his commistis hepatis regio calidē linatur.

Anasarca autem Hydropis quoque species, uniuersam carnem, atque ad eò totius corporis molem spongiæ instar laxam, & madidam efficit, toto corpore, colore quidem mortuo simili, intumescente. Hæc autem Hydropis species cæteris quidem facilius curatur, quoniam uim naturæ arguit, quæ in omnes corporis partes humorem illum trudere potest. Est enim adhuc sanguini mistus, humorisq; naturam retinet. Cæteræ autem species difficilius curantur, quòd & aqua, & flatus in unum coacta sint: uirtus autem unita seipsa dispersa fortior est.

Victus
ratio.] Victus ratio ea sit, quam superius diximus. Exercitatio autem, quæ sudorem excitet admodum utilis: sudor uero linteo asperiore extergendus. Conferunt quoque plurimum fricationes ter, aut quater quotidie repetitæ: meatus enim aperiunt, extenuant, discutiunt, desiccant. Vigiliæ,

Id est, affectus animi, & quaecunque desiccant, conducunt. Huius mali origo si à mensium, aut hæmorrhoidum sup-
pressionem fuerit, propter quam sanguis ad hepar regurgi-
tat, ipsumq; & calidum innatum suffocat, à sanguinis de-
tractione, si uirtus, etas quoque permiserint, curandi ra-
tio auspicanda: ob alias autem causas, in nulla hydropis
specie uena incidenda est. Ob dictas igitur causas, pri-
mum incidatur iecoraria uena dextri brachij: deinde ad
menses euocandos, aut hæmorrhoidas, sophena. Medica-
menta præterea quæ Hyposarcae, siue Anasarcae conue-
niunt, mensibus quoque euocandis conferunt. Hæmorrhoi-
des uerò ut aperiantur & fluant, panno aspero fricandæ
sunt, aut folio ficulno, aut cepa. Humores deinde conco-
quantur, & uacuentur. Recipe serapij de absinth. ʒ. iij.
serapij de rad. sine aceto ʒ. i. ʒ. stillatitiorum liquorū ab-
sintii, apii, mellissophylli (propter matricem) ana ʒ. iii.
Misceantur, fiatq; zulapium, quod depuretur, & adie-
ctis cinnamomi selecti ʒ. ij. & ʒ. ii. spicæ nardi (quæ con-
stringendi & aperiendi facultate est prædita) ori gra-
tius reddatur. Eo utatur egrotus diebus tribus. Poterit et
altero triduo repeti, ad pleniorē materiæ concoctionē.

Aut sequenti apozemate utatur.

Recipe quinque rad. com. maceratarum in uino albo,
ana ʒ. ʒ. chamædrys, chamæpityos, cassuthæ, eupatorii,
ana M. i. quinque herbarum capil. filipendulæ, ana M. ʒ.
absinth. tertiam partem M. i. seminum anisi, apij, fœnicu-
li, ana ʒ. ii. florum sambuchi P. ii. polypod. quer. medullæ
cnici, ana ʒ. ʒ. Decoquantur in s. q. aquæ, donec pars dimi-
dia absumatur: accipiatur iuris decocti lib. i. ʒ. adiecto sac-
charo dulcedo inducatur, fiatq; serapium mediocriter

N 4 coctum

DE MORB. INTER. CVR.

coctum depuretur, additisq; cinnamo. selecti. ʒ. i. ʒ. spice
nard. & iunci odor. ana. ʒ. ʒ. iucūdiore & sapore, & odo
re reddatur. Eo dies quinque agrotus utetur, appetente
diluculo. Poterunt autem dicto apozemati. ʒ. iiij. oxyme-
litos scillini addi, si materia crassior fuerit. Recipe pi-
lul. de agar. ʒ. ij. pil. foetid. ʒ. ʒ. Excipiantur stillatio li-
quore absinth. finganturq; pil. vij. quæ circa noctis dimi-
dium sumantur.

Aut sic.

Recip. cathol. ʒ. ʒ. diacnici (aquas enim illas euacuat)
ʒ. iiij. serapij de rad. sine aceto. ʒ. ʒ. cum communi medici-
narum decocto, adiectis polyp. quer. ʒ. ʒ. agar. recens in
pastillorum formam reducti. ʒ. ij. florū sambuchi. P. i. fiat
potio, quæ sumatur ad diluculum. Recipe theriacæ ue-
te. ʒ. i. sumatur postridie manè sex horis ante pastū. Quie-
scat agrotus dies sex, aut septem, rursus deinde humores
& concoquantur & uacuentur repetitis serapijs, aut
apozemate, solutiuisq; pharmacis prædictis, fiatq; simili-
ter ad perfectam usque curationem. Medio autem tempo-
re utatur electario sequenti. Recipe compositionis dia-
lacæ, compositionis diacurcucumæ maioris, an. ʒ. iiij. Mi-
sceantur, sumanturq; ʒ. ij. quotidie manè. Agrotus autem
post geminam euacuationem in laconico, siue hypocau-
sto sudet, aut in balneo naturali, aluminoso, & sulphu-
reo. Si cum reliquo corpore uenter quoque sit tumidus,
admoueatur emplastrum in Tympanite traditum. In mu-
liere uerò menses euocentur balneo posteriùs dicendo, ubi
suppressionis mensium curatio tradetur. A nimio au-
tem mensium & hæmorrhoidum fluxu & hoc pathema
nonnunquam oritur. Nimio enim aut mensium, aut hæ-
morrhoi-

morrhoidum fluxu spiritus dissoluuntur, imbecillumq;
 redditur hepar: quare passio hæc, quæ inde nascitur, a
 causa esse frigida dicitur. In hoc autem malo, ab iis fluxi-
 bus orto, Medicum solertem esse expedit. Nam quæ sisten-
 dis Mensibus, aut Hæmorrhoidibus conueniunt, Hyposar-
 cæ obsunt, quæ uerò Hyposarcæ conferunt, sanguinis flu-
 xui officiunt, ipsum enim augent. Videndum igitur utro
 ex affectu plus periculi impendeat. Vtemur tamen ape-
 rientibus propter Hydropem, mediocriter uerò, aut pa-
 rum aperiendi ui præditis, ob sanguinis fluxum. Ma-
 teria igitur hunc in modum primum concoquatur, dein-
 de uacuetur. Recipe serapij de absinth. unc. iij. serapii
 de rad. sine aceto, unc. i. ß. stillatitiorum liquorū, absinth.
 (aperit enim & astringit) mellissophylli, betonica, ana
 ʒ. iij. Misceantur, fiatq; zulapium, quod depuretur, & ad-
 iectis cinnamomi selecti ʒ. i. spicæ nardi ʒ. ʒ. (aperit &
 astringit) ori iucundius reddatur. Eo utatur egrotus dies
 tres diluculo. Recipe pil. de agarico, pilul. de rhabar-
 baro. ana ʒ. ʒ. Excipiantur stillatitio liquore absint. sin-
 ganturq; pilul. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

Recipe theriacæ ueter. ʒ. ii. sumantur postridie ma-
 nè sex horis ante pastum. Nec satis est egrotantem semel
 purgari, materia enim multa est, repetitis igitur uicibus
 uacuetur, dierum tamen septem, aut octo spatium interposi-
 to, iisdem utens præsidis. Quod si proximè dictis pilul.
 non sufficienter uacuetur egrotus, sequentibus uitatur.

Recipe pilul. de agar. ʒ. ii. pilul. foetid. ʒ. i. Excipian-
 tur stillatitio liquore absinth. singanturq; pilul. v. quæ
 circa noctis dimidium sumantur.

Aut sic.

N S Recipe

DE MORB. INTER. CVR.

Recipe agarici in pastillorum formam redacti ℥.i. rhabar. selecti ℥.ii. spicæ nardi grā.iiii. Macerentur in stillatitio liquore absinth. horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adiectisq; diacnici ℥.ii. serapii de duabus radicibus ℥.β. cum communi medicinarum decocto, addita polypo. quer. dimidiata uncia fiat potio, quæ hora quarta matutina sumatur. Aut horum loco, è ℥.vi. hieræ picræ Galeni, & saccharo, fingatur bolus. qui manè ante pastum sumatur. Aut cum stillatitio liquore absinth. dissoluta sumantur. Quo autem tempore egrotus materiam neque concoquit, neque uacuabit, utatur electar. sequenti. Recipe cōpositionis dialaccæ ℥.i.β. cōpositionis diacurcumæ maioris ℥.i. compositionis diacalaminthæ unc.β. De his commistis sumatur quotidie matutinis horis ℥.ii. Cum autem morbi manifesta declinatio apparet, utendum sequentibus pilulis. Recipe pilul. de hiera simpl. agar. in pastillorum formam redacti, ana ℥.i.β. rhabar. selecti ℥.β. Excipiantur serapio de duabus radicibus, finganturq; è ℥.pil:vi. è quibus tres ab egroto sumantur mox ubi à somno primo experrectus fuerit, bis in hebdomada. Hemorrhoidum uerò fluxus si interea irritaretur, hunc in modum reprimatur. Recipe olei myrthei ℥.ii. olei ex cotoneis, olei mastich. ana. ℥.i. His commistis hæmorrhoides inungantur manè, & uesperī.

Aut sic.

Recipe balaustiorum, psidiæ, gallarum, rhois obsoniorum, baccarum myrti, an. ℥.i. hypoeistidos, oxyacanthæ, an. ℥.β. Decoquatur in uino rubro, & pauco aceti ad tertias, dein chalybs multis uicibus eo in decocto candens extinguatur, fumus autem per anum recipiatur.

DIONY-

102
DIONYSII FONTANA

NONI DOCTORIS MEDICI

Mompessulensis. De morborum
internorum curatione.

LIBER TERTIVS.

ICTERI CVRATIO.

Cap.

I.



VM per uniuersam corpus bilis aut
atra, aut flaua effunditur, Ictero homi-
nem laborare dicimus. Oritur autē hoc
uitium interdum ex sola iecoris intem-
perie calida, in eoq; tunc calor citra gra-
uitatem consistit. Nonnunquam uerò fit à fermenti ieco-
ris inflammatione, sanguinem in bilem mutante, qui per
uniuersum corpus defertur. Tunc autem excrementa bi-
liosafunt, adestq; febris, grauitasq; in dextro hypocon-
drio percipitur. Interdum uerò contingit ob folliculi fel-
continentis obstructionem, aut imbecillitatem, propter
quam biliosum humorem ad se non trahit, sicq; fit san-
guis impurus, qui per uniuersum corpus diffunditur. Vt
enim renum munus est sanguinis serum ad se attrahere: et
splenis, melancholicū humorem: ita & huic folliculo fel
ad se attrahere uis est, & facultas. Interdum uerò non ob
ipsius folliculi imbecillitatem hoc uitium accidit, sed
ob uasorum ab ipso exortorum, ora sua in hac hepar
extendentium infirmitatem, aut obstructionem, bilio-
sum

Causæ.

DE MORB. INTER. CVR.

sum humorem folliculus attrahere non potest. Contingit etiam nonnunquam hic morbus propter eius meatus, quibilem ad intestina defert, obstructionem, quæ ex excrementis cognoscitur: alba enim excernuntur. In ictero ab his obstructionibus curando, non solum uacuanda bilis, sed & pituita, quæ bili permista, ipsam incrassans obstructiones parit. Materia autem, quoniam multa est, ante concoctionem hunc in modum minuatur. Recipe pil. de hiera simpl. agarici in pastillorum formam redacti, rhabar. selecti, ana ℥.i. Excipiantur stillatitio liquore intybi sat. latioris, finganturq; pil. v. quæ sumantur, ubi à primo somno egrotus experrectus fuerit. Humores deinde hunc in modum concoquantur. Recipe serapii byzantini (biliosam & pituitosam materiam respicit) serap. de duabus radic. serap. intybi sat. latioris compositi, ana ℥.i. β. stillatitiorum liquo. absinth. cicho. apii, ana ℥.iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Non erit autem inutile & hæc altero triduo repetere, quod materia hæc crassa, longiore cōcoctione egeat.

Recipe diarrho. abb. ℥.ss. utatur cum serap. Aut utatur apoze. sequenti. Recipe v. rad. com. maceratarum in aceto, ana unc. β. filipend. pentaph. chamædryos, chamæpityos, ana. M. β. intybi satiui latioris non loti, cichorii cum radice, quinque herbarum capil. ana M. i. asari. cas. lignæ, ana ℥.ij. quatuor seminum frig. maiorum, ana ℥.i. β. cicerum rub. M. β. seminum anisi, apii, & fœniculi, ana ℥.ii. florum sambuchi, & genistæ, ana P. ij. Decoquantur in s. q. aquæ, usque ad dimidii absorptionem: accipiat iuris decocti libr. i. β. & saccharo dulcedo inducatur, adiicianturq; intybi satiui latioris compositi, serapii de rad.

rad. serapii byzantini, ana ʒ. ii. fiat autem serapium mediocriter coctum, quod depuretur, adiectisq; cinnamom. selecti, & santali citrini, ana ʒ. ij. suauiore & sapore, & odore reddatur. Eo utetur ægrotus diebus quinque appetente diluculo. Recipe pil. agre. pil. de rhabar. an ʒ. ʒ. Excipiantur stillatio liquore intybi satiui latioris, singanturq; pil. ʒ. quæ circa noctis dimidium sumantur.

Aut sic.

Recipe rhabar. selecti. ʒ. i. ʒ. spicæ nard. gra. vii. agar. in pastil. formam redacti. ʒ. i. Macerentur in stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, absinth. & pauco uino albo horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adiciantur cathol. ʒ. ʒ. diaphœn. elect. de succo ros. ana drach. i. serap. adianti. ʒ. ʒ. & cum communi medicinarum decocto, cui polypod. quer. ʒ. dimidiata sit addita, fiat potio, quæ hora quarta matutina sumatur. Si uero ægrotus pauper fuerit, sequenti utatur solutiuo pharmaco, uiliori quidem, non minus tamen utili. Recipe cathol. ʒ. vi. diaphœ. elect. de succo ros. ana ʒ. ii. serap. adianti. ʒ. ʒ. cum stillatitijs liquoribus absinth. & intybi satiui latioris, fiat potio, quæ sumatur: ut dictum est. Recipe diarrh. abb. tessellati tessellam. i. sumatur postridie manè. Vtrique enim humori conuenit. Sequenti deinde elect. utendum. Recipe pul. diarrho. abb. pul. electar. trium santal. ana ʒ. i. ʒ. trochiscorum de rhabar. ʒ. i. diacurcumæ maio. ʒ. ii. sacchari dissoluti in stillatitijs liquoribus absinth. & intybi satiui latioris q. s. fingatur elect. in tessellarum figuram, quarum singulæ sint ponderis ʒ. ij. ʒ. Sumatur una, horis tribus ante pastum, quater singulis hebdomad. Apoze mate autem sequenti, quod partim aperit, partim soluit, si quis

DE MORB. INTER. CVR.

si quis in his obstructionibus utatur, non leue sibi auxilium feret. Recipe quinque rad.com. maceratarum in aceto, ana ʒ.ʒ. quinque herbarum capil. intybi satiui latioris non loti, cichorii, seriola, ana P.i. chamædryos, chamæpityos, cassutæ, pentaphylli, filipendula, ana M.ʒ. aristolochiæ rotundæ, cas. lignæ, ana ʒ. ij. asari. ʒ. iii. quatuor seminum frig. maior, ana drachm. i. ʒ. seminum anisi, apij, hipposelini, ana drach. ii. cicerum rubr. Manip. ʒ. florum genistæ & sambuci, ana P.i. ʒ. polypodii quer. unc. i. ʒ. agar. in pastillorum formam redacti, medullæ cnici, ana unc. ʒ. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absumatur. Recipiatur iuris decocti expressi, & colo trāsfusi lib. i. ʒ. saccharo dulcedo inducatur, adiectisq; succi intybi satiui latioris, succi apii, ana unc. ii. scrapii byzantini, scrapii intybi satiui latioris, ana ʒ. ii. ʒ. fiat serapium mediocriter coctum, quod ubi depuratum fuerit, admistis cinnamomi drach. i. spicæ nardi ʒ. ii. iucundiore & sapore, & odore reddatur. Postremò drachm. iij. rhabar. selecti infundantur, in eoq; tantisper macerari permittantur, dum durabit. Hoc autem apozemate utetur ægrotus sex dies appetente diluculo. Aut apozematis loco sequentibus pil. Recipe pil. de hiera simpl. agarici recens in pastillorum formam redacti, ana ʒ. ii. rhabar. selecti ʒ. i. ʒ. Excipiantur scrapii byzantino, finganturq; pil. vi. è drachma, è quibus sumantur tres, per horam ante coenam, bis singulis hebdomadis.

PHLEGMONES HEPATIS CVRATIO.

Cap. II.

Signa. **I**Nflammationem in hepate fieri, uti & in aliis uisceribus, easdemq; ob causas, manifestum est. Quo ita affectio,

fectio, in dextra præcordiorum parte grauitas est, atque dolor, tota præcordia retrahens, atque ipsius ad iugulum usque extensio: tussis adest exigua, linguæ color in primis quidem ruber, deinde uerò niger, cibi fastidium, sitis in exhausta, uomitus bilis tum syncræ, tum eius quæ ouorū uitellis est similis, quæ æruginis colorem aliquando postea referre uidetur. Alius astringitur, nisi inflammationi huius uisceris imbecillitas coniuncta sit. Febris quoque acuta hunc affectum consequitur. Hæc autem inflammatio nonnunquam in sima huius uisceris parte consistit, nonnunquam uerò in eius gibbo. Quæ autem in sima parte eueniunt inflammationes, magis quam quæ in eius gibbo fiunt, cibi fastidium, nauscam, uomitum biliosum, stetitque inducunt. Quæ uerò in parte gibba eueniunt, maiore inter spirandum dolore laborantem afficiunt, tussim quoque maiorem excitant, dolorem præterea usque ad dextræ partis iugulum adeo, ut detrahi uideatur, extendunt: qui quidem dolor concavæ uenæ magis, quam membranarum tensionem sequitur. Porro cum alterutri parti dolor adest, ad nothas usque costas peruenit, nempe eis per membranas coniungitur. Inflammatio autem siue in huius uisceris parte gibba, siue in sima fuerit, in neutra tamen exquisite consistet, quoniã omnium eius partium carnes inter sese continuantur. Hepatis inflammationes, quæ in sima parte consistunt, tactu haud quaquã dignosci possunt. Quæ uerò in eius gibbo oriuntur, tactu quidem cognosci possunt, si magnæ sint, abdomenque natura sit gracile, aut morbo gracilius redditum: secus non. Scirrhus autem in hepate, inflammatione tactu euidentius dignosci potest, quoniam durior est scirrhi, quam inflammationis moles. Huc accedit,

DE MORB. INTER. CVR.

accedit, quòd extenuata solent esse corpora, quæ scirrhus incumbunt. Cæterum processu temporis, quanquam scirrhus augeatur, non æquè tamen facile erit ipsum tactu cognoscere, aqua inter cutem, quæ scirrhum illicò sequi consuevit, intercipiente indicium. Decipiuntur interdum nonnulli, musculorum iecori incumbentium inflammationes ipsi iecori tribuentes. Expedit igitur has inter se nosse distinguere. Inflammatis musculis, tumor iuxta situm eorum qui iecori incumbunt, oblongus apparet, uisui & tactui manifestus. Præterea musculis inflammatis, cutis illis incumbens circumtenditur, ut si quis digitis apprehensam attrahere uelit, minimè sequatur. Ad hæc ob musculorum inflammationem corporis color haudquaquam mutatur. Iecinore autem inflammato, tumor secundum lineamenta figura iecoris rotundus est. Ad corporis quoque decubitus conformatur. Nam maior apparet corpore in sinistrum latus reclinato, minor uerò eo in dextrum reuoluto, iecinore nimirum sub dextris costis cedente, neque tactui, neque uisui similiter succumbente. Præterea in hepatis inflammatione, cutis iecori incumbens naturalem suum seruat habitum, corporis, autem color auriginosus apparet. Curandi ratio statim, si nihil obstet, à uenæ sectione auspicanda, alio tamen prius iniecto enemate ducta, si (ut conuenit) excrementa non deiecerit. Recipe cas. recens extractæ, sacch. rubr. ana. ℥. i. ol. uiu. ℥. iij. salis. ℥. i. decocti quatuor remollientium herbarum, adiectis prunis. x. hord. P. i. lib. i. β. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum iniiciatur, coq; eiecto, incidatur iecoraria uena dextri cubiti, fiatq; (si uires, & ætas permiserint) copiosa sanguinis detra-

ctio

Ratio ad prohibendum phlegmones incrementum. Vires si repugnent sanguinis detractionem partiri satius erit. Si uero uene sectionem uires et asq; omnino dissuadeant, cucurbitula cum scarificatu natibus affigantur. Hemorrhoidum suppressio si hepatis phlegmonem excitauerit, confestim aperiantur, quod fiet si eas aut linteo aspero, aut ficulno folio aut cepis fricuere. Ante diem quartum solutiu a ualida exhibenda non sunt, etenim ad usque diem illum humores in fluxu sunt, qui pharmaco solutiuo irritati ad magis fluendum excitarentur. Ad quartum igitur diem usque adhibeantur repellentia ad fluxum cohibendum, admistis, pauca tamen quantitate, discutientibus et resoluentibus quoniam hepatis phlegmone ab astringentibus facile induratur. Ea autem partim sumantur, partim admoueantur. Sumantur autem hæc. Recipe serapij ex cotoneis, serapij, myrthei, serapij de rosis siccis, an. ʒ. i. serapij intybi satiui latioris simpl. (ad aperiendum) unc. ʒ. stillatitiorum liquorum plantaginis, solani, rosarum, ana. ʒ. ij. Misceantur, & à ieiuno per biduum diluculo sumantur. Repetatur usque ad quartum diem, si quidem ab ipso statim initio ægrotum Medicus curandum suscepit. Extrinsecus autem usque ad quartum diem hæc admoueantur. Recipe olei rosa. ol. myrthei, an. ʒ. i. ʒ. olei ex cotoneis ʒ. i. (resoluant) olei absint. ʒ. ʒ. succi plantag. ʒ. ij. santali rubr. rosarum rubrarum, ana ʒ. ij. His comistis, hepatis regio linatur tepide ante pastum usque ad quartum diem: post quem resoluentia sunt augenda, astringentia uero minuenda. Sic igitur in morbi incremento faciendum. Recipe ol. myrthei, ol. ex cotoneis, olei rosacei, succi plantaginis, ana ʒ. i. ʒ. ol. absinthij, ol. nardini, O an. ʒ.

DE MORB. INTER. CVR.

an. 3.ß. Misceantur, & hepatis regio manè, & uesperè ante pastum tepidè ungatur. In progressu olea resolutia augeantur, qualia sunt ol. absinth. & nard. astringentia uerò alia minuantur, idq; magis atque magis morbo ad uigoris finem, aut declinationem procedente. Si tantum Phlegmones ratio haberetur, dissoluentibus tantum uti oporteret, ceterum quoniam hepatis substantia facile dissoluitur, astringentia dissoluentibus admiscenda sunt: In hunc igitur modum faciendum. Recipe olei nardini, olei absinthij, ol. chamemeli, an. 3. i.ß. (sunt hæc mollietia, & dissoluentia) ol. rosac. 3. i. chamemeli, absinthij sicci, ana 3. ij. rosarum rub. 3.ß. His commistis linatur hepatis regio tepidè manè & uesperè. Absinthium astringit, eius autem oleum emollit.

TV MORIS HEPATIS A CAUSA

frigida Curatio. Cap. III.

Causæ.

AB humore pituitoso frigido in hepate collecto, interdum tumor, & abscessus oritur, qui si suppuretur, curari uix potest, quod hepar à pure purificari æger rimè possit: id quod prudens Medicus astantibus prædicere debet. Vena hoc in malo haudquaquam incidenda, nisi magna in uniuerso corpore plenitudo appareat. Primum enemate sequenti aluus mollienda, deinde repellentibus calidis, mistis cum subtiliter resoluentibus, tã sumptis, quam admotis utendum. Recipe quatuor herbarum remollientium, ana M. i. hordei furfuris, an. M.ß. florum chamemeli. P. i. Decoquantur in s. quãtitate aque ad tertias. accipiantur iuris decocti scsquilibra, cas. recens extractæ, sacchari rub. ana. 3. i. mel. ros. col. scsquiuncia. olei communis unc. iii. salis 3. i. Commistis omnibus fiat enema, quod ante

LIBER TERTIVS. 106

ante pastum iniiciatur. Sumantur deinde hæc. Recipe
 mel. rosacci col. unc. ij. serapij adianti sesquiunciam, serapij
 absinthij 3. i. stillatitiorum liquorum menthæ, cassiæ
 the, buglossi, ana 3. iij. Misceantur, & à ieiuno per tri-
 duum diluculo bibantur. Repetantur usque ad morbi de-
 clinationem, addendo stillatitiū liquorem fœniculi, præ-
 sertim si in hepatis gibbo tumor ille fuerit. Extrinsecus
 autem sequentia admoueantur. Recipe ol. rosa. olei ma-
 stich. an. 3. i. β. aceti 3. i. olei chamæmeli 3. semissim. Misce-
 antur, & hepatis regio tepide ungatur. In incremento,
 sequentibus oleis ungatur. Recipe olei mastich. 3. ij. o'ei
 chamæmeli. 3. i. β. His commistis ungatur hepatis regio ca-
 lide. In uigore autem hoc affectu existente, & declinatio-
 nis initio sumantur hæc. Recipe diacurcumæ maioris
 sesquiunciam, sumantur 3. ij. quotidie manè. Extrinsecus
 autem hæc fiant. Recipe olei nardini, olei absinthij, ol.
 chamæmeli, ana sesquiunciam. His commistis ungatur re-
 gio hepatis calide. In declinationis autem progressu ad-
 datur stercoris capræ. 3. β. Si hic tumor duritiem acqui-
 rat, ei sic succurrendum. Recipe diachyli ireati, empla-
 stri de meliloto, ana unc. i. β. pul. absinth. & spicæ nardi,
 ana drach. i. Subigantur cum oleo nard. fingaturq; empla-
 strum in lunæ dimidiatæ formam, quod hepatis regioni
 apponatur. Si uerò suppuretur, abscessumq; rumpi sit
 necesse, quod omnium est periculosissimum, si pus ad in-
 testina, rupto abscessu, declinare uideatur, lauandis ene-
 matis utendum, hunc in modum. Recipe decocti hord.
 & furfu. lib. i. sacchari semel duntaxat cocti, mellis rosac-
 cei col. ana. unc. i. Commistis omnibus fiat enema, quod an-
 te pastum immittatur. Si uerò pus ad urinæ uias decli-
 nare

DE MORB. INTER. CVR.

nare uisum sic, decocto sequenti utendum. Recipe quatuor seminum frig. maiorum unc. i. s. confriquantur, & cū decocto ciccerum rub. in quo radices apii, & fœniculi decoctæ fuerint, fiat emulsio, de qua exhibeantur ʒ. vi. appetente diluculo, tantisper dum pus in lotio apparebit.

HEPATIS IMBECILLITATIS

Curatio. Cap. IIII.

Hepatis imbecillitas à quauis intemperies insigni producitur: intemperies autem illa per contraria emendanda, calidam refrigerando, frigidam calefaciendo, humidam resiccando, siccam humectando. Caterum in huius affectus curatione hoc accuratè obseruandum, ut cum intemperiem corrigentibus addantur aliqua aperientia: quòd ferè cum illa intemperie adsit obstructio, à congregatis in ipso per imbecillam sanguificationem excrementis: astringentia etiam admiscenda, quò principis huius uisceris robur, firmitasq; conseruetur: partium quoque sint tenuium, aut tergeant, & leniant, dictaq; excrementa uacuent. Tlalia quidem sint, tam quæ sumuntur, quàm quæ admouentur. Intemperies autem calida si iecur occupauerit, humores primùm colliquantur, deinde ipsius uisceris carnes, bilis, crassa, grauiusq; olens per aluum euacuatur, ualdeq; colorata, urina rufa est, pulsus celer, sitis adest multa, cibus fastiditur, biliosa uomuntur, ferè febriunt. Frigida uerò intemperie, si iecur laboreat, deiectiones neque multæ sunt, neque assiduæ, certis autem diebus cumlatiùs excernuntur, sed quæ minùs oleant, quàm quæ per calorem colliquantur. Colore quoque alio sunt, atque consistentia. Sunt enim deiectiones, quæ per eam intemperiem egeruntur, similes aquæ in qua caro recens mactata

Signa.

ta

ta lota sit, præseque; plerunque ferunt sanguinis putrefa-
cti, aut in grumos coacti speciem, non quod sanguis uere
sit, aut grumus, sed ueluti limus, & sæx quædam sangui-
nis crassa, ad atræ bilis speciem proxime accedens. Plures
præterea, uarii que; deiectionum colores frigidam iecino-
ris intemperiem testantur. Qui hac intemperie laborant,
tantum abest, ut cibum fastidiant, ut maior etiam illis ci-
borum appetentia sit. Et quanquam facies illis non con-
cidat, febre tamen languida infestanter. Copulata autem
alterutri harum intemperierum siccitatis sitim augebit,
excrementa que; pauciora, ac sicciora reddet. Humiditas ue-
rò liquidiora, copiosiora que; sitim autem minuet. Medica-
menta autem calida huic affectui magis cōueniunt, quod
ferè hepatis imbecillitas ab intemperie frigida fiat, quæ
aut prima est, aut immodico calori sanguinem, & spiri-
tum, calorem que; natium dissipanti succedit. Si tamen ca-
lor adhuc subesset, calida uitanda. Vuæ passæ cum uina-
ccis tota substantia hepati familiares admodum sunt. Se-
quens quoque electarium iecur imbecillum mirifice robo-
rat. Recipe uuarum passarum detractis uinaccis drac:
xxxvij.ß. croci 3.i.ß. calami aromatici 3.ij.ß. ludaici
3.iiij.ß. 3.ij.gr.xv. cinnamomi 3.i.ß. cas. 3.ij.gran.v. iunci
odorati 3.iiij.ß. 3.ij.gr.v. myrrhæ 3.vi. terebinthinæ 3.iiij.
ß. baccarum oxyacanthæ 3.iii. spice aromaticæ 3.iiij.ß.
mellis lib.ij. uini q.s. Fiat elect. molle, de quo sumantur 3.
ij. quotidie manè.

OBSTRUCTIONIS LIENIS

Curatio. Cap. V.

HOc natura lieni officium dedit, ut melancholicum
sanguinē ad se ab hepate attrahat, quo & ipse qui
dem

Causæ.

DE MORB. INTER. CVR.

dem alitur. ubi autem ea facultas imbecillior facta est:
aut meatus per quem lien ab hepate faculentum illum
humorem attrahit, obstructus est: aut his qui à liene est
aduentriculum, per quem se penumero excrementa quæ-
dam ex se reijcit, quæ uomitione interdum, interdum ue-
rò per inferiora decedere uidentur, tunc uitiosus sanguis
per uniuersum distribuitur corpus, colorem corporis ad
Signa. nigredinem uergentem inducens. Nonnunquam etiam
immedicabilia hulcera hoc malo affecti obtinent, graui-
tatem in sinistro hypocondrio sentiunt, tumore interdum,
& duritie eas ob causas obort. spiritus difficultate, moe-
stitia melancholica, turbulentisq; somnijs uexantur. Si in
eo, qui his obstructionibus laborat, plenitudo sit, uires,
etasq; pmittant, iecoraria sinistri cubiti incidatur, fiatq;
fatis lata uenæ diductio, sanguis enim crassus est. Postri-
die uerò circiter meridiem incidatur in sinistram manu ue-
na ea, quæ est inter auricularem, & mediū digitum. Par-
ua etenim uenæ circa meridiem incidende sunt, quòd eo
tempore magis apparent. Materia deinde hunc in mo-
dum concoquatur. Recipe serapij de scolopendr. ʒ. ij. se-
rapij de bugloss. scsquiunciam, serapij de duabus rad. ʒ. i.
stillatitiorum liquorum tamaricis, scolopendr. lupi sali-
ctarij, fumarie an. ʒ. ij. ʒ. Misceantur, & à ieiuno per tri-
duum diluculò bibantur. Repetantur altero triduo.

Aut apozemate sequenti utatur egrotus:

Recipe corticis rad. cappar. unc. i. v. rad. com. macera-
tarum in aceto ana ʒ. ʒ. summitatum tamaricis, hemioni-
tidis, buglossi cum radice, pentaphylli, chamædryos, cha-
mæpityos, an. Manip. ʒ. v. herbarum capil. an. M. i. uua-
rum passarum detractis uinaceis ʒ. ʒ. seminis portulacæ
drach:

LIEBR TERTIVS. 108

drach. i. β. seminum anisi, fœniculi, uiticis, ana drachm. ij.
quatuor seminum frig. maiorum, ana drach. β. florum ui-
ticis, & genistæ, ana. P. i. β. trium florum communium,
ana P. i. polypod. quer. 3. i. folliculorum sennæ oriental.
3. β. Decoquantur in aquæ chalybatæ (lienem enim duri-
tatem dirimit.) s. q. ad usque dimidij consumptionem. Dein
de exprimantur, & colo trasfundantur. accipiantur, iu-
ris decocti lib. ij. quib. saccharo dulcedo inducatur, fiat q;
zulapium mediocriter coctum, quod depuretur, adie-
ctisq; cinnamomi selecti. 3. ij. pul. diarrhodi abb. drach. i.
iucundioris & odore, & sapore reddatur. Eo utatur æ-
grotus diu sex appetente diluculo. Recipe catholici
3. vi. compositionis hamech. 3. iij. serapij de scolope ndr.
3. β. cum communi medicinarum decocto, adiectis seminis
uiticis. 3. ij. polypodij quer. folliculorum sennæ oriental.
unc. β. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

Recipe iheriacæ ueter. scrup. ij. conseruæ buglosi. 3.
ij. Misceantur, & postridie manè sumantur sex horis
aut pastum.

Aut sic.

Recipe pil. indarum. drach. i. excipiatur stillatio li-
quore buglosi, finganturq; pil. v. quæ circa noctis dimi-
dium sumantur. Adhibenda deinde præsidia lienem cor-
roborantia, eiusq; obstructions tollentia tam sumpta,
quàm adnota. Componantur autem ex aperientibus, æ-
stringentibus mistis. Non tamen tam astringentia es-
se debent, quàm ea quæ hepatis gratia aut sumuntur,
aut admoventur, quoniam crassiore est lien substantia, et
solidiore, quàm hepar: quare non tam facile lienis substā-
tia, quàm hepatis, solui potest. Sumantur igitur hæc.

O 4 Recipe

DE MORB. INTER. CVR.

Recipe pul. diarrhodi abb. 3. ij. diacapp. 3. i. β. seminis portulacæ 3. i. seminis uiticis 3. i. iij. conscrue adianti, & scolopend. ana 3. i. β. sacchari dissoluti in stillatitio liquore tamaricis q. s. fiat elect. solidum in rhomborum figurā, sintq; singuli rhombi ponderis 3. ij. sumatur unus tribus horis ante pastum quater in hebdomada. Quo deglutito bibatur parum stillatitiorum liquorum buglossi & scolopendrij. Extrinsecus autem hæc admoueantur. Recipe chamæmeli, meliloti, stœchados Arab. ana M. i. aneti, florum genistæ, scolopendrij, ana M. β. cinnamomi, seminis uiticis, ana 3. i. iij. Decoquantur in aquis portionibus uini albi, aquæ, & aceti usque ad consumptionem partis dimidiæ. Hoc in decocto madefacta sponsia, & expressa foueatur regio lienis bis, aut ter, manè, & uespri ante pastum. Quæ ubi exiccata fuerit, ungatur unguento sequenti. Recipe olei de cappar. olei de lilio, ana 3. i. β. olei rutæ 3. i. olei amygdal. dulc. (ad remolliendum) 3. β. bdellij, ammoniaci dissolutorum in aceto, ana 3. ij. stercoris capræ, seminis uiticis, ana 3. i. iij. seminis portulacæ 3. i. croci 3. β. aceti parum, ceræ parum, fingatur unguentum, quo ungatur regio lienis, calidè manè, & uespri mox à fotu.

Aut admoueatur emplastrum sequens.

Recipe emplastri de meliloto, emplastri diachyli irea ti, ana unc. i. β. corticis cappar. scolopendrij sicci. ana 3. ij. seminis uiticis 3. i. subigantur cum olei de lil. & fingatur emplaf. in linguæ bouis figuram, quod lienis regioni admoueatur. Perseuerante obstructione, si qua quoque noxa in uentriculo sentiatur, utendum pil. sequentibus.

Recipe pil. de hiera simpl. agar. in pastillorum formam redacti, ana 3. i. β. folliculorum sennæ oriental. 3.

iiii. ex=

iiij. excipiantur serapio de scolopend. finganturq; pil. vi.
 ē drachma, ē quibus tres per horam ante coenam suman-
 tur, semel in hebdomada.

LIENIS PHLEGMONES CV-
 ratio. Cap. VI.

VT cetera uiscera, ita quoque lien phlegmone in- Causa.
 terdum laborat sanguine multo, coq; calido ad ip- Signa.
 sum confluente. Dignoscitur autem febre, & aestu, prae Vitus
 terea grauitate, tumore, distentione, doloreq; loci. Vi- ratio.
 ctus ratio eadem sit cum ea, quae in reliquis inflammatio-
 nibus dicta est. Potus sit aut cinnamomi decoctum, aut ui-
 nū aquosum. Medicamenta quae principio in omni Phleg-
 mone adhibentur repellentia, & astringentia esse debēt,
 ut id quod influit reprimant, & partis, in qua Phlegmo-
 ne sit, robur conseruent. Ceterum quoniam sanguis, qui
 in liene tumorem, & phlegmonem facit, crassus est, & ip-
 sius lienis substantia crassior, quam hepatis, non solum
 astringentia, siue repellentia exhibenda, sed etiam dissol-
 uentia, extenuantia, & incidentia, citra tamen euidentē
 calorem, quae astringentibus fortiora esse debent, ne cras-
 sus ille cumulat in liene succus obthuratus, uehemen-
 tius incrassescat. Curandi ratio à uenae sectione auspi- Curandi
 canda. Incidatur igitur iecoraria sinistri cubiti, lataq; ratio.
 fiat uenae diductio: sanguis autem pro plenitudine, & ui-
 ribus detrahatur. Postridie incidatur saluatella in sini-
 stra manu, quae est inter auricularem digitum, & annu-
 larem. Extrinsecus deinde haec admoueantur. Recipe
 olei rosacei, olei chamæmeli, ana unc. ii. Misceantur, &
 inungatur regio lienis calidè manè, & uesperis diebus
 quinque.

O S Aut

DE MORB. INTER. CVR.

Aut cataplasma sequens applicetur.

Recipe farine hordei unc. ij. rosarum rub. unc. i. chamæmeli, absinthij, meliloti, an. unc. β. Misceantur cū oleo ros. & ol. nard. fiatq; cataplasma, quod lienis regioni applicetur. Caliditas uerò si intensa sit, formetur cataplasma cum succo portulacæ, folijs salicis adiectis. In huius mali incremento relaxantia, siue dissoluentia augeantur. Fiat igitur hunc in modum. Recipe olei rosa. olei chamæm. olei de lilio, ana unc. i. β. Commistis his lienis regio ungatur calidè manè, & uestperi. ubi enim in uigore fuerit, ungatur solo oleo chamæmel. Cum autem ad declinationem peruenerit, ungatur oleis chamæme. & nard. mistis. Tumor autem lienis, si frigidus sit & mollis, citra phlegmonem, initio ungatur oleis absinth. et mastic. In progressu addatur oleum de lilio, & muccago seminis lini cum oleo rutæ.

SCIRRHI LIENIS CVRATIO.

Cap.

VII.

causæ.

victus
ratio.

Tumore lienis frigido, & molli, aut inflammatione minus rectè curatis, tumor durus in liene remanet, qui σκλήρῃς, Græcis dicitur. Quacunque autem ex causa oriatur, tactu ipsum facile est deprehendere. Cibus sit concoctu facilis, & boni succi. Vinum substantiæ sit tenuis, astrictione carens. Exercitium, uociferationesq; tēpestiuæ plurimū conferunt. Medicamenta autem aperientia, extenuantia, incidentia, & abstergentia esse debent, tã sumpta, quàm admota. Recipe serapij de scolopend. serapij de epithymo (aperiunt, & extenuant) serapij acetati simpl. (incidit propter acetum) ana ʒ. i. β. & scirrho diuturno, addatur quoque oxymelitos scillini ʒ. i. β.

LIBER TERTIVS. 110

i.ß. stillatitorum liquorum tamaricis, adianti, buglossi,
an. 3. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo su-
mantur, adiectis cinnanomi selecti 3. ij. saporis gratia.

Recipe catholici drac. vi. compositionis hamech drac.
iij. serapij adianti unc. ß. cum communi medicinarum de-
cocto, addendo polypod. quer. folliculorum sennæ ana 3.
ß. florum tamaricis P. i. ß. fiat potio, quæ sumatur hora
quarta matutina. Recipe pul. di. arrhodi abb. pul. dia-
capp. ana 3. ij. pul. rosatæ nouellæ 3. i. sacchari dissoluti in
stillatitijs liquoribus buglossi. & scolopendr. q. s. fingatur
elect. solidum in rhomborum figuram, sintq; singuli pon-
deris drach. ij. sumatur unus manè horas tres ante pastû.
Extrinssecus autem hæc admoueantur. Recipe unguene-
ti dialthææ unc. iij. olei de cappar. olei rutæ, ana unc. i.
Commistis his ungatur lienis regio calidè manè, & ue-
speri. Aut fiat ut sequitur, indeq; speret ægrotus haud uul-
gare præsidium, etiam scirrho diuturno. Recipe ame-
moniaci dissoluti in aceto scillino unc. ß. ol. amygdal. dulc.
unc. iij. ol. de lilio 3. ij. ol. de cappar. unc. ij. ß. adiecta cera
fiat unguentum, quo ungatur regio lienis calidè, manè, et
uesperi. Aut sic, & prædicto uiribus non cedit. Reci-
pe succi cyclamini, aut radicis eius, olei communis, ana
libr. i. olei amygdal. dul. 3. ij. seminis portulacæ 3. ij. aceti
3. i. ß. ceræ parum, fiat unguentum, quo lienis regio unga-
tur calidè.

Aut sic.

Recipe œsypi, axungie gallinæ, ol. amygdal. dulc.
ana drachm. i. ß. olei chamæmeli, ol. de cappar. ana unc.
i. Commistis his ungatur lienis regio calidè, manè, & ue-
speri ante pastum. Tumor autem lienis si sit à melan-
cholica

DE MORB. INTER. CVR.

cholica materia cum flatu mixta, concoquatur, & euacuetur, ut in Melancholia dictum est, cætera uerò fiant ut sequitur. Recipe pul. diacymini, pul. diacappar. ana. ʒ. ij. sacchari dissoluti in stillatitio liquore scolopendr. q. s. fiat elect. in tessellis, de quibus sumatur una quotidie manè. Ungatur & unguento sequenti. Recipe olei rutæ, olei chamæmel. ol. de cappar. ana. unc. ij. anisi, cumini. cinnamomi selecti, fructus tamaricis, ana. ʒ. i. β. aceti parum, & ceræ, fiat unguentum, quo ungatur regio lienis calidè manè, & uespèri.

DIARRHOEAE CVRATIO.

Cap. VIII.

Causæ.

Copiosum alui profluuium citra exulcerationem, aut inflammationem, Diarrhœa appellatur. Oritur autem hæc passio, aut ob uentriculi, aut intestinorū, aut iccoris, aut alienis imbecillitatem, quæ sunt instrumenta concoctioni seruiencia. Illius autem imbecillitatis cura ratio ex his, quæ superius tradita sunt, petenda est. Aut ob prauorum alimentorum copiosam ingestionem, quæ corrupta mordicationem excitant, uirtutemq; expultricem irritant: id quod tum ex ægri sermone, tum ex deiectionibus cognosci potest. Nam si biliose fuerint, flauo inficiuntur colore, neque citra caloris sensum, & mordicationem excernuntur. Alimenta uerò copiosius ingesta, si humidiora, uiscosioraq; fuerint, unde humores crassi, pituitosi, & lenti nati sint, qui corrupti diarrhœam excitauerint, contraria dictis prorsus erunt, quæ per aluum deijciuntur. Aut ob humorum c supernis partibus ad uentris spatia defluxum hoc pathema oritur. Aut ob retentricis facultatis imbecillitatem. Aut ob hepatis, aut uena-
rum

rum meseraicarum obstructionem. Aut ob uentriculi cruditatem. Aut denique ex totius corporis plenitudine. A qua, aut quapiam alia parte se per uentriculum, & intestina expurgante, Diarrhœa si excitata fuerit, natura, quæ superuacua sunt, et noxia expellere tentante, idq; facile is, qui laborat tolerauerit, tantum abest, ut id alui profluuium sistendum sit, ut etiam naturæ motus sit adiuuandus. Si autem fluor ille diutius perseuerans, non solum superuacua expellat, & noxia, sed etiam corporis habitum ueluti colliquet, uiresq; atterat, tunc ei tum sumptis, tum admotis, tum infusis resistendum. Si natura duce superflua alui profluuium expellantur, diebus ad summum duodecim terminari debet: ceterum si naturæ auxilio fuerimus, breuiori tempore finietur. Si tenuis igitur corporis habitudo, aliaq; signa biliosam corporis constitutionem ostendant, biliosaq; excrementa noxia, & superflua natura expellat, eius motum hunc in modum adiuuabimus.

Recipe rhabar. selecti parum torrefacti (sic enim acrimoniam perdit, parte subtili, & acri dissoluta) ʒ.ij. pul. miue ex cotoneis sine speciebus ʒ.i. cum aqua chalybata, aut stillatitio liquore plantag. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

Aut sic.

Recipe corticis myrobala. flauarum parum torrefactarum ʒ.ij. rhaba. parum torrefacti ʒ.i. fiat pul. & cum uino acerbo, & stillatitio liquore plantag. aut rosa. fiat potio. Atque hæc magis puluerata, quam infusa conueniunt. Si quis tamen tam delicato palato fuerit, ut à pulueribus offendatur, infusio hunc in modum fiat. Recipe rhabar. parum torrefacti drach.ij. macerentur in stillatitio

DE MORB. INTER. CVR.

latitio liquore plantag. in quo balauft. myrthi baccae, rosa rub. decocta fuerint, horis xij. deinde exprimantur, adiecta q; serapij ex cotoneis 3.ß. fiat potio, quæ sumatur hora quinta matutina.

Aut sic.

Recipe rhaba. selecti parum torrefacti 3.ij. subigatur cum miua ex cotoneis, & saccharo ros. antiquo. q. s. fingatur bolus, qui antelucano tempore sumatur.

Aut sic.

Recipe rhabar. selecti, parum torrefacti 3.ij. subigantur cum miua ex cotoneis, finganturq; pil. ix. quæ sumantur hora tertia à noctis dimidio. Quod si prædictis remedijs materia, quæ multa erat, non satis uacuata uideatur, repetantur. Si uerò prorsus uacuata sit, aut maiori certè ex parte, ad fluxum astringendum se medicus conuertat, hunc in modum. Recipe carniū cotoneorum saccharo conditarum sine speciebus 3.iiij. sumantur 3.ij. non multò ante pastum tempore.

Aut sic.

Recipe conseruæ rosa. antiquæ, cons. symphyti, ana 3. i.ß. lapidis hæmatit. 3.ij. baccarum myrthi 3. i.ß. boli Armeniæ lotæ instillatitio liquore ros. 3.ij.ß. excipiantur serapio ex cotoneis, fiatq; elect. molle, de quo sumantur 3.ij. exiguò ante pastum tempore.

Aut sic.

Recipe serapij myrthi, serapij rosacei de rosis siccis, serapij ex cotoneis, ana 3.ß. stillatitiorum liquorum, peræ pastoritiæ, plantaginis, rosarum, ana unc. i. Miscantur, & ieiuno uentriculo manè sumantur. Sunt autem hæc inter se uarianda, uteturq; illis uicissim ægrotus, ne
uni

uni natura assueta, eo tanquam cibo utatur. Extrinsecus autem sequentia admoucantur. Recipe olei myrthei, olei ex cotoneis, olei mastich. ana unc. ij. boli Armeniæ, acaciæ, hypocistidos, lapidis hæmatit. mumie, ana drachm. i. ß. ceræ parum, fiat unguentum, quo ungantur uenter infra umbilicum, & renes calidè manè, & uesperis ante pastum. Animi defectio, uentris dolor, ardorq; uehemens huic affectui interdum superueniunt, quibus symptomatibus tam sumptis, quam admotis medicamentis hunc in modum occurrendum. Recipe cornu cerui usti. drachm. ij. Misceantur cum stillatio liquore plantag. & bibantur ante pastum, materia maiori ex parte uacuata, non antè. Confert autem hoc medicamentum non solum dolori uentris ex fluxu, sed & dolori colico. Extrinsecus autem hæc admoucantur, materia (ut diximus) uacuata. Recipe gallarum, rhois obsoniorum, baccarum myrthi, an. Manipul. i. pomorum syluestrium contusorum unc. iij. cumini in aceto infusi unc. iij. rosa. rub. M. ß. Decoquantur in aqua, in qua ferrum candens sæpius extinctum sit, in eaq; calida madefacta spongia, & expressa foueatur uenter calidè manè, & uesperis. Præterea frictionibus, ligaturisq; dolorificis extremitatum facienda reuulsio. Cucurbitule quoque super umbilicum affigantur sine scarificatu, ibiq; per quartam horæ partem hæcant. Non enim solum uentris fluxionem sistent, sed & dolorem auferent. Cruera quoque si sequenti lotione lauentur, fluens materia reuelletur. Recipe radicis filicis, radicis calcatrapæ, ana Manip. ij. foliorum plantaginis, balaustiorum, rosarum rubrarum, ana M. i. Decoquantur in aqua, in qua
ferrum

DE MORB. INTER. CVR.

ferrum candens saepe extinctum sit, & uino astringente, hocq; in decocto lauentur crura: ut dictum est. Diarrhoea uero si à pituitosis humoribus fuerit lentis, crassis, & corruptis, naturæ motum noxia expellentis hunc que in modum adiuuare licebit. Recipe hieræ simpl. Gal. 3. vi. sumantur diluculo.

Aut sic.

Recipe pilul. mastich. 3. i. cum stillatio liquore absinth. fingantur pilul. quinque, quæ sumantur hora noctis decima, aut undecima. Turpetum, idq; genus alia medicamenta ualentiora haud conueniunt. Retentrix deinde uirtus uentriculi, & intestinorum medicamentis tam sumptis, quam ad motis roboranda hunc in modum.

Recipe diacydonites cum speciebus 3. iij. sumantur 3. ij. quotidie mane non multo ante pastum tempore. Sumatur præterea semel in hebdomada 3. i. theriacæ ueter. manè sex horis ante pastum. Extrinsecus autem sic roboretur. Recipe olei nardini, olei mastich. olei menthæ, ana 3. ij. caryophyllorum, menthæ siccæ, cardamomi, ana 3. ij. coralli rubr. 3. i. ceræ parum, fiat unguentum quo ungatur uenter, & regio uentriculi calide ante pastum mane, & uespere.

Aut sic.

Recipe emplastri de mastich. unc. iij. fingatur emplastrum in scuti, ut uulgò loquuntur, stomachalis figuram, quod uentriculi regioni applicetur. Diarrhoea si à defluxione humorum ex capite in uentriculum nascatur, frequentes habet paroxysmos, materia enim prima uacuata, noua generatur, quæ defluxionem rursum excitat. Paroxysmi tempore utatur ægrotus pilul. sequentibus.

Reci

LIBER TERTIVS.

113

Recipe pilul. asaieret, pil. mastich. an. drachm. β . Excipiantur stillatitio liquore betonica, finganturq; pilul. v . que sumantur horis tribus post coenam ab egroto lectū ingredi uolente. Deinde pul. capitali inspergatur pars capitis anterior, eodem quoque tempore. Aut fingatur pilcolus cui sequentes pulueres insuantur. Recipe mellyssophylli, betonica, sampsuchi, ana M . β . stæcad. Arab. ros. rub. florum roris mar. ana. P . i. nigellæ Rom. torrefactæ. \mathfrak{z} . iij. gummi iuniperi \mathfrak{z} . ij. corian. præpar. cocci infestorij, an. \mathfrak{z} . ij. β . maceros, caryophyllorum, an. \mathfrak{z} . i. Insuantur panno sericeo rubro, & raro, fingaturq; pilcolus acui interpunctus, qui gestetur. Utendum & sequenti suffitu.

Recipe thuris, mastich. ana \mathfrak{z} . i. styracis calamitidis, ladani, ana \mathfrak{z} . ij. succi cyrenaici \mathfrak{z} . iij. sandaracæ \mathfrak{z} . β . His confractis suffitus fiat, quo capitis operimentum suffiatur manè, & uespèri. Præterea uentriculus, & intestina roborentur medicamentis tam sumptis, quàm admotis, diætis in Diarrhœa pituitosa. Diarrhœa à cruditate uentriculi si fuerit, ea laboratè primùm oportet pauco uti cibo, eoq; boni succi, & concoctu facili: uentriculo deinde hunc in modum succurrendum. Recipe pil. alephang. \mathfrak{z} . i. β . pil. mastich. \mathfrak{z} . i. β . Excipiantur stillatitio liquore absinth. finganturq; pil. ix. è quibus tres per horam unā sumantur ante coenam alternis diebus. Tertio autem, aut quarto, à fluxu die, sumat drach. ij. diacydonites cum speciebus non multò antè pastum tempore. Extrinsecus autem apponatur uentriculo emplastrum de mastich. in scuti (ut loquuntur) stomachalis figuram, formatum.

Aut sic.

Recipe cerati Gal. emendantis uitia stomachi, olei
P nard.

DE MORB. INTER. C VR.

nard. ana unc. ij. His commistis uentriculi regio calide ante pastum linatur mane, & uesper. Diarrhœa quoque obstructis meseraicis uenis plerunque oritur, tuncq; apparent deiectiones chylosæ. Quod ubi cōtigerit, primum astringentia omnia uitentur: sumatur autem sequens portio purgans. Recipe rhabarb. selecti unc. i. β. agar. recens in pastillorum formam redacti drach. i. spicæ nardi gra. v. macerentur in stillatitijs liquoribus apij, & intybi satiui latioris, ac pauco uini albi, horis duodecim deinceps exprimantur, & colentur, adiectisq; cathol. unc. β. serapij adianti unc. i. fiat potio, quæ sumatur hora quinta matutina. Sequenti deinde elect. utendum. Recipe pulu. diacurcumæ maioris, pul. diarrhodi abb. ana 3. ij. sacchari dissoluti in stillatitijs liquoribus fœniculi, aut apij, q. s. fingatur elect. solidum in rhomborum figuram, sintq; singuli ponderis drach. ij. β. Sumatur unus quotidie mane horis tribus ante pastum: quo deglutito bibatur parum uini albi, aut gilui diluti.

Aut sic.

Recipe cicerum rub. non lotorum, M. i. radicum apij, & fœniculi, ana unc. β. adianti recentis, M. β. Decoquantur in s. q. aquæ, usque ad absorptionem dimidij: accipiat iuris decocti lib. i. quæ per biduum bibatur in æquas portiones partita. Atque id commodè fiet ante potionis purgantis prædictæ sumptionem, concoquentium serapiorum loco. Diarrhœa autem ab hepatis obstructione si fuerit, cognoscetur dextri hypocondrij grauitate. Quæ quidem obstructio si sit in hepatis parte sima, curetur ut obstructio uenarum meseraicarum proximè dicta. Si uerò in hepatis gibbo, quod ex urina cognoscetur, fortiora

LIBER TERTIVS. 114

tiora exhibeantur diuretica. Quod si huic affectui hepatis caliditas adiuncta sit, apozemate sequenti utendum.

Recipe v. rad. com. maceratarū in aceto, an. 3. β. intybi satiui latioris non loti, cichorij cū radice, seriolæ ana M. β. quinque herbarum capil. an. M. i. quatuor seminum frig. maiorum, an. 3. i. β. seminum apij, anisi, & fœniculi, an. 3. i. cicerum rubr. M. β. florum sambuchi, & genistæ, an. P. i. Decoquantur in s. q. aque ad dimidij consumptionem usque: accipiatur iuris decocti lib. i. β. saccharo dulce reddatur. fiat q; serapium mediocriter coctum: quod depuretur, adiectisq; cinnamomi selecti 3. i. β. pul. diarrhodi abb. 3. i. suauiore & sapore, & odore reddatur. Eo ægrotus ieiunus utetur manè, diebus quatuor. Utendum dein de potione purgante proximè dicta in obstructione uenarū meseraicarum. Vacuato corpore sumat quotidie manè elect. solidi diarrhodi abb. tessellam unam. Obstructio uerò hepatis si cum ipsius frigidityte sit coniuncta, ci hunc in modū medebimur. Recipe serapij de rad. oxymelitos diurecti, serapij adianti, an. 3. i. β. stillatitiorum liquorū absinthij, apij, fœniculi, an. 3. iij. Fiat in zupij modum, quod depuretur, & adiectis cinnamomi 3. ij. oris uauius reddatur. Eo utetur ægrotus diebus quatuor.

Aut sic.

Recipe quinque rad. comm. maceratarum in uino albo, ana unc. β. chamædryos, chamæpityos, pentaphylli, sili pendule, ana M. i. absinthij Pontici M. β. asari drac. iij. cicerum rub. M. i. seminum anisi, apij, & fœniculi, ana drach. ij. florum genistæ, & sambuchi, ana P. i. β. polypodij quer. 3. i. agar. in pastillorum formam redacti 3. β. Decoquantur in s. q. aque, usque ad partis dimidiæ absorptionem:

DE MORB. INTER. CVR.

ptionem: accipiat iuris decocti lib. i. β . quæ adiecto saccharo & melle, dulcis reddatur, fiatq; serapium mediocriter coctum, quod depuretur, & adiectis \mathfrak{z} . iij. cinnamomi selecti, iucundiore fiat & odore, & sapore. Eo utetur egrotus ieiunus, manè diebus quatuor. Vacuetur deinde sumpta potione sequenti. Recipe agar. in pastillorum formam redacti. \mathfrak{z} . iij. medullæ cnici \mathfrak{z} . iij. Maccrentur in oxymelite simpl. & stillatitijs liquoribus fœniculi, et apij horis xij. deinde exprimantur, adiectisq; cathol. \mathfrak{z} . β . diaphœnici \mathfrak{z} . i. β . fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe theriacæ ueter. \mathfrak{z} . i. conseruæ adianti, conseruæ buglossi, ana \mathfrak{z} . i. β . Miscantur, & postridie manè sumantur horis sex ante pastum. Vacuato corpore, dies complusculos manè \mathfrak{z} . ij. diacurcumæ maioris sumantur. Lienis autem uitio si Diarrhœa contigerit, id quod ex dolore, & grauitate circa lienis regionem cognoscitur, id lienis uitium curadum remedijs superius dictis, cum lienis affectum curandorum methodus tradita est. Hepatis quoque ui, & concoctrice, & retentrice imbecilla facta, Diarrhœa interdum suboritur. Cæterum deiectiones tunc excernuntur aquæ similes, in qua recens matata caro lota est. Solus autem uuarum passarum cum uinacis probè dentibus comminutis in pastus principio usus frequens, huic malo mederi potest. Aut electarium molle in hepatis imbecillitate traditum.

DE IECTIONIS SANGVINIS CURATIO. Cap. IX.

Sanguis etiam interdum per aluum, sine intestinorū abrasione, & dolore egeritur, ab hepate malè affecto de fluens. Huic autem hepatis uitio caliditas nōnunquam

quam coniuncta est interdum uerò frigiditas. Caliditas autem cognoscitur ex graueolentia deiectionis sanguinis, & uehementia sitis: sequiturq; hoc malum plerumque ardentibus febres, cui tam sumptis, quam admotis hunc in modum succurrendum. Recipe elect. solidi trium santalorum rhabarb. duplicato. unc. iij. sumatur tessella una quotidie mane horis tribus ante pastum. Extrinsecus autem hæc fiant. Recipe cerati santalini unc. v. spicæ nardi ℥. i. Misceantur, & hepatis regioni applicentur matutinis horis ante pastum.

Aut sic.

Recipe stillatitij liquoris rosarum, stillatitij liquoris intybi satiui latioris, ana lib. β. omnium santalorum, ana ℥. i. β. caphuræ gran. iij. spodij ℥. ij. spicæ nardi ℥. β. acetiparum. His commistis fiat epithema hepatis tepide, matutinis horis ante pastum. Frigiditate autem cum dicto hepatis uitio coniuncta, sitis non adest, nec febres hoc malum sequitur. Ei quoque tum sumptis, tum admotis hunc in modum medebimur. Recipe elect. solidi aromatici rosati maioris, aut de cinnamomo ℥. ij. sumatur rhombus unus quotidie mane. Extrinsecus autem hepatis regio ungatur olco nard. & mastichino calide, matutinis horis ante pastum.

DYSENTERIAE CURATIO.

Cap.

X.

TOrmina uel malum hoc Medicorum nonnulli appellant, quòd in eo intestina dolore admodum torquentur, ob ipsorum exulcerationem. Huius autem exulcerationis causæ sunt interdum externæ, ut frigiditas, aut calor, aut perniciosorum medicamentorum po-

causæ.

P 3 tio.

DE MORB. INTER. CVR.

tio. Interdum uerò causæ sunt internæ. Nam aut à bile fla-
 ua, aut pituitosa salsa, aut à bile adusta, atque id genus
 humoribus acribus, & mordacibus, aut ab uniuerso cor-
 pore ad uentrem confluentibus, aut in ipso natis ob crudi-
 tates, aut fructuum comestione, aut acrium uitiosorūq;
 ciborum usum. Principiò, hoc pathemate inchoante, bilio-
 sa, uaria, & mordacia excernuntur. Deinde interaneorū
 abrasiones sequuntur. Postremò paulum cruoris simul ex-
 cerni uidetur, quando uidelicet ipse affectus iam Dysen-
 teria esse censetur. Quando autem huiusmodi abrasiones
 solæ, hoc est sine sanguine excernuntur, considerandum
 num pingue quidpiam simul cum illis deiciatur, in cras-
 sis enim intestinis hylcus esse tunc credendum, à quibus
 pingue illud, quod ipsis intrinsecus adhærebat, liquefa-
 ctum, & abrasum excernitur. Vbi uerò cruorem excerni
 quoque uideris, intueri oportet, utrum is reliquis excre-
 mentis ita sit admixtus, ut uniuersus misceatur uniuersis,
 an pars eius aliqua reliquis supermanet. Etenim ubi uni-
 uersus sanguis uniuersis excrementis est admixtus in supe-
 rioribus intestinis hylcus esse indicat: si uerò supernat at,
 in humilioribus. Hylcere autem in tenuibus intestinis
 existente, dolores acerbissimi ad animi usque deliquium
 circa umbilicum consistunt: biliosa, porriq; colorem ha-
 bentia, atque omnino uariegata excernuntur: siti ægro-
 ti infestantur, febriuntq;. Porro non parum conducit
 ad curandi rationem nosse, in qua intestinorum parte
 hylcus consistat. Nam si in superioribus intestinis fuerit,
 ab epotis medicamentis petendum præsidium est: si uerò
 in humilioribus, enema subijcere magis conuenit. Quies
 in hoc affectu salubris admodum est. Cibus paucus sit, ut
 partes

Vi&us
 ratio.

partes largiore alimento destitutæ contumaciùs quem habent humorem retineant, nec tam facile ab hulceratis intestinis trahentibus abduci permittant. Sit idem euchy- mus, & coctu facilis, quod uentriculi facultas coctrix, retentrix quoque imbecilla sit. Oua igitur sorbilia, per- dices, contusum carniū, hepata gallinarum, oriza cum lacte, amyllum, oua lacti admista conueniunt. Lac quoque acidum, lapidibus, aut ferro candenti ustulatum ter qua- tervē, epotum plurimū confert. Vinum aut nullum bi- batur, aut astringens sit, & aqua chalybata dilutum. Zu- lapium quoque rosatum per se salubre est. Aqua quoque pluuiā, aut eius defectu fontana, in qua chalybs ignitus extinctus sit, huius præsertim mali principio, salubris est. Ad Dysenterię autem curationem in inferioribus in- testinis consistentē (quæ, præter ea quæ dicta sunt, uel ex hoc cognoscitur, quod excrementa cum flatu prodeūt, multaq; sunt, & coaceruata, aliquando etiam spumosa, pinguiāq; illis commista sunt) lauātibus enematibus pri- mū utendum est hunc in modum. Recipe iuris deco- cti hordei lib. i. sacchari semel duntaxat cocti 3. i. uitellos ouorum duos, fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Hoc autē lauante enemate sæpe utendum est, & ante cor- poris uacuationem, & post. Nam si materia pauca sit, so- lis interdū id genus enematibus curatur hic affectus. Si ue- rò materia crassa appareat, enemata non solum lauātia, sed et abstergentia sint, præsertim si salsa pituita sit, hūc in modum. Recipe iuris decocti hordei lib. i. sacchari ru- bri, mellis rosacei col. ana unc. i. uitellos ouorum duos, fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Si autem magnus ar- dor in excrementis, cū intenso uentris dolore uideatur, se-
P 4 quenti

DE MORB. INTER. CVR.

quenti enemate utemur. Recipe succi plantaginis fæ-
cæ subsidente depurati unc. iiij. olei rosa. 3. vi. muccaginis
psyllij extractæ in stillatitio liquore ros. 3. ij. fiat enema,
quod ante pastum immittatur. Si uerò non solum laua-
re intestina, & abstergere, sed etiam dolorem mitiga-
re sit opus, hoc enemate iniecto, id consequemur. Reci-
pe iuris decocti hordei lib. i. sacchari rubr. mellis rosacci
col. ana 3. i. ʒ. muccaginis psyllii extractæ in stillatitio li-
quore rosa. 3. ij. fiat enema, quod ante pastum iniiciatur.
Corpus deinde sequenti potione purgante uacuandum.

Recipe rhabar. selecti torrefacti 3. i. ʒ. myrobalano.
flauarum parum torrefactarum 3. ij. stillatitij liquoris
plantaginis q. s. adiecta serapii ex cotoneis 3. i. fiat po-
tio, quæ sumatur hora quarta matutina. Si autem à bile
adusta huius mali origo sit, potione sequenti uacuatur.

Recipe myrobalanorum flauarum, & cærulearum
parum torrefactarum, ana 3. i. ʒ. rhabar. parum torrefa-
cti ʒ. iiij. serapii ex cotoneis 3. i. adiectis stillatitiis li-
quoribus rosa. & plantaginis q. s. fiat potio. Si uerò à pie-
tuita salsa Dysenteria suborta fuerit, mutantur myro-
bal. cæruleæ in cepulas, aut empeliticæ, eadem quantita-
te manente. Vacuato corpore, utendum ut dictum est, ene-
mate lauante superius tradito. His peractis, si materia
maiori ex parte imminuta, uacuataq; uideatur, adhiben-
da tam extrinsecus, quàm intrinsecus constringentia. In-
trinsecus autem hunc in modum. Recipe serapii ex co-
toneis, serapii myrthæ, ana 3. iiij. Misceantur cum aqua
pluuia, aut aqua fontana chalybata, & sitis tempore bi-
bantur. Sumantur & drachmæ duæ carnium cotoneorū
saccharo conditarum sine speciebus quotidie manè, ante
pastum

pastum exiguo quidem tempore. Inijciantur quoque enemata lauantia, idq; sepe fiat, donec exire uideantur syn-
cera, uitiosis humoribus haudquaquam permista. quod
ubi contigerit, constringentia inijciantur hunc in modū.

Recipe gallarum, rhois obsoniorum, rosarum rub. bac-
carum myrthi, balaustiorum, orizæ torrefactæ, ana M. i.
Decoquantur in aquæ pluuiæ, aut chalybatæ q. s. ad usque
dimidii consumptionem. accipiantur iuris decocti libr. i.
succī plantaginīs subsidente fæce depurati ℥. iij. seu renū
caprarum ℥. ij. lapidis hæmatitis, mumie, boli Armeniæ,
sanguinis draconis, gummi tragacanthæ, gummi Arab:
ana. ℥. ij. Commistis omnibus, fiat enema, quod ante pa-
stum inijciatur. Perseuerante autem fluxu, lauante ene-
mate superius tradito semper utendum. Extrinsecus au-
tem sequentia admoueantur. Recipe olei myrthæ, olei
ex cotoneis, olei mastich. ana unc. ij. acaciæ, hypocistidos,
boli Armeniæ, rhois obsoniorum, baccarum myrthi, ana
℥. ij. ceræ parum, fiat unguentum, quo ungatur uenter ab
umbilico ad pubem, & renes calidè, manè, & uesperī an-
te pastum.

Aut sic.

Recipe boli Armeniæ, mumie, ana ℥. ℞. Misceantur
cum albo oui. linanturq; uenter, & renes: ut dictum est,
ab umbilico ad pubem calidè, manè, & uesperī ante pa-
stum. Crura quoque sequenti decocto lauentur. Reci-
pe gallarum, rhois obsoniorum, ana ℥. i. ℞. foliorum plan-
tag. M. i. rad. filicis, calcatræ, ana M. ij. Decoquantur
in aqua chalybata, & uino astringente. Eoq; decocto la-
uentur crura manè, & uesperī. Balneis tandem sudorem
prouocare absurdum non erit. Postremò & cucurbitulas

P S umbi-

DE MORB. INTER. CVR.

umbilico, & ilibus utrisque affigere, opem non leuem afferet. Dysenteria si in superioribus intestinis fuerit, iisdem planè præsijs curanda, quibus Dysenteria in inferioribus intestinis consistens, exceptis enematribus, quoniam gracilia intestina non superant. Porro si hepatis intemperies calida acres hos humores, à quibus Dysenteria fit, generet, ungatur hepar unguento sequenti. Recipe cerati santalini ℥.iiij. olei nymphaeae, olei rosacei, ana ℥.i. β. lauentur aqua frigida, adiectoq; spicae nardi ℥.i. ungatur hepatis regio tepide, dies duos, aut tres, horis matutinis ante pastum.

LIENTERIAE CVRATIO.

Cap.

XI.

VEloxx exitus eorum, quæ comeduntur, & bibuntur, quæ talia deiciuntur, qualia fuere deuorata, lenteria est. Huius autem uelocis exitus interdum nimius cibis: interdum ciborum præposterius ordo, crasso tenuè præcedente, in causa est. Contingit aliquando id mali obneruorum à sexta syzygia prodeuntium uillos interioris tunicae uentriculi constituentium resolutionem. Totius uentriculi, atque intestinorum imbecillitas huius uelocis ciborum exitus interdum in causa est, ob quã hæ corporis partes grauatae à cibis assumptis, ipsos confestim excernunt, absque ullo doloris sensu. Hæc autem imbecillitas retentricis potentiae uentriculi, & intestinorum ex intemperatura fit, quam ueluti quendam habitum nõ facilem solui contraxerunt: aut propter humorem aliquem, putà pituitosum, aut biliosum, qui in uentriculo, atque intestinis continetur. Fit interdum hæc passio ab his partibus non admodum infirmis, sed tamen in superficie

Causa.

victus
ratio.

ficie exulceratis ab humorem quorundam mordacitate, & acrimonia. Tunc enim necessarium, ut permeantibus cibis partes exulceratæ dolorē sentiant, atque ideo illos propellant, ac à seipsis citissimè emittant. Verùm huic intestinorum, & uentriculi lenitati cuiusdam morsus interit sensus. Id quod etiam uentriculo phlegmone laborante euenit, apparetq; in deiectionibus plerunque aliquid puris. Si lienteria ab imbecillitate uentriculi ob intemperaturam solam sine humore fuerit, eius curandæ ratio ex his petenda est, quæ superius sunt tradita, cum de uentriculi affectibus ageretur. Si uerò ea intemperatura imbecillitatem uentriculi efficiens cum humore fuerit, humor primum uacuandus, deinde intemperaturæ, atque imbecillitati curandæ incumbendum. Quod si is humor pituitosus fuerit, qui facultatem uentriculi retentricem labefactet, aut eius tunicis adhærens lubricum ipsum, faciemq; ad ciborū emissionem reddat, eius uacuatio uomitu primum tentanda hunc in modum. Recipe aquæ tepidæ ℥.vi. oxymelit. simpl. ℥.i.℞. Misceantur, et bibantur. Vomitu autem non inde irritato, penna, cuius extremum oleo madefactū sit, in os, & fauces immittatur. Quod si neque ita successerit, ualidiora sumantur hunc in modum. Recipe oxymelitos scillini ℥.i.℞. stillatitij liquoris fœniculi ℥.iij. Misceantur, & à ieiuno bibantur, fiatq; per biduum diluculo. Postridie cibos uarios, & sal sos prandeat, mox à prandio rursus oxymeli cum aqua tepida, ut dictum est, bibat, uomitumq; aut digitis in os, ac fauces immisis, aut penna (ut dictū est) uomitus prouocetur. Si uerò laborans nō suapte natura facile uomat, cogendus non est, cæterum sumpto solutiuo pharmaco uacuetur

DE MORB. INTER. CVR.

tur hunc in modum. Recipe hieræ picræ Galeni ʒ.ß. adiecto saccharo fingatur bolus, qui hora quinta matutina sumatur.

Aut sic.

Recipe pil. mastich. ʒ. i. ex stillatitio liquore absinth. finganturq; pil. v. quæ sumantur circiter horam noctis undecimam. Aut harum loco sumatur pil. alephang. ʒ. i. Nihil autem quodualidè astringat exhibendum, nisi corpore uacuato. Quo uacuato,umat laborans zinziber cõditum, aut de diacydonitæ cum speciebus, castaneæ instar, ante pastum quotidie manè. Extrinsecus autem hæc admoveantur. Recipe olei mastich. olei de lentisco, ol. nardini, ana ʒ. i. ß. menthæ siccæ, caryophyl. acaciæ, hypocistidos, mastich. ana ʒ. i. ß. ceræ parum, fiat unguentum, quo ungatur regio uentriculi, & uenter calidè ante pastum, manè, & uesperis. Aut huius unguenti loco, cerato sequenti utendum. Recipe mastic. ʒ. ß. ladani ʒ. ij. menthæ siccæ, caryophyllorum, coriandri præparati, cardamomi, ana ʒ. i. ß. corallii rub. ʒ. i. adiecta cera fingatur emplastrum in formam scuti (ut loquuntur) stomachalis, quod uentriculi regioni applicetur. Humor uerò si biliosus fuerit, qui uentriculi potentiam retentricem atterens, Lienteriam excitet, eius quoque uacuatio uomitus primùm tentanda hunc in modum. Recipe aquæ tepidæ unc. vi. serapij acetati simpl. aut aceti ʒ. i. ß. Miscantur, & bibantur: uomitusq; ut paulò ante dictum est, prouocetur: Si uerò materia hæc biliosa uomitu non satis euacuata fuerit, sumatur sequens potio purgans. Recipe rhabarb. selecti parum torrefacti ʒ. i. ß. myrobala-
no. flauarum parum quoque torrefactarum. ʒ. i. carniū
coto=

cotoneorum sine speciebus 3.ß. stillatiti liquoris plantag. q.ß. fiat potio purgans, quæ sumatur hora quarta matutina. Corpore uacuato astringentibus utendum tam sumptis, quam admotis. Recipe diacydonites sine speciebus, cum saccharo unc. iiij. sumantur drach. ij. in principio pastus.

Aut sic.

Recipe conscrue rosa. antiquæ unc. ij. carniū cotoneorum conditarum saccharo sine speciebus 3. iij. coralli rubri, boli Armeniæ, ana 3. ij. minæ ex cotoneis sine speciebus 3.ß. Misceantur, sumaturq; castaneæ parvæ instar in principio pastus. Extrinsecus autem hæc admouean-
tur. Recipe olei ex cotoneis, olei myrthei, olei mastice. an. 3. i.ß. acaciæ, hypocistidos, boli Armeniæ, coralli rub. ana. 3. i.ß. Adiecta cera fiat unguentum, quo ungatur regio uentriculi calidè mane, & uespere, ante pastum. Lien-
teria si ab hulcerato uentriculo orta sit, mundificetur hulus hunc in modum. Recipe cas. recens extractæ 3. i. aquæ mulsæ, unc. iiij. Misceantur, fiatq; potio, quæ sumatur ad auroram. Dies deinde aliquot horis matutinis iei-
iuno uentriculo sumat laborans 3. vi. iuris decocti uuarum passarum cum oxymelite simplici. Hulcere purifica-
to, quod cognoscitur ab excrementis nullo cum pure deie-
ctis, sumatur 3. i. pul. equiseti, cum uino astringente, aut aqua chalybata, idq; dies complusculos fiat, ad aurorã. Ungatur quoque uentriculi regio calidè ante pastū oleis
ex cotoneis, & mastich. æquis portionibus mistis. Lien-
teria à paralyti neruorum & uillorum uentriculi, à cau-
sa externa interdum oritur, ut à frigore uehementi: cum
quis loca niuosa præterit, contingit uentriculum ita re-
solui,

DE MORB. INTER. CVR.

solui, ut neque dolorem sentiat, neque gravitatem, uig-
eius retentrice resoluta assumptos cibos celeriter deij-
ciat. Curabitur si conseruæ acori col. drac. ij. manè, & ue-
speri duabus horis ante pastum sumantur per aliquot
dies. Aut si laborans z. i. assæ fœtide in quinque pilul. ex
melle, partitam ieiunus dies aliquot manè deuoret. Dein
de uentriculum oleo nard. calidè ante pastum manè et ue-
speri inungat. Lienteria si à nimio cibo fuerit, minu-
tur cibus. Si à præpostera ciborum ingestione, corriga-
tur. Si à phlegmone uentriculi, quam indicat tumor in re-
gione uentriculi, curetur phlegmone.

COLICI DOLORIS CVRA.

tio. Cap. XII.

Sign. Oritur hæc passio interdum à pituitosis humoribus
in Coli membranulis subsidentibus. Scui adsunt do-
lores illis in partibus, ubi Coli situs est, quasi enim tundi,
& perforari intestinum sentitur. Nausea, & uomitus
urgent, cuomunturq; pituitosa quædam, atque corru-
pta. Retinentur excrementa, ut ne flatus quidem, ne-
que ructus excerni queat. Si quid autem ab aluo deiici cõ-
tingat, id flatuosum quodammodo est, & sæpenumero
aquæ supernatare consuevit, similem habens bubulo ster-
cori consistentiam. Sæpenumero etiam ueluti circuire ui-
detur dolor, atque plurima loca occupare, qui modò in
hac, modò in illa parte uehementior sit. Oritur interdum
hic dolor à flatulentis spiritibus, quibus nō patet exitus.
Interdum à fæcibus induratis. Nonnunquam à uermibus.
Aliquando etiam à coli phlegmone. Si à pituitosis hu-
moribus fuerit, foris admoucantur mitigantia dolorem,
atque interea infundenda enemata parentur. Fiat igi-
tur

tur hanc in modum. Recipe foliorum chamæmeli, meliloti, maluarum, helxines, ana M. i. seminum lini & fœnogr. ana ʒ. ii. Decoquantur in s. quantitate aquæ, eoque decocto foueatur locus doloris. Deinde ungatur oleis chamæmeli, anethi, de lilio, æquis portionibus mistis. Post hæc primum injiciatur enema blandum, non acutum, ad emolliendas fæces, hunc in modum. Recipe maluarum, althææ, linozostidos, betæ, helxines, ana M. i. seminum lini, & fœnogr. ana ʒ. ii. ficus x. florum chamæmeli, & meliloti, ana P. i. Decoquantur in s. q. iuris decoctorum omasorum ad tertias: accipiatur iuris decocti sesquilibra, cascum melle, saccha. rub. ana unc. i. mellis despumati. sesquiuncia, olei communis unc. iii. salis parum. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum injiciatur semel, atque iterum, donec fæces educantur. Quibus eductis, si dolor uehemens sit, mox sequens infundatur. Recipe olei chamæmeli, olei anethi, ana lib. ʒ. uim optimi rubri, aut Aruifii. unc. ii. fiat enema, quod iniiciatur, ut dictum est. Sequens quoque non multò post injiciendum ad euacuandam pituitosam materiam, doloris causam.

Recipe helxines, althææ, linozostidos, an. M. i. origani, calaminthæ, an. M. ʒ. centaurii minoris M. i. seminũ anisi, rutæ, fœniculi, ana ʒ. ii. florum rorismarini, melilo. chamæmel. ana P. i. ʒ. medullæ cnici drach. vi. Decoquantur in s. q. iuris decoctorum omasorum, usque ad dimidii consumptionem. accipiantur iuris decocti lib. i. ʒ. cascum melle saccha. rub. ana ʒ. i. mellis anthosati unc. i. ʒ. diaphœnici drach. vi. oleorum chamæmeli, & rutæ, ana ʒ. i. ʒ. salis fossilis drac. i. ʒ. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum immittatur. Hocq; enema sæpe infundendum

DE MORB. INTER. CVR.

dendum ad perfectam usque curationem. Materia uerò si à superioribus partibus in intestina decumbat, hunc in modum uacuetur. Recipe diaphœnici ʒ. vi. adiecto saccharo fingatur bolus, qui hora quarta matutina sumatur. Locus autem doloris, in quem materia decumbit, foueatur sequenti fotu. Recipe helxines, origani, calaminthæ, althææ, ana M. i. scminum rutæ, anisi, & fœniculi, an. ʒ. ʒ. florum chamæmeli, meliloti, roris marini, ana P. i. & dimidiatum. Decoquantur in s. q. aquæ, locus dolens decocto foueatur, ut dictum est. Sequentibus deinde oleis ungatur. Recipe olei rutæ, olei laurini, olei de lilio, olei chamæmelini, ana ʒ. i. Miscantur, fiatq; ut dictum est. Præterea utatur ægrotans diacymino, aut diagalanga, aut aniso condito: sumatq; quotidie ante pastum tessellam unam. Qua deglutita, bibat parum uini meri. Colicus dolor si à flatibus fuerit, primum iniiciatur blandum enema. feces emolliens, quale paulò antè est traditum. Deinde sequens iniiciendum ad flatum dissipandos.

Recipe olei rutæ lib. i. fiat enema, quod infundatur. Cucurbitula quoque umbilico affigatur, ibiq; per horam hæreat. Si cum flatibus humor quoque mistus sit, principio ad doloris mitigationem sequentia commodè fient.

Recipe milij partes tres, salis communis partem unā, florum chamæmeli P. i. Milium, & sal torrefiant, non flores chamæmeli. deinde sacculis duobus imponantur, qui calidè alter post alterum uentri admoueantur. Colicus uerò dolor, si à fecibus induratis obortus sit, primum superius tradito enemate blando feces emolliente utemur, sequentem deinde bolum sumet ægrotus per horam ante pastum. Recipe cas. recens extractæ unc. i. pul.
anisi

anisi ʒ. i. ʒ. adiecto saccharo fingatur bolus, qui sumatur, ut dictum est. Colici uerò doloris si uermes in causa sint, præsijs in Appetentia Canina à uermibus traditis, curatur. Colicus dolor à phlegmone si contingat, omnium est grauißimus, transitionem enim in Ileon minatur. Eo affectis interni feruoris sensus inest, cum febre: urina, stercusq; retinentur: sitis adest, & nausea, quam uomitiones potissimum bilis sequuntur, sed nihil inde malum leuatur. Principiò enemata feces emollientia infundēda, sumendaq; & admouenda repellentia. In incremento, dissoluentia aliqua cum repellentibus miscenda: in progressu augeantur dissoluentia. In fine status, & declinatione, pura dissoluentia exhibeantur.

ILEI CVRATIO. Cap. XIII.

V Arijs ex causis hoc malum grauißimos, ac lethales in tenuibus intestinis inferens dolores suboriri potest. Interdum enim ex cōtinua ciborum corruptione contrahitur, ac cruditate, præcipue uerò ex pinguibus carnibus, quæ corruptæ, & retentæ in tenui intestino obstructionem efficiunt. Ex frigore quoque uehementi constringente, atque excrementa retinente. Ex aquæ etiam frigide potione si multa à sudante præsertim fuerit epota. Is quoque interdum contingit, quibus in scrotum intestinum cum stercore delapsus est. Atque interdum à tumore frigido, in tenui intestino præter naturam suboritur. Magna uerò ex parte, uel ab inflammatione, uel ab obstructione aridi stercoris huiusmodi tenuium intestinorum affectus oritur. Nonnunquam & à pituita frigida, à Praxagora uitrea appellata, in sublimioribus intestinis retenta, quæ geminam ob causam uehementem dolo-

Cause.

Q

rem

DE MORB. INTER. CVR.

rem excitat, ob intemperantiam frigidam, et corporum quibus continetur, tensionem. Longus quoque hic dolor est, quòd difficulter is humor uacuetur. Ileo senes raro tentantur, si tamen acciderit, ferè nunquam cõualefcunt. Pueri, quibus familiare malum est, naturalis humiditatis beneficio facilè euadunt. Accedit hoc malo laborantibus tumor quidam eminens in tenui intestinorum parte, ut uideatur intestinum ad chordæ similitudinem conuolutum. Adsunt ructus inanes, dolorem nihil leuantes, murmura intestinorum, perfecta cohibitio & stercoris, & flatuum, præsertim cum est morbus in statu. Nihil enim tunc emittitur, nisi fortè id quod ante hunc dolorem iam erat in colo. Vomitionibus grauitè cruciatur, maloq; intenso stercus quoque euomere conspiciuntur. Non tamen propriè stercus est, quoniam quæ excernuntur stercoris formam non habent antè quam peruenerint ad intestinum rectum, nec uerisimile est ab eo ad uentriculum stercus remeare. Cæterum cibus in superioribus intestinis corrumpitur, qui corruptus grauitè olet, cumq; euomitur, ob graueolentiam stercus uidetur. Cum uerò eo usque morbus processit, ut uomitu stercori similia eijciantur, uix unquam aliquis potuit sanus euadere. Si ab inflammatione intestini fuerit, curandi rationem ab enematibus aluum mollientibus auspicabimur, hunc in modum. Recipe hordei Manip.ß. uiolarie, maluarum, altheæ, ana M.i.ß. Decoquantur in iure decoctorum omasorum, accipiantur iuris decocti lib.i.ß. cas. recens extractæ, saccha. rub. ana unc.i. mellis uiolacei unc.i. olei uiol. unc. iij. fiat enema, quod ante pastum injiciatur. Si nihil operetur, sumatur potio sequens. Recipe cas. recens

cens extractæ 3.i. serapij uiolacci 3.ß. Cōmunis medicinarū decocti, quantitate sufficienti, fiat potio, quæ sumatur horis tribus, aut quatuor ante pastū, si tanta tēporis opportunitas fuerit, alioqui per horā ante pastum sumi potest, siue sit ante prandiū, siue ante cenā. hora autē dimidiata post sumptū pharmacū, rursum enema prædictū infundatur. Quo effuso, si quicquā & ipsum, et potio effecisse uisa sint, incidatur uena interior cubiti, qui est è directo partis grauius affectæ. sanguisq; pro plenitudine, & uiribus detrahatur. Phlegmone deinde curetur affixis cucurbitulis cū scarificatu per ambitū partibus inflā matis, admotis etiā extrinsecus quæ dolorē leniunt, atq; alijs præsijs, quæ cæteris inflā mationibus conducunt. Ileos uerò, si à tumore præter naturā frigido, putā oedemate fuerit, eius quoq; curationē ab enemate aluum molliente exordiemur, hunc quidem in modum. Recipe maluarū, althææ, helxines, betæ, an. M. i. seminum lini, & fœnog. an. 3. i. ß. foliorum chamæm. & melilo. an. P. i. Decoquantur in iure decoctorū omasorū. accipiātur iuris decocti lib. i. ß. cas. 3. x. (ad ualidē mollificādū) saccha. rub. 3. i. mellis despumati 3. i. ß. olei chamæm. 3. iij. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum immittatur. Si nihil operetur, sumatur potio sequens. Recipe hiera simpl. Gal. 3. iij. diaphœnici 3. ij. mellis ros. 3. ß. communis medicinarū decocti q. s. fiat potio, quæ sumatur ad aurorā. Duabus post horis sequens enema iniiciatur. Recipe helxines, maluarum, betæ, linozostidos, an. M. i. origani, calaminthæ, an. M. ß. seminum lini, & fœnogr. an. 3. i. ß. seminum anisi, & fœniculi, an. 3. ij. florum chamæmeli, & melilot. an. P. i. Decoquantur in iure decoctorū omasorū.

Q

2

forum.

DE MORB. INTER. CVR.

forum. accipiatur iuris decocti lib. i. β . cas. recens extra-
 ctæ unc. i. β . hieræ Gal. diaphœnici, an. unc. β . mellis rosa.
 col. unc. i. β . olei chamæmeli unc. iij. salis sesquidrachmam.
 commistis omnibus fiat enema, quod iniiciatur, ut dictū
 est. Et balanis ex melle, sale, & stercore muris, compo-
 sitis, uti licebit, longitudinis quidem decem digitorum, ut
 penitius uim suam immittant. Remedia topica inter ini-
 tia statim adhiberi possunt, hunc in modum. Recipe
 olei chamæmeli, ol. ros. ana unc. i. β . Miscantur, inungan-
 turq; locus doloris calidè diebus tribus, aut quatuor. De-
 inde solo oleo chamæmelino, addendo in progressu oleum
 de lilio. Ileos si ab humore pituitoso frigido, ut dictum
 iam est, contigerit, interea dum enemata post dicenda, et
 potiones parabuntur, sorbeat egrotans iura pingua, ut
 ius galli antiqui pinguis decocti, atque id genus alia. Ac
 locus dolens sequenti fotu foveatur. Recipe helxines,
 maluarum, chamæmeli, meliloti, ana M. i. seminum lini,
 & fœnogr. ana unc. i. β . Decoquantur, spongiaq; in deco-
 cto madefacta, & expressa foveatur locus doloris, dein-
 de ungatur unguento sequenti. Recipe unguenti dial-
 theæ unc. iij. butyri recentis, aut loti, axungie gallinæ, et
 anseris, ana \mathfrak{z} . i. β . olei chamæmeli unc. ij. His commistis
 ungatur locus doloris calidè post fotum. Enemata deinde
 infundantur. Recipe cas. recens extractæ drac. x. sac-
 char. rub. unc. i. mellis despum. unc. i. β . olei chamæmel. ol.
 anethi, ana \mathfrak{z} . i. β . cum communi enematum decocto, adie-
 ctis carycis pinguibus x. seminum lini, & fœnog. ana \mathfrak{z} .
 i. florum chamæmeli, et meliloti, ana P. i. fiat enema. quod
 infundatur. Si nihil operetur, sumatur potio sequens.

Recipe elect. indi maioris, diaphœnici, ana \mathfrak{z} . ij. cas. re-
 cens

cens extractæ unc. i. mellis rosacei col. unc. β. communis
 medicinarum decocti q. s. fiat potio, quæ sumatur hora
 quinta matutina. Duabus post horis sequens iniiciatur
 enema. Recipe helxines, maluarum, althææ, ana M. i.
 origani, calaminthæ, centaurij minoris, an. M. semissem:
 seminum anisi, cari, & fœniculi, an. ʒ. ij. seminum lini, et
 fœnogr. ana unc. i. seminis rutæ ʒ. iiij. florum chamæmeli,
 & meliloti, ana P. i. Decoquantur in s. q. aquæ, donec di-
 midium absumatur. accipiantur iuris decocti sesquilibra,
 cas. recens extractæ, sacchari rub. ana unc. i. elect. indi ma-
 ioris drac. vi. mellis anthosati sesquiuncia, olei rutæ, olei
 chamæmeli, ana unc. ij. salis communis drac. ij. Commistis
 omnibus fiat enema, quod post potionem prædictam dua-
 bus horis infundatur. Ileos si ab obstructione aridi ster-
 coris in tenui intestino, aut à flatibus contigerit, post al-
 uum emollientia enemata iniecta, mox immitatur supe-
 rius proximè dictum. Ileos si ab insalubri cibo fuerit,
 ut à fungorum, aut similibus esu, uomitus confestim pro-
 uocetur hunc in modum. Recipe seminis raphani, se-
 minis atriplicis, seminis anethi, ana ʒ. β. Decoquantur, ac-
 cipianturq; iuris decocti unc. vi. oxymelitos simpl. sesqui-
 uncia. Misceatur, & tepidè bibantur. Vbi uomuerit labo-
 rans, sumat theriacæ ueter. ʒ. i. ex uino. Neque hoc semel
 fecisse satis sit, repetatur diebus aliquot proximè sequen-
 tibus. Cæterum in Ileo tantum ab hac causa uomitus ir-
 ritandus. Ilei hernia si in causa fuerit, primum tentan-
 dum est, ut decubitu sursum uersus uergente adornato,
 cruribus elatis, delapsum intestinum suo loco reddatur.
 Quod, de commodius fiat, fotu sequenti tumoris locus fo-
 ueatur. Recipe maluarum, althææ. ana Manip. ij. semi-

DE MORB. INTER. CVR.

num lini, & fœnogr. an. ʒ. iij. Decoquantur, eoq; in decocto spongia molli immersa, & expressa, fotus fiat, manus deinde leniter retrudatur. Sequentia deinde ad integram relaxationis curationem fiant. Recipe conseruæ ros. antiquæ, conseruæ symphyti, corticis citri saccharo conditi, ana unc. i. utriusque symphyti, iacæ albæ, iacæ nigræ, ana unc. ʒ. mastich. ʒ. vi. limaturæ chalybis ʒ. ij. Miscuantur, adiectoq; serapio myrtheo fiat elect. molle, de quo sumantur drachm. ij. horis matutinis ante pastum per dies triginta. Sequens deinde admoueatür emplastrum. Recipe emplastri contra rupturam, emplastri de mastiche, ana unc. iij. boli Armeniæ unc. ʒ. iacæ albæ, & nigræ, ana ʒ. iij. lapidis magnetis unc. iij. Miscuantur, adiectoq; oleo mastich. fingatur emplastrum, quod relaxationis loco admotum subligaculo retineatur, nec ante diem decimum soluatur. decimo quoque die soluetur, & mutetur, simili sed recenti appposito. hæreat autem illi loco emplastrum, modo tamen prædicto mutandum, dies triginta. Quoniam autem aluo plerunque sunt adstricta, enematibus tamen non est ducenda, sed pilul. sequentibus. Recipe pil. de bdel. pil. aleph. ana. drac. ij. excipiantur melle rosa. finganturq; pil. vi. è drachma, de quibus sumantur tres per horam ante coenam semel, aut bis in hebdomada. Plura posterius in relaxationis dydymi curatione dicentur.

TINESMI CVRATIO.

Cap. XIIII.

signa. **H**oc malo correpti assidua egerendi cupiditate tenentur, nihil tamē, aut certē parū deiiciunt suntq;
causa. ea quæ deiiciuntur cruenta, aut muccosa. Multiplex huius

ius

ius mali causa esse potest, frigiditas: obstructio à sterco-
re in cæco intestino indurato: hulus, atque inflammatio
in recto intestino suborta, pituita salsa: aut uitrea humo-
res acres, & biliosi: de quibus omnibus suo loco dicitur.

Si à frigidityte huius affectionis origo sit, quod ex agro Curatio.

tantis sermone cognitu est facile, quoniam nimirum fri-
gus nimium pertulerit, aut in frigida diutius commora-
tus est, aqua, aut res frigidas podice attigit, ut qui diu su-
per saxum frigidum sedit, curatio ab enematum iniectione
inchoanda. Primum igitur sequenti enemate aluus
ducatur. Recipe maluarum, altheæ, linozostidos, ana
Manipul. i. ß. chamæmeli Pugil. ij. seminum lini, & fœno-
gr. ana ʒ. i. ß. Decoquantur in sufficienti quâtitate aquæ
ad tertias, accipiantur iuris decocti lib. i. cas. recens ex-
tractæ ʒ. i. benedictæ ʒ. ß. olei communis ʒ. iiij. Commistis
omnibus fiat enema, quod infundatur. Eoq; eiecto, et fæ-
cibus eductis, sequens iniiciatur. Recipe olei rutæ ʒ. iiij.
olei chamæmeli: & anethi ʒ. i. ß. Commistis omnibus fiat
enema, quod immitatur, diuq; retineatur, ut calfaciat.

Anus deinde & foueatur, & ungatur hunc in modum.

Recipe helxines, maluarum, origani, calaminthæ, an.
Manip. i. ß. seminum anisi, cari, fœniculi, ana unc. ij. se-
minum lini, & fœnogr. ana unc. i. ß. Decoquantur, inq;
decocto immerso spongia, & expressa, foueatur anus
calide. Aut harum rerum aucta quantitate, decocti
fumus per anũ recipiatur, collocato egroto in cathedra
perforata, decoctoq; feruente supposito. Aut in eo deco-
cto umbilico tenus sedens consistat, sic tamen, ut podice
nihil præter decoctum attingat. Deinde ungatur oleis
sequentibus. Recipe olei laurini, olei de spica, olei cha-

DE MORB. INTER. CVR.

mamelini, an. ʒ. i. ʒ. his commistis, & calidis irrigentur, & foueantur pecten, inguina, inter foemineum, & partes ano uicinae posteriores cum ano. Tinefimos ab obstructione à stercore indurato graui distentionis sensu, etiam circa inum uentrem, cognoscitur, curetur enematibus emollientibus, fotibus, & unctionibus hunc in modum.

Recipe maluarum, althææ, linozostidos, ana M. i. ficus pingues xij. seminum lini, & fœnogr. ana ʒ. iij. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias, accipiantur iuris decocti lib. i. ʒ. ca. recens extractæ ʒ. i. ʒ. mel. uiolacei ʒ. ij. ol. communis ʒ. iij. Commistis omnibus fiat enema, quod ante partum iniiciatur. Repetatur, donec stercus eductum fuerit. Nihil autem, quod acre sit, enematibus admisceri debet: acria enim feces magis exiccant, quæ mitioribus, & lenientibus tantum enematibus educere oportet. Recipe maluarum, althææ, ana Manip. i. ʒ. seminis lini libr. ʒ. Decoquantur, in eoq; decocto sponsia immersa, & expressa foueatur uentris pars anterior, & posterior.

Recipe olei amygdal. dul. butyri recentis, ana unc. i. ʒ. unguenti dialthææ, unc. iij. Misceantur, ungaturq; uentris pars posterior, & anterior, circa renes, & anum, post fotum. Purgantia autem medicamenta ante stercoreis eductionem sumenda non sunt, quod inde summum ægrotanti exitium immineat, attractis nimirum aliunde, & ex uniuerso corpore ad priorem stercoreum copiam excrementis. Tinefimus si ab hulcere in ultimo intestino fuerit, & uideri possit, lauatur decocto hordei, aut aqua mulsa: ungatur deinde unguento albo Rhafis, cui capbura sit addita, præsertim si hulceri inflammatio copulata sit: quæ ex recti intestini tumore, doloreq; grauati-

uo, unà cum febre cognoscitur. Aliàs statim à lotionē li-
 natur hulus sequentibus. Recipe muccaginis gummi
 tragacanthæ, & Arab. ana unc. ij. cerussæ, plumbi, ana
 unc. ß. aloes drach. ij. Misceantur, linaturq; ut dictum
 est, locus hulceris. Si uerò hulus non appareat est in in-
 testino altius lateat, quod ex purulentis, & saniosis, quæ
 excernuntur, ac pungentis sensu in ano cognoscitur, se-
 quens inijciatur enema. Recipe decocti hordei, aut
 aquæ mulsæ, si non sit ardor unc. vi. mellis rosacei col. 3.
 i. ß. his commistis fiat enema, quod inijciatur frequenter,
 donec hulus puris sit expers, nihilq; de eo exire uidea-
 tur. Tunc autem sequens infundendum. Recipe gal-
 larum, rhois obsoniorum, rosa. rub. orizæ torrefactæ,
 ana Manipul. i. Decoquantur in aqua chalybata, aut plu-
 uia. accipiatur iuris decocti unc. xvi. boli Armeniæ. sang-
 draconis, mumie, ana 3. ij. his cōmistis fiat enema, quod
 infundatur ante pastum, post superioris eiectionem.
 Præterea linamentum prædicto unguento imbutum in
 anum, in balani morem immittatur. Tuncsmus à pitui-
 ta frigida, uiscida, aut uitrea si ortus sit, quod ab his, quæ
 egeruntur cognoscere licet, primùm inijciantur enemata
 mitia, & lenientia, stercori educendo accommoda, quo-
 rum formulæ ex superiùs traditis sunt petendæ, deinde
 infundatur sequens. Recipe helxines, maluarum, bras-
 sicarum rub. ana M. i. furfuris frumenti M. ß. seminum
 lini, & fœnogr. an. 3. i. ß. seminum anisi, & fœniculi, an.
 3. ij. florum chamæmeli, et meliloti, an. P. i. Decoquantur
 in s. quantitate aquæ, usque ad dimidij absorptionem ac-
 cipiantur iuris decocti lib. i. ß. cas. recens extractæ. 3. i. be-
 nedictæ. 3. ß. mellis rosa. col. 3. ij. olei com. 3. iij. Commistis

Q 5 omni

DE MORB. INTER. CVR.

omnibus fiat enema, quod ante pastum immittatur, eoq;
sepe utendum. Præterea fotibus, suffitibus, & unguen-
tis dictis in tinesmo à frigiditate, utendum. Hac autem
Tinesini specie plerunque laborant, qui natura pituito-
si sunt. Quare si pituita toto in corpore abundare uidea-
tur, à uomitu, si laborans uomere possit, eius uacuatio
aspicienda, deinde concoquenda, & euacuanda hunc in
modum. Recipe oxymelitos simpl. mellis rosacei col.
serapii adianti, ana ʒ. i. ʒ. stillatitiorū liquorum, fœnicu-
li, absinthii, apii, ana ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuno per
triduum bibantur diluculo. Recipe Aromatici rosa. ʒ.
ʒ. utatur cum serapiis. Recipe diaphœnici ʒ. ʒ. adie-
cto saccharo fiat bolus, qui sumatur hora quarta matuti-
na. Aut dissoluatur in stillatitio liquore absinth. adie-
cta mellis rosacei ʒ. ʒ. fiat potio, quæ sumatur hora quin-
ta matutina. Præterea in sequenti balneo lauetur. Re-
cipe pseudonardi, pulegij, origani, calaminthæ, ana Ma-
nipul. i. ʒ. foliorum lauri M. ʒ. florum chamæmeli P. iij.
Decoquantur, in eoq; decocto umbilico tenus lauetur ca-
lide ante pastum. Aut huius decocti fumum per anum re-
cipiat, in cathedra perforata sedens. Eodem decocto
foueantur pecten, inguina, inter fœmineum, anus, par-
tesq; uicinæ, manè, & uesperis: sequentibus deinde oleis
ungantur. Recipe olei rutæ, olei laurini, olei spicæ,
olei chamæmeli, ana ʒ. i. ʒ. Misceantur, fiatq; ut dictum
est. Tinesmus ab humoribus biliosis, aut quouis alio
humore acri, quos ea, quæ excernuntur satis demon-
strant, si quempiam affligat, cauendum astringentia ad-
mouere, etiam si species aliqua fluxus sanguinis uidea-
tur. Enemata primum quæ sequuntur iniiciantur.

Recipe

Recipe decocti hordei ℥.x. vitellos duos ouorum, Cō-
misceantur, fiatq; enema, quod ante pastum inijciatur. Si
uerò ardor uehemens percipiatur, sequens inijciatur.

Recipe decocti hordei ℥.vi. succi plantaginis subsiden-
do depurati ℥.iij. mucraginis psyllij in stillatitio rosa. li-
quore extractæ ℥.ij. olei rosa. ℥.ij. ℞. (mitigat ardorem.)
Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum im-
mittatur. Extrinsecus autem hæc admoueantur. Re-
cipe maluarum, althææ, uiolariæ, florum, & foliorum
uerbasci, ana M.i. seminis lib.℞. Decoquantur, in aqua,
eoq; in decocto lauetur ægrotus umbilico tenuis: aut spon-
gia in eo immersa foueatur anus calidè: aut in cathedra
perforata sedens supposito eo decocto feruenti fumum
per anum recipiat. Quæcunque in Tinesmo administrā-
tur, calida esse debent, quamuis à materia sit calida. Dein
de sequenti unguento ungatur. Recipe ol. ros. ℥.ij. olei
nymphææ, mucraginis psyllij in stillatitio rosarum liquo-
re extractæ sesquiunciam. his commistis ungantur ingui-
na, pestes, inter fœmineum, anus partesq; illi uicinæ. Bi-
lis autē si in uniuerso corpore abundare uideatur, conco-
quatur, deinde euacuetur hunc in modum. Recipe serapij
de acetositate citri, serapij de succo oxalidis, serapij
de riber, an. ℥.i.℞. stillatitiorum liquorū nymphææ, inty-
bi satiui latoris, oxalidis, an. ℥.iij. Misceantur, fiatq; zu-
lapium depuratum, & adiectis santalo: citreorum. ℥.ij.
fragrantius reddatur. Eo ieiunus ægrotus utetur manè p-
triduum. Repetatur & altero triduo, si materia nō sat co-
cta uideatur. Deinde uacuetur. Cauendum autem ab acri-
bus, & astringentibus medicamentis. Recipe rhab. sclæ-
cti ℥.ij. macerētur in stillatitio liquore intybi satiui latio-
ris

DE MORB. INTER. CVR.

ris horis. xij. deinde exprimatur, serapij uiolacei 3.ß. stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris, & oxalidis q.s. Commistis omnibus fiat potio, quæ sumatur ad auroram. Aut fiat cum communi medicinarum decocto, adiecta oxiphœnicœ unc. 3.ß. Bilis uerò si uista appareat, huius in modum uacuetur. Recipe rhæba. selecti drachm. ij. myrobalano. cærulearum 3. i.ß. macerentur in stillatitiorum liquore intybi satiui latioris horis xij. deinde exprimatur, serapij uiolacei unc. 3.ß. stillatitiorum liquorum cicchorij, & buglossi. q.s. Commistis omnibus fiat potio. Si pituita sit salsa, pro myrobal. cæruleis, substituantur cæpulæ, aut empeliticæ.

ANI PROCIDENTIAE CVratio. Cap. XV.

Causæ.

A Causa interdum externa hoc malum oritur, ut à casu, aut percussione. Interdum uerò à resolutione aut imbecillitate à frigidityte, aut frigidis humoribus contracta: qui musculos obliquos sedem sursum reuellentes resoluunt, anusq; procidit. Aliquando fit à nimio conatu, in tinesimo à causa calida. Nonnunquam à phlegmone, ualdeq; tunc egressus tumet. Si à frigidityte recti intestini musculos resoluente hæc affectio fiat, uomitus in primis prouocetur, modis superius frequenter traditis: humor ille deinde concoquatur, medicamentis deinde lenibus uacuetur hunc in modum. Recipe serapij conseruationis acori, mellis rosacci col. serapij stœchados, ana 3. i.ß. stillatitiorum liquorum primulæ ueris, saluiæ, absinthij, an. 3. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Recipe diamoschi dul. 3.ß. utatur cum serapijs. Recipe pil. de hiera simpl. agar. in pastillorum forma

ormam redacti, ana ʒ.β. excipiantur stillatitio liquore
iluiæ, finganturq; pilul. v. quæ circiter x. aut xi. noctis
oram sumantur. Recipe conscrux acori col. theriacæ
eter. ana ʒ.β. Misceantur, & postridie mane sumantur,
x horis ante pastum. Corpore uacuato. sequenti enema
utendum. Recipe helxines, maluarum, altheæ, beto
icæ, melissophylli, ana M. i. seminum anisi, & foenicu
i, ana ʒ. iij. florum stœchad. Arab. florum roris marini,
lorum chamæmeli, ana P. i. Decoquantur in s. q. aquæ ad
tertias accipiantur iuris decocti lib. i. β. benedictæ unc. β.
nellis anthosati unc. i. β. olei chamæm. ol. rutæ, an. ʒ. i. β.
Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum injicia
ur: eoq; per interualla utetur. Extrinsecus deinde hæc
iant, quæ conferunt siue à frigidis humoribus tantum, ut
lictum est, siue etiam si in ano procidente inflammatio
fuerit, quæ propter tumorem prohibet ipsum in locum
uum impelli, ac reponi posse. Recipe primulæ ueris,
saluiæ, chamæmeli, balaustiorum, gallarum, rhois obso
niorum, florum, & foliorum uerbasci, corticis quercus,
foliorum pini, an. Manip. i. β. mespilorum Manip. i. De
coquantur in aqua chalybata, & uino astringente hoc
decocto calido lauetur anus cum exierit foras, aut fouea
tur, deinde sequenti puluere aspergatur. Recipe anti
monij, cerussæ, plumbi, rhois obsoniorum, gallarum, nu
cleorum nucum pinearum combustorum, thuris, mastic.
ana drac. ij. pul. bedegar. ʒ. iij. fiat puluis, quo anus insper
gatur, deinde intromittatur, post podex oleis mastich.
myrtheo, & costino æquis portionibus mistis ungatur,
fiatq; similiter quoties foras exierit. Emplastrum quo
que quatuor digitos longum admoueat, incipiendo ab
ano

DE MORB. INTER. CVR.

anorenes uersus. Hunc autem in modū paretur. Recip
emplastri oxycrocci unciam i. s. baccarum myrthi, gal
larum, mastiches, ana drach. i. s. Misceantur, & adie
ctool. costino subigantur, additis pul. bedeguar. drach
ij. fiat emplastrum, quo utendum, ut dictum est. Prætere
ægretus interdum in decoctum calidum prædictum con
scendat, in eoq; ad tempus immoretur. Ani procidentia
si à nimio, & uiolento conatu, ut in Tinesmo à causa ca
lida contigerit, primum enclata lauantiâ, quorum for
mulæ superius frequenter traditæ sunt, infundantur, in
seßione deinde utatur laborans, ex sequenti decocto. Re
cipe gallarum, balaustiorum, rhois obsoniorum, baccarū
myrt. ana M. i. s. foliorum plantag. Manipul. i. rosarū
rubr. M. s. Decoquantur in aqua chalybata, fiatq; ut
dictum est. Hoc etiam decocto sedes cum foras exierit
lauetur, aut foueatur, sequenti deinde puluere asperga
tur. Recipe cornu cerui usti drach. ij. s. antimonij
drac. ij. baccarum myrthi, gallarum, rhois obsoniorum,
ana drach. i. s. fiat puluis quo utendum, ut dictū est. Vbi
autem sedes hoc puluere aspersa fuerit, intronittatur,
anusq; deinde oleis rosacco, & myrtheo tepidis, æquis
portionibus mistis ungatur. Ani procidentia si à recti
intestini phlegmone fuerit, curetur, ut aliarum corpo
ris partium phlegmone.

HAEMORRHOIDVM CVRATIO.

Cap.

XVI.

Hæmorrhoides tripliciter dicuntur. Aut. n. de quin
que illis uenis, quæ circa anum terminantur, aut
de ea excrescentia, quæ circa uenarum illarum finem in
terdum nascitur, instar mori, uerrucæ, aut acini. Aut de
sanguinis

Sanguinis ex illis uenis fluxu. Venæ autem illæ interdum intumescunt, doloremq; non contemnendum inferunt, cæterum nihil, aut parum admodum sanguinis excernunt: atque hæ hæmorrhoides cæcæ dicuntur. Aliæ uerò hæmorrhoides apertæ nominantur, quæ nimirum certis quibusdam temporibus aperiuntur, sanguinemq; emittunt. Fiunt autem propter sanguinis copiã feculenti, & melancholici, quæ iecur ad ipsas reponit. Cum itaque cæcæ hæmorrhoides apparuerint, grauesq; in ano cruciatus excitauerint, potissimum dum stercus excernitur, adsitq; in uniuerso corpore plenitudo, poplitis aut maleoli uena incidatur. Alius quoque aut cas. aut iure pingui, aut brassicæ decocto mollienda, ne arida stercora cum excernuntur sua duritie eas ledant, doloremq; pariant. Adhibenda quoque quæ dolorẽ, ubi uehemens fuerit, mitigare possint, hunc in modum. Recipe maluarum, althææ, florũ & foliorum uerbasci, ana Mani. i. seminis lini unc. iij. limacum rubr. sine testa. 3. ij. florum nymphææ, Manip. ʒ. Decoquantur in aqua, ex quo decocto infusione utetur egrotans, aut eo calente foueatur anus: unguento deinde sequenti ungatur. Recipe olei de semine lini uncias. ij. olei de arācijs, aut persicorũ nucleis unc. i. olei nymphææ unc. ʒ. Adiecta cera fiat unguentum, quo post fotum hæmorrhoides ungantur. Quod si his dolor non mitigetur addantur croci gr. vi. opij ʒ. ʒ. Si uerò hæ hæmorrhoides, nunc quidẽ cæcæ, aliàs autẽ solitæ essent fluere, aperiãtur. Quod fiet, si exteriùs appareãt, pannoq; aspero, aut folio ficulno fricentur. Qua quidẽ fricatione si uoti cõpos non euaseris, admoueantur hirudines in arundine, hæmorrhoidi cui hirudinem adherere uis, prius sanguine

Causa.

Curatio.

DE MORB. INTER. CVR.

guine illita, ut eam ad se alliciat. Quæ ubi sanguine plena apparebit, sale aspergatur, & cadet. Si autem hæmorrhoidum tumor nondum planè subsederit, rursus hirudines admoueantur. Quæ si in loco cui adhæserunt, dolori aliquem reliquant, vitellus oui cum oleo rosaceo, aut violaceo (quod melius erit) loco dolenti apponatur. Si uerò hæmorrhoides intus lateant, ut neque fricari, neque ipsis hirudines admoueri possint, fingantur balani iustæ quantitatis ex duabus partibus hieræ, & parte una myrrhæ, cum melle, quæ intromittantur. Aut radix iridis lana inuoluta, & hiera picra Galeni, atque myrrha oblita, cum melle, aut olco rut. intromittatur. Sint autem hieræ Gal: partes duæ, myrrhæ una. Quod si ex his balanibus dolor aliquis intrinsecus oriatur, mitigetur sequentibus. Recipe radicem brassicæ, aut betæ, inuoluatur gossipij laniagine, deinde luteo oui, oleoq; violaceo oblinatur, & intromittatur. Si cuiusdam Hæmorrhoides fluere cœperint, antea insolite fluere, sitq; ei fluxus ille molestus, eas medicamentis tam sumptis, quam admotis reprimat, hunc in modum. Recipe galbani drachm. ij. dissoluantur in stillatitio liquore plantag. & sumantur manè, id per dies aliquot continuos repetendo. Si laborans delicatus fuerit, sumat tantum 3. i. Extrinsecus autem hæc fiant. Recipe antimonij 3. ij. cornu cerui usti, corallij rub. thur. ana 3. ss. olei myrthei q. s. Misceantur, & Hæmorrhoides his commistis linantur. Si uerò fluere essent solite, relinquatur aperta una. Hæmorrhoides autem apertæ, si moderate, certisq; intervallis sanguinem fuderint, haudquaquam supprimendæ sunt: à magnis enim morbis, fereq; melancholicis spōtina hæc uacuatio ægrotum

tum uindicat. Neque enim laterum dolore, neque pulmonis inflammatione, neque depascenti hulcere, neque furunculis, neque terminthis, neque lepra, neque uiti-
lignibus corripuntur Hemorrhoides habentes. Siue-
rò immodicè flueret sanguis, uacuationisq; copia uires
deijceret, sanguisq; iam pro crasso, & nigro melior fun-
deretur, supprimendæ confestim sunt: ne immodica
euacuatione hepate refrigerato, aqua intercutem se-
quatur. Cibus autem in huius affectus curatione astringen-
tibus non est utendum, ne ab his aluo astricta, in ege-
rendo conatus maior fiat, qui fluxum maiorem excitet.
Reuulsio per sanguinis missionem, lenem tamen, si uires,
& ætas permiserint, conferet. Incidatur igitur uena in-
terior dextri cubiti, detrahatur sanguis ad unc. ij. Cucur-
bitulæ hepatis regioni, & lienis ante pastum affigatur:
Sanguine autem, qui per hæmorrhoidas euacuatur, bi-
lioso apparente, qui quidem sanguis, quoniam tenuior,
ad fluxum opportunus est, hunc in modum emendetur.

Vicius
ratio.

Recipe serapij de succo oxalidis, serapij rosa. de rosis
siccis, serapij ex cotoneis, ana unc. i. ss. stillatitiorum li-
quorum, oxalidis, plantaginis nymphææ, ana unc. iiij. Mi-
sceantur, & à ieiunio per triduum diluculo bibantur.

Recipe elect. trium santalo. 3. ss. ut atur cum serapijs.

Recipe rhabar. selecti drach. i. corticum myrobalan.
flauarum confricatarum ol. amygdal. dul. 3. iiij. oxyphœ-
nicon 3. ss. Macerentur in stillatio liquore plantag. ho-
ris xij. deinde exprimantur, adiectisq; serapij rosacei pur-
gatorii de infusione rosa. 3. ij. fiat potio, quæ sumatur ho-
ra quarta matutina. Recipe conseruæ rosarum anti-
quæ 3. ij. boli Armeniæ lotæ in stillatio liquore ros. sco-

R rie

DE MORB. INTER. C VR.

rie ferri, ana ʒ.ij. myrobalanum unam embeliticam con-
ditam, seminum oxalidis, & intybi satiui latioris, an. ʒ.
ʒ. serapii conseruationis myrobalanorum conditarum
q.ʒ. fiat elect. molle, de quo sumatur instar castanea ma-
ne ante pastum. Extrinsecus hæc admoueantur. Reci-
pe balaustiorum, rhois obsoniorum, baccarum myrthi,
galla. ana. ʒ. i. ʒ. ossium dactylorum unc. iiii. terræ sigilla-
te, cornu cerui usti, boli Armeniæ lotæ in stillatitio li-
quore rosa. ana ʒ. iiii. succi ocimi q.ʒ. Commistis omni-
bus linantur Hæmorrhoides mane, & uesperis. Sanguis
autem qui funditur, si aqueus appareat, & frigidus, hūc
in modum uacuetur. Recipe mel. ros. col. ʒ. ii. serapij de
absinth. ʒ. i. serapij conseruatio. myrobala. empeliticarū
ʒ. i. ʒ. stillatitiorum liquorum absinthij, menthæ, buglos-
si, ana ʒ. iij. Miscantur, & à ieiuno per triduum dilucis-
sio bibantur. Recipe Aromatici rosa. ʒ. ʒ. utatur cum
serapijs. Recipe myrobalanorum cepularum, & empe-
liticarum confricatarum oleo amygdal. dulc. an. ʒ. iij. me-
dullæ cnici ʒ. vi. polypod. quer. ʒ. i. Macerentur in cōmu-
ni medicinarum decocto horis xij. deinde lento igni fricē-
tur, & colentur, adiectaq; mel. rosacei col. ʒ. i. fiat potio,
quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe cortic. ci-
tri saccharo conditi unc. iij. Sumatur drac. ij. quotidie ma-
ne ante pastum. Aut corticis citri loco sumat de serapio
absinth. quantum cochlearia duo capiunt. Aut tessellam
unam elect. solidi aromatici rosa. quibus alternis uti ma-
gis conducet. Cū uerò alius sua sponte excrementa, ut
conuenit, non deijcit, utendum sequentibus pilulis. Reci-
pe pil. de bdellio (laxant & constringunt) ʒ. ij. excipiane-
tur stillatitio liquore plantag. fingantur pil. xi. è drache-
ma,

ma, sumantur tres per horam ante coenam quoties expe-
dire uidebitur. Si cum fluxu dolor quoque adsit, ad eius
mitigationem scarabei, aut uermes, qui à centum pedū
numero appellantur, in oleo de semine lini contriti deco-
quantur, eo hæmorrhoides linantur. Inseßio quoque ex
sequenti decocto plurimum confert. Recipe foliorum
plantaginis, florum, & foliorum uerbasci, an. M. i. semi-
nis lini (mitigat enim dolorem) unc. ii. corticis malorum
punicorum, balaustiorum, rhois obsoniorum, baccarum
myrthi, ana M. i. ß. Decoquantur in aqua chalybata, &
uino astringente, fiatq; ut dictum est. Aut eo decocto fo-
ueatur anus, & mitigabitur dolor.

SVPPRESSIONIS MENSIVM

Curatio. Cap. XVII.

Menses plerunque quartodecimo etatis anno flue-
re incipiunt, paucissimis ante decimum tertium,
aut duodecimum: nonnullis post decimum quartum. Fur-
gatio autem hæc in quibusdam duobus, tribusve diebus
terminatur, pluribus quinque, in alijs ad septimū usque
diem perdurat. Desinit autem plerunque anno quinquage-
simo, in quibusdam ad annum quinquagesimum quin-
tum, in paucissimis ad sexagesimum extenditur.

Non purgantur steriles mulieres, nec grauide. Que Causæ.
se quoque uehementer exercent, aut calidioris sunt tem-
peramenti, aut longis ægritudinis laborant, ut quare-
tana, pthisi, hæctica, parum, aut nihil purgantur. Pin-
gues quoque, quòd uenas angustas habeant, & sanguinē
paucissimum, parum, aut nihil purgantur. Inedia quoq;
aut ciborum paucitas menses reprimat. Idem & multitu-
do, nā ciborū copia meatus obstruuntur. Quibus quoque

R 2 sanguis

DE MORB. INTER. CVR.

sanguis crassus est, & lentus, hæc parum, aut nihil purgatur: aut quibus sanguis per alia loca uacuatur, puta per nares, aut anum. Aliæ quoque immodicæ excretiones, ut per alui profluvia, aut uomitum, menses retinent. Ob peculiare uteri uitium, menses quoque interdum retinentur: uerbi gratia ob pinguedinis copiam, aut carnis excrescentiam, aut callum, aut cicatricem ex hulcere quod in utero anteceßit. Hæc enim omnia uasorum uteri ora obstruere possunt. Plerunque uerò menses supprimi contingit, aut à melancholico succo, aut à bile sanguinem asante, aut à pituita uenarum ora obturante.

Signa.

Quibus menses præter naturam retinentur, dolores circa lumbos, femora, collum, sinciput, & oculorum radices accidere solent. Corporis adest grauitas, nausea, cibi fastidium, & horridi quidam per uniuersum corpus discursus, quales ijs, quæ conceperunt, accidere solent. Urina interdum in nonnullis difficulter redditur, interdum planè supprimitur. Mensium suppressio si à pituita copiosa, & uenarum ora obstruente contingat, uidere est laborantem somnolentam, ad omnem motum segnè, colore candidam, plumbei quoque interdum coloris, pituitam assidue excreantem, & aliquando tuomentem. Urina quoque aquosa esse solet. Curatio à pharmaco materiam minuente auspicanda hunc in modum. Recipe pilul. de hiera simpl. pilul. de agar. ana drach. ß. Excipiantur stillatio liquore artemisiæ, finganturq; pilul. y. quæ circa noctis dimidium sumantur.

Aut sic.

Recipe cathol. unc. ß. diaphœnici, diacnici, ana drac. i. serapij adianti unc. i. communis medicinarum decocti q. s.

q. s. fiat potio, quæ sumatur hora quinta matutina. Materia deinde hunc in modum concoquatur. Recipe quinque radic. com. maceratarum in uino albo (acutum nocet utero) radicis erythrodani, radicis peucedani, ana unc. ß. chamædryos, chamæpitios, pulegij, nepetæ, melissophylli, ana Man. i. artemisiæ, thymi, ana Manip. ß. ciccrum rub. M. i. seminum anisi, apij, dauci, fœniculi, ana drach. ii. florum sambuchi, & rorismarini, ana P. i. ß. florum buglossi, & cirsii, ana P. i. polypod. quer. 3. i. Decoquantur in s. q. aquæ, tantisper dum dimidium absumat. accipiantur iuris decocti unc. xx. adiectisq; saccharo, & melle dulces reddantur, fiatq; serapium mediocriter coctum, quod depuretur, additisq; cinnamomi selecti, & cas. lignæ, ana drach. ii. suauiore & sapore, & odore reddatur. Eo utetur ægotans dies quinque appetente diluculo.

Aut sic.

Recipe serapij de rad. sine aceto, oxymelitos compositi, serapij, adianti, ana unc. i. ß. stillatitiorum liquorum artemisiæ, nepetæ, melissophylli, ana unc. iij. Misceantur. fiatq; zulapium depuratum, quod adiectis 3. ij. cinnamomi selecti, & 3. i. pul. diamoschi dulc. ori iucundius reddatur. Eo utatur ægotans per triduum diluculo. Si uero hoc zulapio absumpto, materia nondum planè cocta uideatur, repetatur & altero triduo. Recipe pil. foetid. 3. i. stillatitij liquoris nepetæ q. s. fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

Aut sic.

Recipe cathol. 3. vi. elect. indi maior. 3. iij. serapij adiut. 3. i. communis medicinarum decocti unc. iij. addendo

R 3 chamæ

DE MORB. INTER. CVR.

chamædryos, & chamæpit. ana tertiam partem M. i. fi
at potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

Aut sic.

Recip. turpeti optimi ℥. iij. zinzib. ʒ. β. salis fossili
gr. vi. sacchar. ʒ. ij. Commista puluerentur, iureq; decocti
rum cicerum rub. aut decocti pulli excepta, bibantur ho
ra quarta matutina. Recipe theriace ueter. tryphera
magnæ sine opio, an. ʒ. β. conseruæ buglos. ʒ. i. β. Miscean
tur, & postridie mane sumantur sex horis ante pastum
Quoniã autẽ unica uacuatione humor ille expurgari nō
potest, rursum igitur laborans mense proximo sequenti
uacuetur pharmacis proximẽ dictis repetitis. Post gemi
nã purgationem uno, atque altero die, sequenti balneo
lauetur. Recipe artemisiæ, melissophylli, nepetæ, cha
mædryos, chamæpitios, thymi foliorũ lauri, pseudonan
ni, roris marini, an. M. iij. chamæmeli, meliloti, florum ro
ris mar. an. P. iij. radices ualerianæ, radices rusci, radices
asparagi, radices apii, radices petroselini, an. ʒ. iij. semi
nũ lini, & fœnogr. an. ʒ. iij. florum sambuchi P. v. Deco
quantur in aquæ q. s. in qua lauetur egrotans, habeatq;
sedens eo in decocto sacculũ artemisiæ plenum super uē
trem inter umbilicum, & pectinem: decoctæ autẽ & her
bæ, & radices, in sacculũ magnum reponantur, super quẽ
dum lauatur sedeat. In eo moretur, si potest, horam. Ex
eo autẽ dum egreditur: ungatur uenter infra umbilicũ,
parsq; posterior ei opposita, & renes calido hoc unguẽ
to. Recipe olei de lil. olei amygdal. dul. butyri recentis,
medullæ cruris uituli, an. ʒ. i. β. muccaginis althææ, & se
minum lini, & fœnogr. an. ʒ. ii. ceræ parũ. Fiat unguen
tũ, quo ungatur partes dictæ, seq; mox in lecto cõponat,

ac

acumat theriacæ ueter. aut mithridat. trypherae magna sine opio, an. 3.ß. Aut iure cicerũ rub. & porri excepta bibantur. Atq; hoc, itidem et balneũ diebus quatuor, aut quinq; repetantur. Quod si in balneo lauare recuset, recipiat dicti decocti fumum per infundibulũ. His peractis, appetente tẽpore eruptionis Mensiũ incidatur Sophia pedis dextri, sanguisq; ad duas 3. detrahatur, aut tres ad summũ. Si uenã incidi nõ permiserit, cucurbitulae foeminibus, aut poplitibus cũ scarificatu affigatur. Si neque his perfectis Menses erumpant, pessis utendum hunc in modum paratis. Recipe theriacæ ueteris, trypherae magnæ sine opio, an. 3. ii. pul. myrrhæ, baccarũ iuniperi, an. 3. i. succo linozostidos excipiantur, cunctisq; panno lino raro impositis fingatur pessus, qui in uterũ demittatur, filo coxæ alligatus. Porro si pessus utero dolore induruerit, metrenchyta olei rosacei amurca, aut olei uiolacei iniiciatur. A bile autem, & calidiore temperatura, si Menses supprimatur, si ualetudinis tãtum habeatur ratio, nõ malũ; si uerò conceptionis, non item. Nam quantũ ad integram sanitatẽ attinet, præstat mulierẽ corpore ita esse desiccato, ut purgatione nõ egeat. Atqui id genus mulieres coitũ quidẽ appetunt, ceterũ non concipiunt. Non enim concipiunt, quæ non purgantur. Conceptionis igitur gratia, et has curare expedit. Cibo itaq; ac potu, et humidiore, & uberiore, has humectare oportet, bilẽq; minuire: cuius copia sanguinem interdum inflamat, aut incrasat, unde huius mali origo. Cõmoda igitur uictus ratione præscripta, leuis sanguinis missio fiat, incisa uena dextri cubiti interna, sanguine ad 3. ii. aut tres detracto. Concoquatur deinde humor, et euacuetur. Recip. serapii acetati

R 4 simpl.

DE MORB. INTER. CVR.

*simpl. 3. ij. oxymelitos simpl. 3. i. β. serapij adianti. 3. i. sti
latitiorum liquorum, intybi satiui latioris, artemisiæ, bi
glos. ana 3. iij. Misceantur, & per triduum à ieiuna dilu
culò bibantur. Recipe diarrhod. abb. 3. β. utatur cum
serapijs.*

Aut sic.

*Recipe quinque rad. com. maceratarum in aceto, ana
3. β. radicis ualerianæ 3. i. β. foliorum salicis, artemisiæ,
chamædryos, chamæpityos, nepetæ, buglossi cum rad. fo
liorum oxalidis, & intybi satiui latioris, ana M. i. semi
num petroselini, apii, dauci, ana 3. ii. quatuor seminum
frig. maiorum, an. 3. i. β. seminis intybi satiui latioris 3.
iij. florum sambuci, trium florum com. an. P. i. Decoquan
tur in s. q. aquæ, donec dimidium absumatur: accipiat
iuris decocti lib. i. β. serapii byzant. serapii acetati com
positi, ana 3. ii. sacchari ad dulcedinem inducendam q. s.
Commistis omnibus fiat serapium mediocriter coctum,
quod depuretur, adiectisq; 3. ij. cinnamomi selecti, & 3.
i. pul. diarrhod. abb. iucundiore & odore, & sapore red
datur. Eo utetur laborans ieiuno uentriculo circiter di
luculum, diebus quinque. Recipe cathol. 3. vi. elect. de
succo ros. 3. ij. compositionis hamech. 3. i. β. serapij uiola
cei 3. β. communis medicinarum decocti 3. iij. β. adiecta
quatuor seminum frig. maiorum, ana 3. i. fiat potio, quæ
sumatur hora quarta matutina.*

Aut sic.

*Recipe rhabar. selecti 3. i. β. polypod. quer. unc. β. spi
cæ nard. gra. v. Macerentur in sero caprino horis xii. De
inde exprimantur, adiectis cathol. 3. β. elect. de succo ros.
compositionis hamech, ana 3. i. serapij ros. purgatorii 3. i.
come*

LIBER TERTIVS. 133

communis medicinarum decocti ℥.iiij.℞. fiat potio, quæ sumatur ad auroram.

Aut sic.

Recip. pil. agreg. ℥.i. ex stillatitio liquore intybi sativi latioris fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Diebus post tribus, aut quatuor sequenti balneo laetetur. Recipe Artemisiæ, nepetæ, pseudonardi, foliorum lauri, thymi, ana Manip. vi. foliorum salicis, foliorum intybi sativi latioris, ana M. ii. rad. ualerianæ ℥.iiij. radicum apii, petroselini, fœniculi, ana ℥.ij. florum sambuchi P. v. Decoquantur in s. q. aquæ, in qua laboras laetetur manè, & uesperis ante pastum, in ea quantum uolet immorans, habens super pectinem sacculum artemisiæ plenum, sedens in dicto balneo super sacculum, eorum omnium, quæ decocta sunt, plenum. Idq; dies tres, aut quatuor repetatur. Cum autem è balneo egredietur, ungatur uenter inter umbilicum, & pectinem, parsq; posterior ex aduersum, & renum regio unguento sequenti.

Recipe mucaginis althææ ℥.iii. mucaginis seminis lini, & fœnogr. ana unc. i. ℞. olei amygdal. dulc. medullæ cruris uituli, butyri recentis, ana ℥.ii. Adiecta cera fiat unguentum, quo partes dictæ ungantur calidè. Eodè quoque tempore sumat tryphææ magnæ sine opio ℥.ii. conseruæ florum cichor. & adianti, an. ℥.i. ℞. Commista hæc, & iure cicerum rub. excepta in balnei egressu bibantur. His peractis, mox quoque à balnei exitu mittatur sanguis, ambabus sophenis incisis, altera post alteram, uno die interposito. Detrahantur ℥.ii. sanguinis, aut tres ad summum. Melancholicus humor, si in causa suppressionis Mensum fuerit concoquatur primùm, deinde euacue-

R s tur

DE MORB. INTER. CVR.

tur hunc in modum. Recipe oxymelitos simpl. serapij byzantini serapij de buglos. ana ʒ. i. ʒ. stillatitiorum liquorum, artemisiae, melissophylli, lupi salictarij, ana ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Recipe diamoschi dulc. ʒ. ʒ. utatur cum serapijs. Aut utatur apozemate dicto in detentione Mensium à bile, adiectis melissoph. buglos. cirsi, ana M. ij. polypod. quer. ʒ. i. epithymi. ʒ. ʒ. Quo utetur ægotas diebus quinque appetente diluculo. Deinde purgetur hunc in modum.

Recipe cathol. ʒ. vi. compositionis hamech. ʒ. iij. serapij de buglos. ʒ. ʒ. Communis medicinarum decocti. unc. iij. ʒ. adiectis epithymi ʒ. i. ʒ. folliculorum scennæ ʒ. ij. polypod. quer. ʒ. ʒ. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

Rec. theriacæ ueteris, trypheræ magnæ sine opio, an. ʒ. ʒ. conseruæ buglosi. ʒ. ij. Misceantur, & postridie mane sumantur sex horis ante pastum Balneo deinde, compositionibus, & unctionibus proxime dictis in retentione mensium à bile, utendum. Pessso quoque, qui hunc in modum paratur. Recipe trypheræ magnæ sine opio. ʒ. i. Myrrhæ. ʒ. ij. galbani, hammoniacci, ana ʒ. i. Excipiantur succo helxines, aut artemisiae, singaturque pessus ex panis lincoraro, qui filo coxæ alligatus demittatur in uterum. Vtilis autem hic pessus non solum retentis mensibus à melancholia, sed & à bile. Metrenchyta quoque aliquid de decocto proxime dicto, balnei causa parato, iniiciatur in uterum. Fiant præterea fricationes, & ligaturæ dolorificæ in extremitatibus inferioribus. Cucurbitulæ quoque fœminibus, & poplitibus, cum scarificatu affigantur.

REDVN

Menstrua purgatio tunc redundans, iustoq; largior esse censetur, cum ultra consuetum tempus effluit. Multis enim (ut diximus) ad duos, aut tres dies, quibusdam ad quintum, alijs ad diem septimum, paucissimis ad duodecimum usque extenditur. Immodicæ purgationes oriuntur interdum ob partus grandiores, cæterum hæ plerumque sua sponte cessant. Sæpenumero post abortus, uehemens excitatur profluuium, nec citra periculum. Magna uteri uasa si aperta fuerint, fluit quoque sanguis, sed confertim. Parua uerò si reclusa fuerint, sensim, nec magna profluit copia. Referantur autem interdum à sanguinis copia ad ora uasorum cum impetu irruente, præsertim si ipsa ora imbecilla sint. Aut à sanguinis acritudine ora uasorum erodente. Sanguis etiam si tenuis, calidusq; sit, tunicaq; oris uenarum rarefacta, sudoris instar transmittitur. Si ab erosionem oris uenarum contigerit, magno cum dolore effluit. Si cui mulieri **Menses immodice, præterq; naturam fluant, fædo colore conspicitur, pedes molli tumore inflantur, uiribus est imbecillis, cibum fastidit, sumptumq; male concoquit. Hic fluxus non semel, confertimq; sed paulatim astringendus. Quem si mulier bene ferre uideretur, non astringatur, Magna ex parte fluor hic immodicus, est à sanguinis caliditate, tenuitate, et acritudine. Curandi ratio ab humorum concoctione, et euacuatione exordienda, alio prius lenienti aliquo enemate ducta, si non (ut conuenit) excrementa deijcit, hunc in modum. Recipe cas. recens extractæ, sacchari rubri ana ʒ. i. olei uiolacei ʒ. iiij. salis parum, luris decocti quatuor**

Causæ.

Signa.

Curatio.

DE MORB. INTER. CVR.

tuor herbarum remollientium, prunis xij. additis, lib. i. ss. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum ini-
ciatur. Recipe serapij rosacei de rosis siccis serapii ex
cotoneis, serapij omphacini, aut de succo oxalid. ʒ. i. ss. sti-
llatitiorum liquorum rosarum, & plantag. ana ʒ. iij. Mi-
sceantur, & à ieiuna per triduum diluculo sumantur.

Recipe elect. trium santalo. ʒ. ss. utatur cum serapiis,

Recipe pruna damasc. x. mixorum, ziziphorum, ana
ʒ. ss. florum nymphae, florum uiolarum, florum bugloss.
an. P. i. Decoquantur in s. q. aquae usque ad dimidij con-
sumptionem: accipiantur iuris decocti ʒ. iij. ss. in quibus
horis xii. macerentur corticum myrobalano. flauarum
confricatarum oleo amygd. dul. ʒ. iij. manè lento igne fri-
centur, & colentur, adiectisq; rhabar. selecti puluerati
causa. ʒ. iij. (rhabarbarum infusum tantum soluit, ipsum au-
tem sumptum etiam astringit.) cas. recens extractæ. ʒ. vi.
serapii rosa. laxat. ʒ. i. fiat potio, quæ sumatur hora quin-
ta matutina. Recipe conseruæ rosa. antiquæ, conseruæ
symphyti, ana ʒ. i. ss. corallii rubri, lapidis hæmatis, ana
ʒ. ii. cornu cerui usti, mumie, ana drach. i. ss. (scoria fere-
ri non adiicienda, nam mulieres steriles facit) acaciæ,
hypocistidos, ana ʒ. iij. carniū cotoneorum condita-
rum saccharo, sine speciebus ʒ. iij. pul. corticis ouorum ʒ.
ii. serapio myrtheo excipiantur, fiatq; elect. molle, de
quo sumatur instar castaneæ parue, duabus horis ante pa-
stum manè, & uesperis. Quo deglutito, parum uini chaly-
bati mox bibatur.

Aut sic.

Recipe serapii myrthei, serapii ex cotoneis, an. ʒ. ii.
succu stercoris asinini recentis ʒ. iij. stillatitii liquoris
plane

plantaginis 3. vi. Misceantur, & à ieiuna per triduum diluculo sumantur. Repetantur, & altero triduo, si expedire uideatur. Extrinsecus autem hæc admoucantur.

Recipe olei myrthei, ol. mastich. ol. ex cotoneis, an. 3. ii. lapidis hæmatitis, corallii rubri, acaciæ, hypocistidos, ana 3. ii. mumie 3. i. cucularum glandium, balaustiorum, ana 3. i. ʒ. pul. corticis ouorum ʒ. iiii. adiecta cera fiat unguentum, quo ungatur uenter ab umbilico ad pectinē, & renum regio manē, & uesperī. Cucurbitulæ magnæ subter mammis affigantur ante pastum, ibiq; per horam hæreant fricentur brachia, uinculisq; excipiantur, crura quoque, ab alis, & inguinibus incipiendo. Crura tamen ualide ante pastum fricanda non sunt. Pessō denique utendum. Recipe micletæ, tryphæ, ana 3. i. ʒ. equiseti, acaciæ, an. 3. i. ʒ. spicæ nar. 3. ʒ. (sistit enim Menses) commista hæc linteo raro inuoluantur, finganturq; pessus, qui filo coxæ ligatus in mulieris pudenda immittatur. Renum præterea regio, uenterq; ab umbilico ad pectinem, si unguento comitissæ, sic enim appellari solet, ungantur, salubre erit. Inseßus quoque ex sequentium decocto saluberimus erit. Recipe polygoni, foliorum plantaginis, foliorum symphyti, balaustiorum, equiseti, an. M. iii. gal larum, rhois obsoniorum, cucullarum glandium, ana 3. ii. radicis symphyti unc. iii. rosarum rub. florum, & foliorum uerbasci, ana. M. i. ʒ. Decoquantur in aqua chalybata, aut aqua pluuiæ, in qua se ad umbilicum usque irriget. Balneum egressa ungat renes, & uentrem ab umbilico ad pectinem, partemq; posteriorem ei oppositam unguento paulò antè dicto, utaturq; elect. molli inibi tradito. Aut loco balnei, ipsius decocti fumum per infundibulum

DE MORB. INTER. CVR.

lum recipiat in uterum. Et quoties aluus sua sponte excrementa ut conuenit, non deiciet,umat drach. i. pil. de bdellio circiter xi. noctis horam. Id quod commodē facere licebit, semel aut bis in hebdomada.

FLVORIS MULIEBRIS CVRATIO.

Cap. XIX.

Contingit interdum mulieres nonnullas destillatione quadam diuturna laborare, cuius quidem destillantis humoris color, humorem in corpore superantem demonstrat. Est enim interdum rubens, et ueluti quædam sanguis sanies. Curabitur uenæ sectione, non semel, assatimq; sed repetitis uicibus facta, ut proluxio tempore auersio fiat. Vincula quoque extremitatibus corporis iniicienda. Ea denique omnia facienda, quæ fluxum in contrarium auertunt. Interdum uerò colore est pallido, ob exuperantem bilem. huic fluxui initio non resistendum, cæterum, ubi diutius persistens robur proster nere uidetur, medicamentis cholagogis superius crebrò commemoratis primum utendum, deinde reuulsioni incumbendum, non neglectis medicamentis astringentibus, atque abstergentibus. ob effluentis humoris acrimoniam: quorum formulæ ex superioribus proximis capitibus petende. Interdum autem et magna quidem ex partes is effluens humor albus est, aut serosus, pituitæ soboles, cui quoque fluori inter initia non resistendum, expurgante se corpore, et humorem illum ueluti à se alienum excernente. Vbi autem iusto plus perseuerat, laboransq; mulier decolor euadit, cibum fastidians, inter ambulandū difficulter spirans, oculis aliquando cum dolore, aliquando etiam sine dolore tumentibus, toti tunc corpori exice

exiccantia auxilia admouenda, quandoquidem hoc ma-
lum humidum est. Phlegmagogis deinde medicamentis
utendum, quoniam id quod efficit à pituita originem ha-
bet. Materia igitur primum concoquatur, deinde euacue-
tur hunc in modum. Recipe oxymelitos scillim, serapij
de radicibus, serapij de artemisia, an. \mathfrak{z} . i. β . stillatitiorum
liquorum artemisiæ, nepetæ, melissophylli, an. \mathfrak{z} . iij. Adie-
ctis cinnamomi selecti \mathfrak{z} . ij. pul. diamosch. dulc. \mathfrak{z} . ij. ori-
suavius reddatur. Misceantur, & à ieiuna diluculo per
triduum bibantur. Repetantur & altero triduo, si ma-
teria nondum satis cocta uideatur.

Aut sic.

Recipe radicis erythrodani, radicis cyperi, quinque
radicum com. an. \mathfrak{z} . β . artemisiæ, nepetæ, melissophylli, pu-
legij, cassuthæ, ualerianæ. ana Manipul. i. seminis fescu-
leos, seminis dauci, ana drach. iij. seminum anisi, cari,
foeniculi, ana drach. ij. sisymbrij, spicæ nardi (exiccant
humiditatem) ana drach. i. β . cicerum rubr. Manipul. β .
stachados, helichrysi, florum chamæmeli, & rorismar.
ana P. i. Decoquantur in s. q. aquæ donec dimidium ab-
sumptum sit. Accipiatur iuris decocti lib. i. β . adiecto sac-
charo dulcedo inducatur, fiatq; serapium mediocriter co-
ctum, quod depuretur, additisq; drach. ij. cinnamomi sele-
cti, & drach. i. pul. diambæ iucundiore & odore, & sa-
pore reddatur. Eo utetur egrotans diebus quinque, appe-
tente diluculo. Recipe pilul. foetid. drach. i. ex stillatitio
liquore melissophylli fingatur pil. v. quæ circa noctis di-
midium sumantur.

Aut sic.

Recipe diaphœnici drac. iij. sacchari q. s. fingatur bo-
lus,

DE MORB. INTER. CVR.

lus, qui antelucano tempore sumatur.

Aut sic.

Recipe agar. recens in pastillorum formam redacti
3. i. β. maceretur in stillatitio liquore nepetæ, & melle r
saceo col. horis xii. deinde exprimatur cas. recens extra
ctæ 3. vi. elect. indi. maioris 3. i. β. scrapii de rad. 3. β. exci
pantur 3. iiii. β. communis medicinarum decocti, adie
cto folliculorum sennæ 3. β. fiat potio, quæ ad aurora
sumatur. Eo die domi manendum, sumendum horis post
sex lotorum superius frequenter commemoratum. Re
cipe mithrid. aut theriacæ ueter. tryphæ magnæ sine
opio, ana 3. β. scobis eboris 3. β. Misceantur, & post tri
die manè sumantur sex horis ante pastum. Duobus au
tribus post diebus lauetur balneo naturali sulphureo, et
aluminoso manè, & uesperis ante pastum dies decem.

Quod si desit, sequenti utetur hunc in modum parato.

Recipe foliorum lauri, origani, calaminthæ, pulegii,
mentastri, sabinae, ana M. iiii. artemisiæ, melissophylli, ne
petæ, betonica, sampsuchi, ana M. iiii. radicis erythroda
ni, rad. cyperi, ana 3. iiii. radicum rusci, asparagi, grami
nis, ana 3. iiii. spicæ nardi, iunci odorati, ana 3. ii. seminū
rute, dauci, anisi, fœniculi, scfseleos, an. 3. β. rad. ualeria
næ 3. iiii. Decoquantur in s. q. aquæ, in qua irrigetur, &
laetetur. his autem quæ decocta sunt implcatur sacculus,
super quem in balneo sedeat. Balneum egressa utatur
elect. sequenti. Recipe pul. tryphæ magnæ sine opio,
pul. diambæ, pul. pliris cum mosco, pul. diasatyr. ana 3.
i. scobis eburnæ, seminis linozostidos, ana 3. ii. seminum
anisi, ammeos, corticis libani, ana 3. β. spicæ nardi 3. ii.
sacchari dissoluti in stillatitio liquore melissophylli q. s.
adiecto

adieccto corticis citri saccharo conditi, conseruæ florum
rorismar. ana unc.ß. fingatur elect. solidum in rhombo=
rum figuram. sintq; singuli rhombi ponderis drac. iij. Ex
his sumat unum cum balneo exit. Si balneo lauari recue=
set, calentis decocti prædicti fumum per infundibulum
in uterum recipiat. His autem remediis si fluor huiusce=
modi non uincatur sequentia adijciantur. Recipe pil.
mastich. agar. in pastillorum formam redacti, ana drac.
ij. corticis myrobalano. cepularum ꝑ. ij. excipiatur mel
le rosa. fingantur pil. vi. e drachma, e quibus sumantur
tres per horam ante cœnam semel, aut bis singulis heb=
domadibus. Pessso deinde utendum hunc in modum pa=
rato. Recipe artemisiæ, sabinæ, sampsuchi, dictamni,
absinthij, ana ʒ.ß. corticis libani ꝑ. i. colocynthidos ꝑ.
ij. redigantur in tenuissimum puluerem, qui linozosti=
dos succo exceptus, linteo raro inuoluatur, fingaturq;
pessus, qui filo coxæ alligatus, in uterũ demittatur. Quo
tidie mutetur, recensq; aliud immittatur. Vbi autem de=
clinante hac affectione, quod ex humore perquàm pauco
effluente cognoscitur, ut prorsus exiccentur sequenti pes=
so utendum. Recipe acaciæ, balaustiorum, cucullarum
glandium, menthæ, libani, spicæ nardi, ana ʒ. i.ß. excipiã=
tur succo polygoni, aut myriophylli, fingatur pessus, his
omnibus linteo raro inuolutis, qui filo (ut sæpe dictum
est) coxæ alligatus, in laborantis pudenda immittatur.
Muteturq; quotidie, recenti alio imposito. Oboritur au=
tem ob uirosum hunc humorem circa pudenda fœtor qui
dam, propter quem uxor à uiro plerunque fastiditur, uul=
ua quoque lubrica fit, & dilatatur, quo fit, ut genitale
profluvium retineri non possit. Vtrique autem affectio

S ni

DE MORB. INTER. CVR.

ni hunc in modum succurrendum.

Recipe symphyti, balaustiorum, gallarum, rhois obsoniorum, baccarū myrthi, aluminis, boli Armeniæ ana q.v. horum pars una in puluerem redigatur, pars altera decoquatur in uino astringente, & pauco aceti. Decocto calido uulua sepe foueatur, puluere uerò post fotum inspergenda: deinde linteam madefactum in uino, quo dicenda proximè excepta sint, admoueatur. Recipe galie moscatæ, nucis moschatæ, an. 3. iij. caryophyllorum 3. i. s. moschi. 3. s. excipiantur uino, in quo calefacto linteam madefiat, fiatq; ut dictū est. Præterea gossipij lanugo, aut linteam in prædicto uino madefactum in uterū, in modum pessi, demittatur per noctem, manè auellatur.

SVFFOCATIONIS AB VTERO

Curatio. Cap. XX.

Svffocatio ab utero est uehemens uniuersi corporis refrigeratio: quæ interdum tanta est, ut nulla ab ore spiratio prodeat, quanuis ea quæ in arterijs sit, transpiratio appellata, nequaquam intercipiatur. Quæ interdum tam est exigua, ut sensum omnino effugiat, sufficit tamen ad exiguum calorem in corpore relictum conseruandum. Respirationis enim maximus usus est, ut calor intusus & refrigeratione, & uentilatione seruetur, qui quātò est maior, tantò maiore refrigeratione & uentilatione eget: contrā quātò est minor, tantò quoque minore conseruari potest. Ad hanc autem refrigerationem inducendam, plus uirium habet seminis cohibitio, quàm Mensium suppressio, ut paulò mox dicetur. Ut enim in mulieribus semen est humidius, ita & frigidius. Proinde ipsum excerni oportet, præsertim si plena sit
mulier

mulier, in otioq; educata, atque inde uitiosis humoribus
 abundet, multoq; semine exuberet. Oritur igitur hæc Causa.
 affectio interdum ob menstruorum retentionem, inter-
 lum uerò ob semen cohibitum. Cæterum ad hoc exci-
 andum malum retentum semen maiorem uim obtinet,
 quam menses suppressi. Nam uidere est uiduas mulieres
 robore quidem, ut antea purgari, & tamen hoc pathema
 e corripit, ob semen scilicet suppressum: contra uerò, nu-
 meritas mensium suppressione laborantes, alijs quidem gra-
 uibus symptomatibus infestari, suffocatione uerò nō cor-
 ripi. Cumq; uidetur mulier hystericis corripit accidētibus
 utero sua in sede manente, certum est ea ob retentum se-
 men euenisse. Nā uteri peruersiones, ut modò sursum, mo-
 dō in latus retrahi uideatur, suppressa sequuntur men-
 strua. Id autē ex plenitudine, & suspensione uasorū, hoc
 est, uenarum, & uinculorum ad uterum peruenientium
 contingit. Plenitudo, n. ea in latum, & profundum extē-
 dit, longitudinem uerò abbreviat. Quo igitur breuiora
 efficiuntur, eò magis ad originem retrahuntur. Ea autē
 plenitudo ex menstruorum retentione oritur. Nā perue-
 nit quidem sanguis ad uterū, sed ad interna ipsius ingre-
 di non potest, aut quia crassior est, quam ut per hora ue-
 narum possit penetrare, aut quia clausa sunt ora. Multi-
 plicatus igitur sanguis in uenis eas extēdit, atque uicina
 ipsis uincula madescit. Ad horum autem extensionē cō-
 tinuò uterū retrahi necesse est. Quæ si æqualiter undiq;
 trahantur, recta erit, & sine inclinatione transmutatio:
 si uerò in æqualiter, ad partem uehementiùs trahentē fiet
 intensio. Simul autem cum utero cervicem quoque ipsius signa.
 retrahi necesse est. Mulieres hystericis symptomatibus la-

DE MORB. INTER. CVR.

borantes, interdum sine sensu iacent immobiles, cum o
scuro, paruoq; pulsu, uel omnino sine ullo. Interdum se
tiunt quidem, & mouentur, integraq; sunt ratione, ce
rùm animi defectione, & difficili spiratione laborant.
Interdum uerò & crura, & brachia contrahuntur. Pr
multitudinis enim, qualitatise ratione aut menstruor
aut putrefacti seminis, aliàs aliæ accidentiũ species or
ri solent. Noxia nanque causa uniuersum corpus refrig
rare potente, adeò uehementer corpus in frigidatur, ut
spiratio, & arteriarũ pulsus sensu deprehendi nequeat.
Quæ si uel crassa fuerit, uel aeris, conuulsiones: si uel
atræ bilis naturam habuerit, mœstitiã inducet. Pass
hæc magna ex parte iunioribus uiduis euenit, ijsq; ma
mè quæ antea probè purgabantur, ac pariebant, uir
rumq; concubitu gaudebant. Recipe autem hoc m
lum, cum accessio propinqua est, mentis torpor, pigr
tia, crurum imbecillitas, faciei pallor, aspectus mœstu
Omni quidem tempore superuenire potest, præcipuè
tem hyeme, & autumno. Multæ à malo hoc se recoll
gunt, atque ad se redeunt, nonnullæ uerò in ipsis access
nibus subito, aut paucis post horis moriuntur. Quod co
tingit, ubi pulsus crebriores, & inordinati fiunt, dein
in totum abolentur. Postremò frigidus, & modicus h
mor superficiẽ irrorat. In accessionibus manus, & ci
ra dolorificis uinculis deligare oportet, ac ualidè fricar
corpusq; uniuersum, eaq; facienda, quibus animo defici
tes recuperamus. Naribus præterea ad mouenda foetid
ut funiculus lucernæ nuper extinctus, fumus plumarum
perdicum combustarum, aut solearum calceamentorum
aut alliorum, aut corticum cæparum, aut cornu capræ

Curatio.

ruin.

rum, aut picis super carbones eliquatæ, aut galbani, aut
 castorei, aut id genus aliorum. Horum omnium, aut sin-
 gulorum combustorum fumus in nares immissus, pluri-
 mum confert. Pudendis autem odorata admoueantur, aut
 implastra, aut linimenta, aut suffitus. Emplastra quidē
 in hunc, aut similem modum concinnata. Recipe empla-
 stri ceronei, emplatri pro matrice, ana ʒ.i. galliæ mo-
 schatæ, aliptæ moschatæ, ladani ana ʒ.i. subigantur cum
 oleo nard. fingaturq; emplastrum rotundum, quod inter
 umbilicum, & pectinem applicetur. Suffitus autē hunc
 in modum fiant. Recipe galliæ moschatæ, styracis cala-
 mitidis, aliptæ moschatis, caryophyllorum, ana ʒ.ʒ. Mi-
 sceantur, particulaq; super prunas iniecta, fumus in ute-
 rum per infundibulum recipiatur. Linimenta uerò sic
 fiant. Recipe ol. nard. olei de lilio, ana unc. i.ʒ. moschi
 ʒ. i. galliæ moschatæ ʒ. i. Misceantur, atque his obste-
 trix duos ungat digitos, indicem, & medium, quibus os
 uulvæ linat, ac intrinsecus fricet tantisper dum humor
 corruptus ē uulua excidat. Aut à uiro egregiè subigatur.
 Extra paroxysmum, si à mensium suppressione hoc ma-
 li contigerit, euocentur menses, modis superius dictis, ue-
 naq; iecoraria dextri brachij incidatur, si sanguinis ad-
 sit plenitudo, cætera uerò fiant, ut dictum est. Si uerò à
 semine cohibito, si uirgo sit, aut uidua nubat, aut uehe-
 menti utatur exercitio, à carnibus, atque à uino absti-
 neat, ac à cibis multiplicantibus sperma, suumq; cubicu-
 le spargat floribus, & folijs nymphææ, folijs salicis,
 & uiticis: aut ab obstetrice fricationes fiant, ut dictum
 est, digitis in prædicto linimento inunctis. Si à putrefa-
 ctis, & corruptis in uulua humoribus, purgentur prout

DE MORB. INTER. CVR.

humoris natura expostulat.

VTERI PROCIDENTIAE CV-

ratio. Cap. XXI.

Vterus procidere dicitur, cū egreditur, exteriusq̃
eminet: idq̃; quod eminet, struthiocameli ouo simi-
le est, maioris tantum, aut minoris ratione differens.

Causa.

Huius procidentiae multae possunt esse causae. Casus ab-
lato saltatio uehementior, membranas uterum continen-
tes, ipsumq̃; uicinis partibus connectentes, interdum rū-
punt. In difficili quoque partu nonnunquam procidit,
dum uidelicet secunda extrahitur, quam uterus illi adhæ-
rens sequitur. Idem contingit in mortui foetus extractio-
ne, dum negligenter, aut imperite fit. Ex nimio conatu
in graui aliquo pondere attollendo interdum quoque
procidit. Ob uehementem timorem, aut insignem animi
perturbationem, soluentem quicquid toto in corpore cō-
cretum est, uterus quoque simul delabitur. In senescenti-
bus, ob membranarum, & muscutorum imbecillitatem:
in paralyfi, tota corporis mole soluta, idem euenire solet.
Magna autem ex parte uterum procidere contingit, ob
partuum frequentiam: aut ob humoris plurimi, ac tena-
cis defluxum laxantis, ac mollificantis ligamenta matri-
cis. Ipsa etiam ligamenta interdum ab hulcere putrent.

Curatio.

Si malum hoc adhuc recens est, difficulter curatur: si anti-
quum, nunquam. Si ab humiditatibus muccaginosi-
s matricis appendices laxantibus ortum habeat, quod cum
ex mulieris habitu, tum ex copioso humorum fluore co-
gnoscutur, materia concoquatur, & uacuetur, ut in sup-
pressionē Mensiū à pituita, dictum est. Pil. præterea se-
quentibus utatur laborans. Recipe pilul. de hiera simp.
agar.

gar. in pastillorum formam redacti, ana drach. i. ꝑ. cor-
icum myrobalano. cepularum 3. i. excipiantur melle ro-
acco, finganturq; pil. vi. è drachma, è quibus sumantur
res per horam ante coenam septimo quoque die. Re-
cipe theriace ueter. trypheræ magnæ sine opio, ana 3. ꝑ.
sumatur 3. i. ꝑ. manè sex horis ante pastum singulis heb-
domadibus. Recipe elect. diamoschi dul. in rhomborum
figuram formati 3. ii. sumatur rhombus unus manè ante
pastum quater in hebdomada. Uterus deinde lauetur
sequenti decocto. Recipe folio. lauri, baccarum lauri,
nenthastri, artemisiæ sampsuchi, ana M. i. Decoquantur
in uino astringente, eoq; decocto lauetur pars uteri exte-
rius eminens. Vngatur deinde muccagine seminis coto-
neorum, inspergaturq; puluere sequenti. Recipe acæ-
ciæ 3. ij. baccarum myrti, rosarum rubr. ana 3. ij. cornu
cerui usti 3. ij. ꝑ. redigatur in tenuem puluerem, quo post
fotum, & unctionem prædictam inspergatur uterus, ut
dictum est. His peractis, laborantē supinā figurare oportet,
ut coxas habeat sublimiores, poplites flexos, cruribus
dilatatis, & diuaticatis inuicem, deinde prolapsam uteri
partem obstetrix manu inuncta axungia gallinæ leniter
in proprium locum reponat. Initio nanque repositioni
prompte paret, & locatus perseverat, præcipue si conue-
nit ætas, nam in senioribus reponitur quidem uterus, sed
rursus qualibet leui causa relabitur. Porro prius quàm
suū in locū uterus reponatur, à recto intestino fæces ene-
mate aluū mollietū educendæ: lotiū quoq; si in uesica col-
lectū fuerit, cathetere euocādū, ut undiquaq; uterus, qui
inter rectū intestinum, & uesicā medius statuitur, sit li-
ber. Ab his enim plenīs cōpressus prohibetur repelli, et in
S 4 proprium

DE MORB. INTER. CVR.

propriū situm reduci. Affigantur deinde cucurbitulæ in ilibus, & magna una super umbilicum. Emplastrum quoque sequens inter umbilicum, & pectinem applicetur. Recipe emplastri ceronei (confert frigiditati matricis) emplastri pro matrice, an. unc. i. galbani, an. moniaci, ana drach. i. ß. gummi dissoluantur in uino, singanturq; emplastrum rotundum, quod uentri inter umbilicum, & pectinem admoueat. Odorifera iugiter naribus, admoueantur, foetida uerò inferius. Utendum quoque pesso, hunc in modum parato. Recipe assæ foetidae unc. i. picis colophonie, mastich. ana drach. ii. inuoluatur linteo raro, singaturq; pessus, qui filo coxæ alligatus in uterum demittatur. Cunnus deinde decocto sequenti foueatur. Recipe balaust. gallar. rhois obsoniorum, rosarum rubrarum, ana q. v. Decoquantur in aqua chalybata, & uino astringente: fiatq; ut dictum est. Ei quoque puluis paulo antè dictus inspergatur, quo uterus exterius eminens inspergendus dicebatur. Vtero autem citra suffocationem sursum uersus ascendere uiso, foetida naribus, odorifera uerò inferius tradita in uteri suffocatione admoueantur. Sequens præterea emplastrum applicetur inter umbilicum, & pectinem. Recipe gallie mosch. alyptæ mosc. ana ʒ. ii. emplastri ceronei, emplastri pro matrice, an. ʒ. i. subigantur cum oleo nard. singaturq; emplastrum rotundum, quod applicetur, ut dictum est. Vtero uerò ad latus alterum declinante, quod ob causam in suffocatione ab utero dictam interdum contingit, non nunquam uerò ob flatu impellentes, si à flatibus fiat, cucurbitula magna primum lateri opposito affigatur, in ipsumq; laborans mulier cubet. Sequens deinde enema

in=

infundatur. Recipe helxines, alth. linozost. ana M.
orig. calaminthæ, ana M. β. seminum dauci, cari, anisi,
feniculi, an. drach. ii. seminum lini, fœnogr. ana ʒ. iij. flo-
rum chamæm. rorismar. meliloti, ana P. i. Decoquantur
in s. q. aquæ ad tertias. accipiantur iuris decocti lib. i. β.
as. saccha. rub. an. ʒ. i. benedictæ ʒ. β. mellis anthosati ʒ. i.
ʒ. olei chamæ. ʒ. iij. fiat enema, quod ante partum infun-
datur. Sequenti quoque elect. utendum. Recipe pulue.
liacym. pul. diamb. ana ʒ. i. β. saccha. in stillatitio liquo-
re melissophylli dissoluti q. s. elect. solidum in rhombo-
rum figuram fingatur, rhombus unus sumatur manè ante
partum quater in hebdomada. Quo deglutito parum
uini meri bibendum. Vteri procidentia si à casu, aut salu-
tu, aut percussione, aut ob difficilem partum fuerit, præ-
dicta omnia fiant, purgatione excepta.

MOLAE CVRATIO.

Cap. XXII.

Mola triplex est, carnea, humoralis, & uentosa.
Eadem methodo, ad carneæ & humoralis cura-
tionem proceditur. Carnea autem Mola est proprie di-
cta: quæ nihil aliud est, quàm caro quædam in formis in-
terdum in uteri ostiolo, interdum in toto ipso prominēs,
cuius tactus ferè lapidosus est. Fit autem à seminis mu- Causæ.
liebris, & plurimi sanguinis in uterum affluentis reten-
tione, quæ calor immodicus cogit, ac in carnis formam
transmutat. Hoc in malo corpus gracilescit, decolor fa- Signa.
cies euadit, appetentia deijcitur, tumor durus cum hypo-
chondriorum contractione oritur, Menses supprimun-
tur, mammæ intumescunt, lumbi grauantur, uenterq; at-
tollitur. Quo fit, ut inter initia, conceptionis suspicio

S s oria

DE MORB. INTER. CVR.

oriatur. Ceterū tēporis progressu à cōceptione Mola d
stinguitur, quod hanc punctiōis sensum dolor inferen
subsequatur, motusq; ferè nullus percipitur. In nonnu
lis aquæ intercutem suspicio excitatur, corpore imminu
to, & uentre ampliato, facile tamen hoc malum ab hy
drope discerni potest: tumor quidem durus est, sed non, ut
in hydrope, dum digitis impellitur cedit, aut excauatur,
aut tympani modo sonum edit. Contingit tamen inter
dum ob hūc affectum iecur refrigerari, hydropemq; sub
sequi. Malum hoc magna ex parte insanabile est, nisi
inter initia remedia adhibeantur. Victus ratio calida
fit, & humida. Calida quidem, ad aperiendum, & rarefa
ciendum: humida uerò, ad molliendum. Si plenitudo affue
rit, uiresq; & ætas permittant, incidatur sophera, san
guisq; pro plenitudine detrahatur. Materia deinde an
tè quam concoquatur, hunc in modum minuatur.

Victus
ratio.

Recipe cathol. unc. i. diaphœn. ʒ. i. sacchari quantitate
sufficienti fingatur bolus, qui manè iiij. aut v. horis ante
pastum sumatur.

Aut sic.

Recipe pil. de hiera simp. agar. in pastillorum formā
reducti, ana ʒ. β. excipiantur stillatitio liquore absinth.
finganturq; pil. v. quæ statim à primo somno sumantur.
Materia deinde hunc in modum concoquatur. Recipe
serapij de radi. sine aceto, serapij adianti, serapij de arte
misia, ana ʒ. ij. stillatitiorum liquorum absinth. melisso
phyl. apij, ana ʒ. iiij. Misceantur, & à ieiuna per quatri
duum diluculò sumantur. Recipe elect. diamoschi dulc.
ʒ. i. utatur cum serap. Aut depuretur, & adiectis ʒ. ij. cin
namo. cas. lignæ ʒ. i. ori iucundius reddatur.

Aut

Aut sic.

Recipe quinque rad.com.maceratarum in uino albo,
ana 3.ß. rad. raphani 3.i. hyperici, nepetæ, artemisiæ, me-
lissophylli, chamedryos, chamæpit. ana M.i. herbarum
pil. sabine, an. M.ß. cicerum rub. M.i.ß. semin. apij, ani-
si, fœniculi, ana 3.ij. florum roris mar. sambuci, & geni-
tæ, ana P.i. seminis iuniperi 3.ij. asari. 3.ij. Decoquan-
tur in s.q. aquæ, donec dimidium absumatur. Accipiat ur
uris decocti lib. i.ß. saccharo adiecto dulcedo inducatur,
fiatq; scrapium mediocriter coctum, quod depuretur, ad-
iectisq; cinnamo. selecti 3.ij. pul. diamoschi dulc. drach. i.
iucundiore & sapore, & odore reddatur. Eo quatuor die-
bus manè ieiuna egrotans utetur. Recipe pil. foetidar.
3.i. ex stillatitio liquore nepetæ fingantur pil. v. quæ cir-
ca noctis dimidium sumantur. Recipe theriacæ ueter.
tryphææ magnæ sine opio, ana 3.ß. Misceantur, & po-
stridie manè sumantur sex horis ante pastum. Vacuato
corpore, balneo sequenti utendum. Recipe maluarum,
althææ, ana M.i. helxines, acanthi, florum chamæmeli, et
meliloti, ana M.ij. seminum lini, & fœnogr. an. lib. i. De-
coquantur in s.q. aquæ, in qua egrotans dies complures
ante pastum manè, & uesperis lauetur, atque irrigetur.
Cum autē balneum egredietur, ungantur renes, uenter in-
fra umbilicū, & pudendis uicinæ partes unguento dial-
thææ, aut sequenti. Recipe ol. amygdal. dulc. 3.ij. axungie
gallinæ, axungie anseris, butyri recentis, ana 3.i.ß. muc-
caginis seminum lini, & fœnogr. ana 3.ij. ceræ albæ pa-
rum; fiat unguentum, quo prædictæ partes ungantur, ut
dictum est. Balneum quoque egrediens sumat rhombum
unum elect. sequentis. Recipe cinnam. selecti 3.ij. corti-
cis

DE MORB. INTER. CVR.

cis cas. fistulae, aristolochiae longae, cas. lignae, seminis /
 binae, croci, ana ℥.ii. dictamni ʒ.i.β. sacchari dissoluti i
 succo subsidendo depurato roris mar. q. s. fingatur electa
 solidum in rhomborum figuram, sintq; singuli rhomb
 ponderis ʒ.ij. sumat rhombum unum in exitu balnei. Quo
 deglutito, bibat uinum in quo asarum maceratum fue
 rit. Quibus autem diebus balneo non utetur, sumat rhon
 bum unum electar. praedicti, tribus horis ante pastum
 coq; deglutito bibat itidem uinum in quo asarum mace
 ratum sit. Utatur & sequenti pessso. Recipe baura
 cis, asphalti, castorei, dictamni, ellebori albi, galbani, ge
 tianae, sabinae, sagapeni, scammonii, ana ʒ.β. pulueren
 tur, succoq; porri excepta linteo raro inuoluantur, fin
 gaturq; pessus, qui coxae filo alligatus in uterum demit
 tatur, idq; saepe repetatur. Aut ex croci sufficienti q. suc
 co porri excepti, & linteo raro inuoluti fingatur pes
 sus, qui in uterum, ut dictum est, immittatur. Mirificè
 enim dilatat, & aperit. An uterum deinde sequens deco
 ctum injiciatur. Recipe folio. uiticis, folio rutae, ana
 M.i. (& in Mola carnea) maluarum, althae, helxines,
 ana M.i.β. origani, calaminthae, ana M.β. seminum ani
 si, cari, foeniculi, ana ʒ.iiij. Decoquantur in aqua, quae ca
 lida in matricem injiciatur. Præterea suffitu utendum
 ex equi, aut asini ungula. Mola uentosa, id est, à flatu,
 in amplitudine uteri contento, facile curatur: difficilius,
 si in altero uteri cornu fuerit: difficillimè uerò si in ip
 sius uteri substantiam inclusi sint. Adhuius Molæ cu
 rationem apozemate in Mola carnea tradito utendum,
 ad concoquendam materiam unde flatu gignuntur, ad
 iectis seminum cari, & ammeos, ana ʒ.iiij. Vacuetur au
 tem

em hunc in modum. Recipe pil. foetidarum, pil. de
agar. ana ʒ.ʒ. Excipiantur stillatio liquore artemisiæ,
aut rutæ, finganturq; pil. v. quæ sumantur circa noctis
limidium. Recipe theriacæ ueter. ʒ. i. trypheræ ma-
gnæ sine opio, drach. ʒ. Misceantur, & postridie manè
sumantur sex horis ante pastum. Utatur enemate se-
quenti septimo quoque die. Recipe maluarum, helxi-
es, linozostidos, ana M. i. origani, calaminthæ, ana Ma-
nipul. ʒ. seminum anisi, cari, & foeniculi, ana ʒ. ij. florum
hamæmeli, & meliloti, ana P. i. Decoquantur in s. q.
aquæ ad tertias: accipiantur iuris decocti lib. i. ʒ. cathol.
sacch. rub. ana ʒ. i. benedictæ (respicit uterum) unc. ʒ. mel-
lis anthosathi ʒ. i. ʒ. olei chamæmeli ʒ. iij. Commistis om-
nibus fiat enema, quod ante pastum infundatur septimo
quoque die. Nam huius affectus curatio longa est. Pil:
quoque sequentibus septimo quoque die utetur. Re-
cipe pil. de hiera simpl. agar. in pastillorum formam re-
ducti, ana ʒ. i. ʒ. Excipiantur melle rosaceo finganturq;
pil. vi. è drachma, è quibus sumantur tres per horam an-
te pastum: ut dictum est. Utatur deinde dies complures
manè, & uesperis ante pastum balneo in Mola carnea di-
cto, adiectis origani, calaminthæ, ana M. i. foliorum uiti-
cis, & rutæ, ana Manip. ʒ. seminum cumini, anisi, cari, et
foeniculi, ana ʒ. ʒ. Mox autem ubi balneum egressa fue-
rit, ungantur rerum regio, & lumborum, uenterq; infra
umbilicum sequentibus oleis calidis, & alijs quoque die-
bus, quibus balneo non utetur, manè, & uesperis. Re-
cipe olei rutæ, olei de lilio compositi, olei chamæmelini,
ana unc. ij. Misceantur, fiatq; ut dictum est. Sequenti præ-
terea elect. ad flatum resoluendos utendum, in exitu bal-
nei.

DE MORB. INTER. CVR.

nei. Recipe diacurcumæ maioris, pul. diani si, pul. diac.
mini, ana 3.i.ß. sacchari dissoluti in stillatitio liquore ri
tæ q.s. fingatur elect. solidum rhomborum figuram sintq
singuli rhombi ponderis 3.ij.ß. sumet laborans rhombi
unum, balneum egrediens. Quibus diebus balneo non uti
tur, manè unum sumet tribus horis ante pastum, quo de
glutito, bibet parum uini in quo asarum maceratum fue
rit. Utetur & in fine pastus sequenti puluere uentricu
lum, & uterum corroborante. Recipe coriandri præ
parati 3.ij. anisi, cari, fœniculi, cinnamomi selecti, an. 3.
ß. maceros 3.i. sacchari ad pondus omnium: fiat puluis,
quo utetur: ut dictum est. Venter quoque hunc in modum
fouendus. Recipe milij partes tres, salis partem unam,
torresiant simul, atque in linteis raris imponantur, fin
ganturq; sacculi duo, qui calidi applicentur alter post al
terum inter umbilicum, & pectinem. Foveatur & sequē
ti decocto. Recipe foliorum lauri, foliorum uiticis, ori
gani, calaminthæ. an. M.i.ß. anisi, cari, cymini, an. 3.ß.
Decoquantur in lixiuio, coq; decocto foveatur nō solum
uenter inter umbilicum & pectinem, sed & pars poste
rior opposita. Ungatur deinde partes illæ unguento pro
ximè dicto: aut admoveatur sequens emplastrum. Re
cipe emplastri ceronei 3.ij. emplastri pro matrice 3.i.ß.
Bdellij, ammoniaci, an. 3.ij. seminum anisi, cari, & fœni
culi, ana 3.i.ß. subigantur cum oleo rutæ, & pauco tere
binthine, fingatur duo emplastra, quorum unum orbicu
latum sit, quod inter umbilicum, & pectinem applice
tur, alterum uerò quadratum, quod parti posteriori cir
ca regionem renum admoveatur.

DE

DE REGIMINE PRÆGNANTIS, VT
fetus conseruetur, & uitetur aborsus.

Cap.

XXII.

✓ Ersetur prægnans mulier in aere temperato, ui-
tet nimium aut calidum, aut frigidum. Vescatur
bis eucymis, caueat ab acribus, ut alijs, capis, cappari-
is, croco, quoniam Menses euocant. Caueat quoque ab
loramentis acribus, ut cinnamomo, pipere, zinzibere.
i summa uitentur omnia menses euocantia. Utatur ca-
vophyllis, nuce moscata, macere: sunt enim astringenti
cultate prædita. Potus sit uinum rubrum mediocris
stantiæ. Abstineat à uino albo, à uino ualido & fire-
no, qualia sunt, aruifium, apianum, œnosaccharum. Al-
ius sit semper mollis, excrementa, quando conuenit, deij-
ciens, ne rectum intestinum plenum uterum premat. Ut a-
ur in pastus principio prunis, aut siccis, aut non siccis,
ed coctis in aqua, quæ cū saccharo comedantur, sic enim
aluum mollem efficiunt: in uino uerò cocta ad aciditatē
declinant, & astringunt. Cum autem continget aluum
ideo astrictam esse, ut enemate opus sit, utatur sequenti.

Recipe iuris decocti pulli lib. i. cas. recens extractæ,
sacchari rub. ana unc. i. olei chamæmeli unc. iij. Fiat enc-
ma, quod ante pastum infundatur. Si enema recuset, su-
mat bolum sequentem. Recipe cas. recens extractæ ℥.
vi. adiecto saccharo fingatur bolus, qui sumatur per ho-
ram ante pastum. Cas. cum melle præparata uitanda,
quando emollire opus est.

Aut sic.

Recipe manna granulosi unciam unam, iuris decocti
pulli quantitate sufficienti. Fiat potio, quæ sumatur dua-
bus, aut tribus horis ante pastum. Prægnantem febrile si

con-

DE MORB. INTER. CVR.

contigerit, regatur ut febriens. Quam purgare si op-
 fuerit, purgetur à quarto mense, usque ad septimum, nu-
 duobus postremis, aut tribus primis mensibus. Venam
 men incidere, si necesse fuerit, incidenda potius in tribus
 primis mensibus, quam in alijs, quòd eo tempore foetus
 parvus est, minoreq; nutrimento eget, quam maior. Pu-
 gari autem poterit à mense quarto ad septimum usque
 aut hoc, aut simili medicamento. Recipe rhabar. scli-
 cti ℥.iiij. spice nardi gr. vi. Macerentur in stillatitio-
 quore plantaginis horis duodecim, dein exprimantur
 adiectisq; cathol. drach. vi. serapij rosa. purgatorij un-
 ℥. fiat potio, quæ sumatur ad auroram, præcipue mate-
 ria turgente. Caveat prægnans ab exercitio laborio-
 so, saltu, choreis, coitu, tribus præsertim primis mensi-
 bus, quoniam tunc ligamenta sunt debilia. Vitet iram, et
 morem, mœrorem, uomitum tußim. Habenda cura rob-
 ris cordis, et uentriculi quoniam à corruptis humoribus
 infectantur, laborantq; prægnantes plerunque pica.
 Vtrique igitur robur hunc in modum addemus. Reci-
 pe conseruæ ros. conseruæ buglos. corticis citri, sacchari
 conditi, ana ℥.vi. pul. diamargariti Auicennæ ℥.ij. omnium
 fragmentorum pretiosorum communium drach. i. ℥. coral-
 lij rub. ℥. i. margaritar. ℥. ij. sacchari q. s. fiat mistura au-
 ro cooperta, de qua prægnans ante pastum sumat quan-
 tum cochlear unum capit. Aut fiat electar. molle, omni-
 bus his serapio rosaceo de rosis siccis exceptis, adiecto my-
 robalano. empeliticarum conditarum, accuratè contusa-
 rum unc. ℥. si quidem prægnans diues fuerit. Sumet au-
 tem de eo electar. castaneæ instar, manè ante pastum ter,
 aut quater in hebdomada. Utatur et sequenti unguento
 uentris

uentriculum roborante. Recipe olei absinth. unc. i. β .
olei nard. olei mastich. olei ex cotoneis, ana unc. i. caryo-
phyllorum, mentæ siccæ, galangæ, corallij rub. rosarum
rub. an. \mathfrak{z} . i. ceræ parum: fiat unguentum, quo ungatur re-
gio uentriculi calidè manè ante pastum.

Aut cerato sequenti utatur.

Recipe emplastri de mastich. emplastri stomachici,
ana unc. i. corallij rubr. \mathfrak{z} . ij. Subigantur cum oleo ex coto-
neis, fingaturq; ceratum in formam scuti stomachalis
uulgo appellati, quod uentriculi regioni applicetur. Si
contingat prægnantem ex uentriculo paulò grauius do-
lere, utatur pil. sequentibus. Recipe pil. de hiera sim-
pl. drach. ij. rhabar. selecti \mathfrak{z} . ij. mastich. (ne aloë aperiatur
uenas) drach. β . rosarum rub. \mathfrak{z} . β . Excipiantur melle ro-
saceo, aut serapio ex cotoneis (si sit caliditas) fingaturq;
pil. vi. è drachma, è quibus sumat unam per horam ante
coenam semel aut bis in hebdomada: Ab agarico cauend-
um est, ne nim aloës adstrictoriam impediat. Quoniã
autem propter mensium suppressionem, uertigine, fumis
ad cerebrum elatis, nonnunquam afficiuntur, utantur in
fine pastus fructibus astringentibus, uerbi gratia, mespil-
lis, pyris coctis, aut cotoneis. Aut sumant \mathfrak{z} . ij. carniū co-
toneorum conditarum saccharo sine speciebus in fine pa-
stus \mathfrak{z} . ij. quibus sumptis, ne bibant.

Aut utantur puluere sequenti.

Recipe coriandri præparati \mathfrak{z} . iij. pul. diacydonites si-
ne speciebus \mathfrak{z} . iij. sacchari rosa. tessellati ad pondus om-
nium, sumant quantum cochlear unum capit in fine pa-
stus, nec post bibant. Si prægnans quæpiam appetat non
solita comedi, non denegentur, sed ab astantibus ut horæ

T renda,

DE MORB. INTER. CVR.

renda, & abhominanda proferantur. Præterea prægn-
tium pedes interdum intumescunt, brassicæ in uino &
aceto coctæ in emplastri modum tumori admoucantur
& subsidet. Aut charta in aceto molliata & macerata
& apposita, idem præstabit: estq; hanc adrem præstan-
remedium. Aut ungatur pes tumens oleo rosaceo & ac-
to. Ad hæc in pregnantibus renum ligamenta nonnun-
quam laxantur, quare si euenerit, ut prægnans renum
imbecillitate laboret cum calore, ob quam contingit in-
terdum abortum fieri, ei hunc in modum succurremus.

Recipe olei myrthei, olei ex cotoneis, olei mastich. an-
unc. i. ß. acaciæ, hypocistidos, boli Armeniæ santali citri-
ni, ana drach. i. ß. baccarum oxyacanthæ scrup. ij. cera-
parum: fiat unguentum, quo regio renum frigide die-
aliquot ungatur. Apponatur & sequens ceratum.

Recipe mastich. 3. ß. ladani 3. vi. ceræ citr. 3. ij. nucum
cupressi, bistortæ, (uim dicitur habere bistorta foetus in
utero retinendi, ac conseruandi.) acaciæ, hypocistid. boli
Armeniæ, terræ sigillatæ, rosarum rub. ana 3. i. ß. subig-
tur cum oleo myrtheo, & pauco terebinthinæ, si sit nece-
se (nam frigidis miscenda sunt calida astringentia) singa-
tur ceratum, quod renum regioni applicetur. Si uero re-
num imbecillitas sit cum frigiditate, utendum sequenti ce-
rato. Recipe mastich. 3. vi. ladani. 3. iij. ß. ceræ citrinæ.
picis colophonæ, picis naualis, styracis calamitidis, ana
3. ij. nucum cupressi, bistortæ, menthæ, galangæ, myrrhæ,
thuris, ana 3. i. ß. Excipiantur terebinth. singaturq; cera-
tum, quod renum regioni apponatur. Si inde pruritus
quispiam molestus in renum regione oriretur, auferatur
per aliquot dies, deinde reponatur.

DE

LIBER TERTIVS. 146
DE PARTVS ACCELERATIONE,
foetusq; euocatione in difficultate partus.

Cap.

XXIIII.

PArturiens mulier si dolores graues ab umbilico ad
pectinem sentiant, partus erit uelox. Dolores ue-
ro si lenti fuerint, tardus, & difficilis futurus est par-
tus. Si dolores in parte posteriore circa dorsum percipiā-
tur, grauis quoq; & difficilis partus. Hunc igitur in mo-
dum per mensem appetente pariendi tempore pręgnas
regatur, ea pręsertim quę cum difficultate parere sueta
est. Vescatur cibus euehymis, cōcoctu facilibus, croco,
& cinnamomo conditis. Nam cinnamomum leuiora fa-
cit partus accidentia: iisq; solet misceri, quę in partus
difficultate exhibentur, quod ea sint gustu ingrato, cin-
namomum autem additum gratiora facit. Maiore utatur
exercitio, quā antea. Loca edita ascendat: balneoq;
sequenti dies duos aut tres lauetur, atque irrigetur.

Viſus
ratio.

Recipe althęe M. vi. Maluarum, acanthi, helxines, ar-
temissę, foliorum lauri, pseudonardi, chamęmeli, meli-
loti, ana M. ij. seminum lini & fęnogr. ana lib. i. ꝑ. Deco-
quantur in aqua, in qua temperatę calida mulier ad um-
bicum usque irrigetur. Balneum autem ingrediens iu-
sculum pulli sorbeat cum uitellis ouorum, cinnamomo, et
croco. Egrediens autem utatur elect. sequenti. Recipe
cinnamomi selecti ꝑ. i. ꝑ. corticis cas. fist. cas. lignęe, myr-
rhę, ana drac. i. sacch. dissoluti in stillatitio liquore adia-
ti q. s. fingatur elect. solidum in rhomborum figuram,
sintq; singuli rhombi ponderis ꝑ. ij. ꝑ. sumatur rhombum
unus in egressu balnei: quo deglutito parū ceno sacchari
bibat. Quibus diebus balneo non utetur, electario hoc ęt

T 2

utetur

DE MORB. INTER. CVR.

utetur manē ante pastum. iisdem ē rebus puluis fieri potest, sumendus manē ante pastum cum ouo sorbili. Præterea ubi balneum egressa fuerit, renum regio, lumbi, et uenter inter umbilicum, et pubem ungantur sequenti unguento. Recipe olei amygdal. dul. ʒ. ij. olei de lilio, butyri sine sale, axungie gallinæ, an. ʒ. i. muccaginis seminis lini, et fœnogr. ana ʒ. i. β. ceræ parum: fiat unguentum, quo partes dictæ ungantur. Loco solidi elect. prædicti poterit interdum elect. molli sequenti uti. Recipe myrrhæ, castorei styracis calamitidis, an. ʒ. β. sabinæ, cinamomi selecti, an. ʒ. ij. mellis q. s. fiat electar. molle, de quo sumat instar castaneæ parue. Modicum deinde uini bibat, in quo lini semen decoctum fuerit.

DIFFICULTATIS PARTVS

Curatio. Cap. XXV.

Causæ.

Partus difficultas uarijs ex causis contingit: aut ob humoris in tunicis fœtum continentibus collecti expulsionem fœtu manente: aut ob fœtus, aut parturientis imbecillitatem: aut ob frigus matricem condensans: aut ob parturientis obesitatem et crassitiem. In tunicis enim fœtum continentibus humor colligitur, conseruaturq; ad diem partus usque: soletq; is humor die partus fractis tunicis exire cum fœtu, uuluamq; lubricam reddere, atque inde fœtus facilius exit, minoreq; molestia. Quod si contingat tunicas rumpi, humoremq; illum effluere, fœtu in utero manente, maiore molestia, ægriusq; postea parit mulier, uulua sicca effecta. Hoc ubi contigerit, locaq; exaruerint, quò leuius, faciliusq; fœtus exeat, hunc in modum humectetur, lubricaq; fiat. Recipe altheæ M. ij. artemi. M. i. semi. lini, et fœnogr. ana ʒ. ij. ficus xij.

De

Decoquantur in aqua, idq; decoctum in uulvam inijciatur. Quo iniecto, si foetus non exeat, sternutamenta, piper, & oleo commistis, & in nares immisissis, excitetur. In uterum quoque sequens pessus immittatur. Recipe croci q. s. excipiaturo succo porri, linteoq; raro eo involuto, fingatur pessus, qui filo coxae alligatus, in uterum immittatur. Partus difficultas interdum contingit ex imbecillitate foetus, quæ cognoscitur ex debili, & tardius motione. Interdum uero ex imbecillitate parturientis factum propellere nequeuntis, quæ ex habitu corporis, morbisq; præcedentibus deprehenditur. Huiuscemodii mulier ijs quæ reficiunt, & roborant cibis, & potionibus refocillanda: ut uino odorifero, bonis iusculis, adiectis cinnamomo & croco: sumat tessellam unam diamaragæ calidi. lucundi odores, ut styrax calamitis, moscus, nardibus admoueantur, nec uerendum matricem, quæ bonis odoribus delectatur, sursum reuocari, sicq; partum impelli. Nam foetus grauitas uterum deprimit, sursumq; ascendere prohibet, atque interim bonis illis odoribus parturientis uires, & spiritus roborantur, ualdeq; iuuantur. Partus difficultas nonnunquam oritur à frigore externo uterum densante, meatusq; angustiores reddente. Ubi hoc contigerit, collocetur parturiens in cubiculo calido, panniq; multi calidi circum uulvam applicentur, venter quoque iasmelæo ab umbilico infra ungatur: artemisia confusa in emplastri modum uentri admoueatur. Partus difficultatis si parturiens crassa, obesaq; in caua sit, eam in lecto pronam, uultu in terram deiecto figurare oportet, flectentem, & inclinantem genua ad femora. Obstetrix deinde manu, aut oleo, aut butyro, aut axi

DE MORB. INTER. CVR.

gia anatis, aut gallinæ oblita, os uteri linat. Lapis acti-
tes coxæ sinistræ alligatus, polypodium quoque pedi al-
ligatum, & magnes partum faciliorem, celeriorēq; ef-
ficere feruntur. Vir haud dubiè cum parturiente coiens,
partum adiuuat, maturatq; . Partus difficultas si ob fœ-
tum in utero mortuum fuerit, fortiora sunt adhibenda
præsidia ad eum extrahendum, quàm si uiueret. Fœtus. n.
uiuus suo motu, nisiq; partum & adiuuat, & accelerat.
Mortuus uerò prorsus cessat à motu, uentrisq; tunc frigi-
ditas adest, dolorq; iuxta umbilicū grauis. Spiritus exha-
latur foetidus, facieiq; color prauus adest. Ad eum autem
extrahendū pessō hunc in modum parato utendum. Re-
cipe aristolochiæ rotundæ, myrrhæ, ellebori, an. ʒ. ʒ. Exci-
piantur succo pulegij, linteo deinde raro inuoluantur, sin-
gaturq; pessus, qui in uterū demittatur. Suffitus præterea
fiant ex simo equi, aut asini, aut ex ungula eorundem. Tu-
nica, quam secundinam uulgò appellant, si fœtu egresso
remaneat, adhibeantur balnea, unguenta, & cætera re-
media in maturatione partus tradita. Nam putrescere
solet, uterumq; putrefacere, & mala symptomata indu-
cere, interdum mortem. Sternutamenta præterea fortia
cienda sunt, pipere & elleboro pulueratis, & flando in
nares immisissis. His peractis, si non exierit, unguentum
basilicum in uterum immittendum, ut eam putrefaciat,
putrefactam autem postea natura expellet.

INFLAMMATIONIS VTERI CV- ratio. Cap. XXVI.

V Teri uniuersum corpus inflammatio interdum oc-
cupat, tuncq; uterus undequaque dolet. Parte ue-
rò eius aliqua inflāmatione laborante, in ea dolor per-
cipitur.

pitur. Anteriore igitur parte inflammatione correpta, dolor partes umbilico uicinas, pubemq; occupat, pressaq; sica urinae difficultas excitatur. Posteriore uero parte inflammatione obsessa, lumbos & renes dolor uexabit, etq; intestino compresso excrementa retinebuntur. Laboribus autem uteri inflammatione correptis, tensio circa inguina, grauitas circa crura, cum difficultate motus peruenit. Si autem in uteri ore inflammatio fuerit, tamen percipitur, osq; durum, clausum, & feruidum depremitur. Fit magna ex parte a sanguine menstruo, suppressis mensibus, cui aliquando humor alius miscetur, qui sanguis est, phlegmone dicitur: si bilis, erysipelas, si pituita, oedema. Fieri potest a semine cohibito, raro tamen. Iam semen retentum in ueneni naturam uertitur, pariq; suffocationem. Siue autem si phlegmone, siue erysipelas, si febris acuta, ut in omnium uiscerum internorum inflammationibus, sequitur, capitis dolor, & radice oculorum, uomitus & nausea, brachialis, digitorum & colli convulsio, atque in aduersum declinatio. Sunt autem symptomata aut magna, aut parua, pro magnitudine, aut paruitate inflammationis. Curandi ratio a uenae sectione auspicanda. Incidenda igitur uena iecoraria dextri cubiti ad reuellendum, sanguis aut pro uiribus laborantis detrahatur: deinde ad materiam coniunctam, aut quasi coniunctam uacuandam, inciditur uena poplitis, aut malleoli. Alius tamen ante sanguinis missionem si non sua sponte excrementa deiecerit, enemate emolliente eluenda, & uacuanda, hunc in modum. Recipe castoreum recens extractae, sacchari rub. ana unc. i. olei uiol. unc. iij. iuris decoctarum quatuor herbarum emollientium, & prunorum x. lib. i. ss. Commistis omnibus fiat enema,

Causae.

signa.

Curatio.

T 4 quod

DE MORB. INTER. CVR.

quod ante pastum iniiciatur, eoq; ciecto, sanguis ante p
stum, ut dictum est, mittatur. Quòd si aut etas, aut co
poris habitus, aut anni tempus, aut sequens inflammatio
aborsum, aut magnam aliquam sanguinis euacuatione
sanguinis missione obstiterint, loco sectionis uenæ inter
næ, cucurbitulæ natibus affigantur cum scarificatu, loc
uero sectionis uenæ poplitis, aut malleoli super costas a
figantur. Materia in his tumoribus calidis intra die
tres, aut quatuor ad summum fluit, itaque intra dien
quartum, si fieri potest, reuellatur, & repellatur. Vinum
non bibat egrotans. sed aquam coctam, cū serapio uiol
Collocetur in cubiculo obscuro, moderatè calido, ubi qui
scat, cruraq; à motu prohibeantur. Artus, partesq; cor
poris extremæ perfricentur, ut fluoris ad uterum impe
tus prohibeatur. Cibus sit modicus, ptisanæ cremor,
ouaq; sorbilia. Quoties aluus sua sponte, ut conuenit, ex
crementa non deiiciet, leniatur enemate iam dicto. In
hoc affectu solutiuo forti uti non expedit. Prius conco
quantur humores, deinde uacuentur. Interea tamen dum
& concoquentur, & uacuabuntur, topicis præsidij pau
lò post dicendis utendum. Humores autem hunc in mo
dum concoquentur. Recipe serapij intybi satiui latio
ris simpl. unc. iij. serapij uiolacei unc. i. ß. stillatitiorum li
quorum cichorij, buglossi, oxalidis, ana unc. iij. Miscean
tur, & à ieiuno per triduum diluculò bibantur. Re
cipe electar. ex tribus santal. unc. ß. utatur cum serapijs.

Recipe cas. recens extractæ unc. i. serapij rosacei pur
gatorij unc. ß. communis medicinarum decocti, (adiectis
oxyphœnicæ n drach. v.) q. s. fiat potio, quæ sumatur ad
auroram. Bilis uero si abundare uideatur, quod dolor
acutus,

LIBER TERTIVS. 149

cutus, multusq; ardor indicant, uacuetur hunc in mo-
lum. Recipe rhabarb. selecti drach. v. oxyphœnicon
drach. vi. Macerentur in stillatitio liquore plantag. ho-
is xij. deinde exprimantur, adiectisq; serapij rosa. purga-
orij sine scammonio drach. ij. stillatitiorum liquorum in
tybi satiui latioris, & buglos. an. ʒ. ij. fiat potio, quæ su-
natur ad auror. an. Remedia topica inter initia adhiben-
la, hæc sunt. Recipe succi plantaginis, succi polygo-
ni, ana lib. ʒ. aceti unc. i. boli Armeniæ, sang. draco. an. ʒ.
ʒ. Commistis omnibus fiat epithema tepide uentri inter
umbilicum & pectinem, & circa renes.

Aut sic.

Recipe stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris,
& plantag. ana lib. ʒ. aceti ʒ. i. boli Armeniæ, sang.
draconis, terræ sigillatæ, an. ʒ. ʒ. Commistis omnibus fiat
epithema partibus dictis.

Aut sic.

Recipe olei rosacei ʒ. iiij. olei myrthæi ʒ. ij. aceti ʒ. i.
boli Armeniæ ʒ. ʒ. His commistis partes prædictæ un-
gantur. In huius mali principio non utendum est, tam as-
tringentibus, & repellentibus, quàm in alijs inflamma-
tionibus, ne in duritiem tumor conuertatur, tenui resolu-
to, sed ad duos, aut tres dies dictis astringentibus, & re-
pellentibus utendum. Sequens quoque decoctum metrene-
chyta tepidum in uterum iniiciatur. Recipe foliorum
plantaginis, peræ pastoritiæ, polygoni, an. M. i. lentium
excorticatarum ʒ. i. rhois obson. unc. ʒ. folio. myrti. M. i.
ʒ. gallarum, balaustiorū, ana ʒ. ʒ. Decoquantur in aqua,
quæ tepida, ut dictum est, iniiciatur. Cæterum prædicta,
quæ in aqua decocta fuerunt, contundantur, adiectis hor

T S dei

DE MORB. INTER. CVR.

dei farinae unc. ij. atque in emplastri modum inter umbilicum, & pectinem applicentur, & in parte posteriore circa renes, & lumbos. Si autem ardor magnus fuerit cum dolore, fiat sequens iniectionio. Recipe lactis mulieris ℥. iij. aquae albuminis oui ℥. xv. Misceantur, & in uterum injiciantur. Lac muliebre in acrimonia reprimenda plurimum commendatur. Vomitus quoque provocatus sumptis ieiuno uentriculo ℥. vi. aquae tepidae, & ℥. i. β. serapij acetati simpl. conferet. Pessio quoque sequenti utendum. Recipe farinae hordei ℥. ii. lentium excorticatorum ℥. i. β. foliorum plantaginis, perae pastoritiae, an. M. β. Contundantur simul, pannoq; raro inuoluatur, & fingatur pessus, qui coxae filo alligatus in uterum immittatur. Si laborans uirgo fuerit, loco iniectionum, et pessus, ex praedictis cataplasma fiat, quod applicetur uentri inter umbilicum, & pectinem, & super renes, & lumbos. Aut fiat balneum ex praedictorum decocto. Cum malum hoc ad incrementum peruenerit, ei hunc in modum succurrendum. Recipe folior. plantaginis, polygoni semperuiui, intybi satiui latioris, an. M. i. maluarum, altheae, chamemeli, meliloti, an. tertiam partem M. i. seminum lini, & foenogr. an. ℥. i. Decoquantur in aqua, de qua iniectionio fiat in uterum. Si uirgo laborans fuerit, ex praedictis paretur balneum, in quo ad umbilicum usque irrigetur: fiatq; ex iisdem contusis cataplasma, quod inter umbilicum, & pubem applicetur.

Aut sic.

Recipe olei rosa. ℥. iiii. olei chamemeli ℥. ij. aceti ℥. i. His commistis ungantur renes, lumbi, & uenter infra umbilicum calide. Cum uero ad statum peruenerit, quod
ple

lerunque fit circiter diem septimum, repellentia æqua-
ter cum dissoluentibus admoueri debent, hūc in modū.

Recipe maluarum, altheæ, an. M. i. β. rosarum rub. lē-
um excorticatarum, foliorum plant. a. polygoni, an. M.
seminū lini, & fœnogr. an. ʒ. i. β. Decoquātur in aqua,
atq; balneum. Et de eo decocto tepido iniectio fiat in-
terum mulieris, non autem uirginis. Declinante hoc ma-
o, dissoluentibus puris utendum hunc in modum. Reci-
e stillatitij liquoris sampsuchi ʒ. iij. ol. de lilio ʒ. ij. his
ommistis iniectio in uterum fiat. Aut sic.

Recipe stillatitij liquoris sampsuchi ʒ. iij. styracis ca-
amitidis, galbani an. ʒ. i. axungie anseris ʒ. ij. Miscean-
ur, & tepida in uterum iniiciantur. Utendum deinde se-
quenti pessō. Recipe ladani ʒ. β. styracis calamit. gal-
bani, axungie anseris, axungie gallinæ an. ʒ. i. β. subigan-
tur simul, linteoq; raro inuoluta fingantur in modū pes-
sō, qui filo coxæ alligatus demittatur in uterū. Prædicta
sunt, quando per uiam dissolutionis inflammatio termi-
natur, quæ quidem dissolutio, si non fiat, symptomataq;
augeantur, ut febris, dolores, ad suppurantia ueniendum
hunc in modum. Recipe pollinis ʒ. iij. farine seminis li-
ni unc. ij. caricas pingues x. uitellos duos ouorum, croci
ʒ. ij. subigantur simul, fiatq; cataplasma inter umbili-
cum, & pectinem. Pus autem aliquādo deriuatur ad uri-
nam, aliquando ad intestina, aliquando ad os uulvæ. Si
deriuetur ad uescan, quoniam acrimoniam habet, timē-
da est, hulceratio, cui sic occurrendum. Recipe emul-
sionis quatuor seminum frig. maiorum factæ cum aqua
hordei ʒ. iij. serapij uiolacei ʒ. i. Misceantur, et fiat potio,
quæ sumatur manē ante pastum. Quotidie repetatur, do-
nec

DE MORB. INTER. CVR.

nec puris mundificatio appareat. Si pus ad intestina
riuetur, quod ex deiectionibus cognoscitur, hunc in mo-
dum fiat. Recipe aquæ decoctionis hordei lib. i. Vite-
los duos ouorum, sacchari rubri ℥. i. ol. rosacei unc. iij. C-
mistis omnibus fiat enema, quod ante pastum immitta-
tur, idq; quotidie usque ad perfectam puris mundifica-
tionem. Si uerò ad os uulvæ deriuetur, fiant iniectione
sequentes. Recipe aquæ hordei ℥. vi. inijciantur in
uulvam, præcipuè si calor appareat: sin minus, inijcia-
tur aqua mulsa.

Aut sic.

Recipe fellis caprini ℥. iij. mellis rosacei col. ℥. ij. Mi-
sceantur, & tepida in uterum iniiciantur quotidie ad
perfectam usque puris mundificationem. Si ob aliquam
aliam causam dolor uehemens fuerit cum ardore, fiat
hunc in modum. Recipe arnoglossi, solani, ana M. i.
Decoquantur in aqua. accipiantur iuris decocti ℥. iij. la-
ctis ℥. ij. aqua albuminis oui unius diu, multumq; agitati.
Misceantur, & in uterum iniiciantur. Si uerò dolor his
non mitigetur, addatur in decoctione seminis papaueris
albi ℥. β. Dolore adhuc perseuerante, misceatur ℥. i. opij
cum scæno-græci decocto. Stupescit enim opium, & re-
primit dolorem. Pure mundificatu, ut caro regeneretur,
fiat hunc in modum. Recipe thuris, aloes, sarcocollæ
nutritæ, sanguinis draconis, corticis arundinis cōbusti, cu-
curbitæ siccæ combustæ, an. ℥. i. β. Redigantur in pulue-
rem, qui excipiat lactis uaccini, aut ouili ℥. vi. deinde
in uterum iniiciatur tepide.

OEDEMATIS VTERI CVRATIO.

Cap.

XXVII.

Oedema

OEdema in utero frigidū cognoscitur, quòd pauco
cum dolore sit, tumorq; non multus est. Declinet
ad calidum, & siccum uictus ratio, adhibeanturq; initiò
opica remedia, quæ paulò pòst dicentur, atque interea
stuitosus humor concoquatur, & uacuetur hunc in mo-
m. Recipe serapij de rad. 3. ij. oxymelitos simpl. 3. i.
serapij de artemisia 3. i. stillatitiorum liquorum nepetæ
& buglosi, melissophylli, ana 3. iij. Miscantur, & à ie-
iunio manè per triduum diluculò bibantur. Materia autem
crassa ualde, & uiscida existente loco oxymel. simp.
substituatur oxymeli scillinum. Recipe dianoschi dul-
cis. 3. utatur cum serapijs.

Signa.
Victus
ratio.

Aut sic.

Recipe quinque rad. com. maceratarum in aceto, ana
3. v. herbarum capil. ana M. 3. hyssopi, nepetæ, artemi-
siæ leptophylli, melissoph. artemisiæ, platophylli (de qua
semper intelligendum, cum artemisia tantum dicitur)
ana M. i. asari. 3. ij. cicerum rub. M. 3. seminum anisi, apij,
ceniculi, ana 3. i. 3. uuarum passarum detractis uinaceis
3. 3. florum roris marini, & sambuci, ana P. i. 3. florum
buglosi, & cirsi, ana P. i. polypodij quer. 3. i. medullæ
mici, agar. recens in pastillorum formam redacti, ana
3. 3. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absuma-
ur, accipiat iuris decocti libr. i. 3. saccharoq; dulcedo
inducatur, atque adiectis serapijs adianti, oxymelitos
scillini, ana 3. ij. fiat scrapium mediocriter coctum, quod
depuretur, additisq; cinnamomi selecti 3. ij. pul. diamb. 3.
i. iucundiore, & odore, & sapore reddatur. Eo utetur la-
borans dies sex matutinis horis ieiuna. Recipe pil. fœ-
tid. 3. i. si fortis sit: si debilis, pil. fœtid. & pil. de agar.
ana

DE MORB. INTER. CVR.

ana ʒ.β. ex stillatitio liquore nepetæ fingantur pilul.
quæ sumantur circa noctis dimidium.

Aut sic.

Recipe cathol. ʒ.β. diaphœnici, elect. indi maioris, a
ʒ. i.β. serapij adianti ʒ.β. communis medicinarum dec
cti ʒ. iij.β. fiat potio, quæ sumatur in aurora.

Aut sic.

Recipe cathol. drachm. vi. diaphœnici drachm. iij. a
iecto saccharo fingatur bolus, qui antelucano tempore
sumatur.

Aut sic.

Recipe turpeti selecti ʒ. ij.β. sacchari drachm. ij. re
digantur in puluerem, qui iure cicerum rub. exceptus, s
matur appetente diluculo. Recipe theriacæ ueter. ʒ. i
conseruæ buglos. drach. i.β. Misceantur, & postridie ma
ne sumantur sex horis ante pastum. Topica autem rem
dia hunc in modum adhibenda sunt. Recipe aloes, myrr
rhæ, acaciæ, croci orientalis, cyperi, boli Armeniæ, an
q. v. Redigantur in puluerem, de quo ʒ.β. brassicæ succ
ʒ. v.β. aceti ʒ.β. excipiatur, in uterūq; iniiciatur tepide
Ex materialibus autem dictis fiat cataplasma, quod inter
umbilicum, & pubem applicetur. Præterea lixiuius, sale
& aceto simul feructis foueatur uenter inter umbili
cum, & pectinem. Cum malum hoc ad incrementum per
uenerit, ea fiant, quæ in principio fieri debere diximus,
cæterum plus aceti admiscendum ad ualidius dissoluen
dum. In statu autem, & declinatione, puris dissoluentibus uti
dum, consumentibusq; nullo autem modo astringentibus,
idq; cum œdema resolui uidetur. Fiat igitur hunc in mo
dum. Recipe aluminis, sulphuris, salis, myrrhæ, ana q.

v. Ex

Ex his ℥.β. excipiatur ℥.iiij. olei rosacei, & ℥.i.β. aceti.
in in uterum inijciantur. Panni quoque his immersi,
vntri inter umbilicum & pectinem applicentur. Quod
non resoluatur œdema, sed in uigore maneat, suppurat-
o expectanda, quæ hunc in modum adiuuanda est. Re-
cipe diachyl. ireati ℥.iiij. fingatur emplastrum, quod uen-
tri inter umbilicum, & pectinem admoueat.

Aut sic.

Recipe acanthi, maluarum, radicis altheæ, radicis li-
i, ceparum torrefactarum, fermenti, seminis lini, lima-
um, an. q. v. Contundantur, fiatq; cataplasma, quod uen-
tri, inter umbilicum, & pectinem apponatur. Deinde ℥.
i. iuris decocti ficuum, & seminis lini in uterum calide
inijciantur. Si seriùs rumpi uideatur, sitq; in ore, aut col-
o uulvæ, ferro aperiatur: Si uerò intra uterum, iniectio
i dictæ addatur fimi columbini, & fermenti, ana ℥.β.

Aut sic.

Recipe succi scabiosæ, succi nasturtii, an. ℥.iiij. fimi co-
umbini, fermenti, an. ℥.β. Commista hæc in uterum inij-
ciantur. Rupto abscessu, pus hunc in modum absterga-
ur. Recipe aquæ mulsæ ℥.iiij. succi apij, succi absinth.
an. ℥.i. Commista hæc in uulvam inijciantur. Quod si hæc
dolorem in utero excitauerint, inijciatur oleum chamæ-
nelinum cum œsypo ad dolorem mitigandum.

SCIRRHI VTERI CVRATIO.

Cap.

XXVIII.

Scirrhus tumor est durus in aliqua corporis parte.
Estq; duplex, unus quidem uerus, & exquisitus, estq;
sine sensu ullo, atque incurabilis. Alter uerò est cum ali-
quo sensu, estq; curabilis, sed ægrè. Scirrhus autem

in

DE MORB. INTER. CVR.

in utero, inquit Auicennas, si sit in interiore spatio, incurabilis est: si uero in ore, aut ueteri ceruice, nec omnino sensus expers sit, curabilis est. Medicamenta autem scirrhum curantia, sint, ut solis calor, temperata, hoc est, tepida magis, quam calida: sint quoque humida, non multum tamen, nec parum quoque, nec ad siccitatem nimium declinent. Galenus his scirrhis curandis adhibere solebat per multos dies emollientia, deinde resoluentia: ceterum neoterici utuntur medicamentis emollientibus, & resoluentibus hunc in modum. Recipe ficus quinque decoquantur in aqua, deinde subigantur. accipiatur de eis subactis unc. i. β. adipis anseris, uel gallinae, æsypi, ana ʒ. i. picis naualis, ceræ citrinae, ana ʒ. i. β. olei de lilio (dissoluit, & emollit) ʒ. β. diachyli communis unc. ij. liquefiant simul, ipsisq; liquefactis addantur pul. rad. iridis ʒ. iij. cineris corticis salicis ʒ. ij. subigantur simul, fiatq; ceratum, quod applicetur loco duritiei.

Aut sic.

Recipe olei chamæmeli ʒ. ij. olei de spica ʒ. i. β. medullæ cruris uituli, uel cerui (quæ est melior.) ʒ. i. fiat unguentum, quo ungatur locus duritiei calidè dies complures. Lauetur præterea in balneo ex sequenti decocto parato.

Recipe chamæmeli, meliloti, ana M. i. β. althææ cum rad. M. iij. seminum lini, & fœnogr. ana lib. i. Decoquantur in aqua, ex qua balneum fiat, in quo laborans mulier ante partum dies complures irrigetur. Sequenti quoque iniectione utendum. Recipe olei de lilio, olei chamæmeli, an. unc. ij. adipis anseris, medullæ cerui, ana ʒ. i. bdellij dissoluti in uino ʒ. iij. uitellum oui unius, rob. uini, idest uini cocti q. s. ut dictis admistum ea liquida reddat,

dat, ut in uterum injici possint. De his commistis accipiatur unc. vi. quæ tepidè in uterum injiciantur: idq; dies aliquot repetatur. Sequens quoque pessus in uterum demissus plurimum conferet. Recipe thuris, ammoniaci pinguis, an. 3. i. mastichis, styracis liquidæ, castorei, adipis anseris, ana 3. ij. Gummi dissoluantur in melle, hisq; omnibus linteo raro inuolutis fingatur pessus, qui coxæ filo alligatus demittatur in uterum.

CANCRI IN VTERO CVRATIO.

Cap.

XXIX.

S Cirrhus in utero quando perdurat, in cancrum conuertitur, conuersa illa crassa pituita, aut melancholia non uisita in melancholiam uisitam. Cancer, alius quidem hulceratus, alius non hulceratus. Hulceratus cum dolore est, habens hulceris latera dura, fluitq; euulua humor faci uini non absimilis. Non hulceratus uerò, est cum dolore, & ardore. Dum in scirrhus dolor, & ardor percipiuntur, indicium est eum in cancrum esse conuersum. Cæter nisi curetur totus cum omnibus radicibus, redit: quare in utero cum id fieri non possit, est incurabilis. Prohiberi tamen potest augmentum, mitigari dolor, hulus tolli, si hulceratum sit, si nondum hulceratum sit, ne hulceretur conseruari. Vitentur primum cibi sanguinem melancholicum efficientes, ijs utendum quibus cum cancro pugna est: ut cancris fluuiatilibus, polygono, scolopendrio, chelidonio minore (scrophulariam appellant) tertiageranij specie, quam herbam Roberti appellant, & hemionitide: harum herbarum decocto uinum diluatur. Humor melancholicus frequenter uacuandus, uere præsertim, & autumnò, materiam primum minuendo, eam

Causa.

Signa.

Vitus
ratio.

V

deinde

DE MORB. INTER. CVR.

deinde concoquendo, & uacuando hunc in modum. Recipe cathol. trypherae Persicae, ana unc.ß. serapij uiolacei unc.ß. decocti rad. buglossi, & scolopendr. unc.iiij.ß. fiat potio, quæ sumatur manè horis quatuor ante pastû.

Recipe quinque herbarum capil. herbae Roberti, chelidonijs minoris, uerbasci, buglossi cum rad. summitatum lupi salictarij, fumariæ, ana M.i. foliorum solani (propric- tate occulta discutit humorem cancri) intybi satiui latioris non loti, ana M.i.ß. uuarum passarum mundatarum unc.i. trium florum communium ana P.i.ß. polypodij quer. unc.i. foliorum sennæ oriental. drac.vi. epithymi 3. iij. (hæc humores ustos mundificant.) Decoquantur in s.q. aquæ ad usque dimidij consumptionem. accipiatur iuris decocti lib.i.ß. saccharo dulcedo inducatur, fiatq; serapium mediocriter coctum, quod depurctur, & adiectis 3. ij. santali citrini, & drach.i. pul. diarrhodi abb. suauiore, & sapore, & odore reddatur. Eo utetur ieiuna manè diebus quinque: Est autem hoc apozema ad humores acres accommodum.

Aut sic.

Recipe serapij de buglossi unc.ij. serapij de fumaria, unc.i.ß. serapij uiolacei unc.i. stillatitiorum liquorum lupi salictarij, solani, & intybi lati folii, ana unc.iiij. Miscantur, & à ieiuna per triduum diluculo sumantur.

Recipe diarrhod. abb. 3.ß. utatur cum serapijs. hunc in modum deinde purgetur. Recipe cathol. trypherae Persicae, an. unc.ß. compositionis hamech 3. iij. serapij uiola. 3.ß. com. decocti 3. iij.ß. adiectis epithymi 3. ij. folliculorum sennæ oriental. polypod. quer. ana 3.ß. fiat potio quæ sumatur ad auroram.

Aut

Aut sic.

Recipe pil. indarum 3.i. ex stillatitio liquore buglossi fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

Recipe conserua rad. buglossi, conserua rosa. an. 3.ij. Misceantur, & postridie manè ieiuno uentriculo sumantur. Medio autem tempore utatur elect. sequenti. Recipe cathol. 3.ij. tryphera Persica 3.i.β. cōpositionis hamech 3.β. diasennæ 3.ij. rhaba. selecti 3.i.β. in sero caprino, aut stillatitio liquore intybi satiui latioris macerati. Omnibus his serapio uiol. exceptis fiat elect. molle, de quo sumatur castanæ instar manè quatuor, aut quinque horis ante pastum bis in mense, domiq; maneat laborans eo die. Præterea semel in hebdomada feri caprini 3.vi. bibat, in quibus, epithymi 3.ij. follicul. sennæ 3.β. macerata fuerint horis xii. et expressa. Et hoc quidem tātisper dū feri caprini copia esse potest. Topica dein præsidia admouenda. Recipe succi solani subsidendo depurati, aut stillatitij liquoris eiusdem 3.vi. plumbi usti (dissoluit, & in frigidat humores ustos, reprimatq; ut alia mineralia) 3.ij. thie preparatæ 3.i.β. diu agitentur in mortario plūbeo, pistillo plumbeo, & fiat iniectio in uterum. Recipe cerussæ lothæ, litharg. plumbi usti, an. q.v. terantur in mortario plumbeo, pistillo plumbeo, oleo rosacco adiecto, fiatq; in modum unguenti, quo ægra ungatur infra umbilicum, aut ubi durities apparet. Conueniunt autem prædicta tam cancro hulcerato, quàm non hulcerato. Sequens autē iniectio cancro hulcerato maximè cōuenit. Recipe herbae Roberti, uerbasci, scabiosæ, chelidonij minoris, anethi, stercoris humani ana q.v. comburantur. de cinere autem accipiantur drach. iij. quæ stillatitij liquoris scæ

V 2 lani

DE MORB. INTER. CVR.

lani unc. vi. excepta, in mortario plumbeo, pistillo plumbeo agitentur, deinde in uterum iniiciantur. Vnguenti quoque prædicti ʒ. ʒ. stillatitij liquoris solani ʒ. vi. excipiatur, & in uterum iniiciatur.

PRURITVS, SEV PRIAPISMI

uteri Curatio. Cap. XXX.

Est insatiabilis quædam coeundi cupiditas, quæ coitu non exstinguitur, at quò magis mulier ita affecta coit, & coeundo fricatur, cò magis ardor ille augetur, frictione illa irritatis humoribus pruritus illum gignentibus, & tantò magis ad uterum confluentibus. *Causa.* Oritur autem uel à pituita uisita, quod indicat humor ex utero defluens, si alius quidem est, ad obscuritatem declinans. Aut à bile uisita, quod humor quoque ex utero defluens ostendit, si luteus siue citrinus est, ad obscurum itidem declinans. Aut à sanguine, quod ex ipsius humoris defluentis sanguineo colore cognoscitur. Aut ab humore melancholico, quod ex humoris atro colore cognoscitur. In summa, uisiti humores huius affectus in causa sunt. Si sit à sanguine uisito incidatur uena media, aut iecoraria cubiti, sanguisq; pro laborantis uiribus detrahatur. Materia autem, & concoquatur, & uacuetur, ut mox cum est à bile uisita dicetur, electa. de succo rosa. sublato. Si à bile uisita, uenæ sectione nihil opus, materia uerò concoquatur, atque uacuetur hunc in modum. Recipe serap. uiol. serapij acetati simpl. (hæc bilem respiciunt) serapij de bugl. hoc uisitionem respicit) an. ʒ. i. ʒ. stillatitiorum liquorum lupi salictarij, intybi satiui latioris, cichor. ana ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuna per triduum diluculo bibantur.

Recipe elect. ex tribus santalis ʒ. ʒ. Utatur cum serapijs.

pijs. Recipe rhabarb. select. ℥.iiij. follicul. sennæ ʒ.ʒ. oxyphœnicæ ʒ. vi. Maccarentur in stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, & buglos. horis xii. deinde exprimentur, adiectisq; serapii rosa. de infusione ros. ʒ. ij. elect. de succo ros. ʒ. i. stillatitiorum liquorum cichorii, & lupi salictarii ʒ. iiij. ʒ. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe conseruæ ros. conseruæ bugl. ana ʒ. ii. Misceantur, & postridie mane sumantur ieiuno uentriculo. Si uerò sit à pituita uisita, materia concoquatur, et uacuetur hunc in modum. Recipe serapii de duabus rad. mellis rosacei col. serapii de fumaria, ana ʒ. i. ʒ. stillatitiorum liquorum melissophylli, lupi salictarii, bugl. ana ʒ. iiij. Misceantur, & à ieiuna per triduum diluculo bibantur. Recipe diarrh. abb. ʒ. ʒ. utatur cum serapiis.

Recipe cath. drach. vi. diaphœ. compositionis hamech, ana drachm. i. ʒ. serapij de buglos. ʒ. ʒ. com. medicinarum decocti (adiectis polypod. quer. folli. sennæ, ana ʒ. iiij.) q. s. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe theriacæ ueter. ℥. ii. conseruæ buglos. conseruæ ros. an. ʒ. i. ʒ. Misceantur & postridie mane sumantur sex horis ante pastum. Si uerò sit ab humore melancholico adueto, hunc in modum concoquatur, & uacuetur. Recipe serapij de buglos. ʒ. iiij. serapii de fumaria ʒ. i. ʒ. stillatitiorum liquorum lupi salictarii, buglos. melissoph. ana ʒ. iii. Misceantur, & à ieiuna per triduum diluculo bibantur.

Recipe diamoschi dulc. ʒ. ʒ. utatur cum serapiis. Recipe cathol. ʒ. vi. compositionis hamech. ʒ. iii. serap. de buglos. ʒ. ʒ. com. medicinarum decocti q. s. adiectis folliculo. sennæ, polyp. quer. ana ʒ. ʒ. epithymi ʒ. ii. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe conseruæ rad.

V 3 buglos.

DE MORB. INTER. CVR.

Eugloss. ʒ.β. sumatur post ridie manē. Præsidia deinde topica, quæ sequuntur, adhibenda sunt, quando à pituita salsa in uteri cavitae existente hoc malum oritur. Recipe lithargy. cerussæ lotæ, an. ʒ. iij. plumbi usti scorie argenti, an. ʒ. i.β. mastich. libani, ana drachm i.β. puluerentur, & in mortario plumbeo pistillo plumbeo agitentur, adiectis oleo ros. & aceto, albo, non simul, sed alternis, repetitis uicibus, donec unguenti formam induat: deinde adde argenti uiui hominis ieiuni saliuæ extincti, drach. iij. stercoris muris drach. ij. accipiatur huius unguenti ʒ.β. stercoris muris ʒ. ij. dissoluantur in ʒ. vi. sequentis decocti, deinde in uterum inijciantur per dies complures, manē, & uesperī. Decoctum autem hunc in modum fiat.

Recipe lapathi acuti, fumarie, maluarum, scabiosa, oxalidis, solani, pentaphylli, betæ, ana M. i. Decoquantur, fiatq; ut dictum est. Vitis quoque lachrymæ manantes cum uites putantur, in uterum iniectæ conferunt. Succorum quoque saxifragiæ, lapathi acuti, saluiæ, intybi satiui latioris ʒ. vi. utiliter inijciantur, adiectis stercoris muris ʒ. ij. Materia autem huius mali causa, calida ualdē, & biliosa existente, commodē inijcientur ʒ. vi. succi solani, aut lactuæ, aut portulacæ, aut intybi satiui latioris. Sequentia quoque cupiditatem illam immoderatam cocti, aut tollent, aut certē murum in modum mitigabunt.

Recipe succi foliorum salicis, succi lactuæ, ana unc. iij. stercoris muris ʒ. ij. misceantur deinde in uterum inijciantur. Betæ quoque succus iniectus hanc ad rem utilis. Sumantur autem hæc. Recipe pul. nymphææ ʒ. i. excipiat serapio de papauero, aut succo foliorum salicis, & ante pastum bibatur.

Aut

Aut sic.

Recipe caphuræ ℥.i. excipiatu aliquo prædictorum succorum, & bibatur. Succus quoque syncerus foliorum lactucæ, aut foliorū salicis, aut intybi satiui latioris, aut portulacæ manē à ieiuna sumptus, pruritum illum, tēti- ginemq; mirifice extinguit, ac deiecit. Si uerò delicatæ fuerint, ex prædictis succis serapia hunc in modum præ- rentur. Recipe succi lactucæ, succi foliorum salicis, suc- ci portulacæ, succi intybi satiui latioris ana unc. ij. adie- cto sacchar. fiat serapium probe coctum, quod depure- tur, adiectaq; caphuræ ʒ.β. eius uires augeantur, matuti- nis horis à ieiuna per dies complures sumatur. Inferius suffitus fiat ex uitice. Vitex quoque, & uerbena, cubi- li in quo cubat, insternantur. Renum præterea regio fri- gide manē, & uesperī sequenti unguento ungatur. Re- cipe cerati albi Gal. ʒ. iij. caphuræ ℥.β. Misceantur, fi- atq; ut dictum est. Lamina quoque plumbea perforata su- per renes feratur.

RELAXATIONIS DYDIMI CV.

ratio. Cap. XXXI.

SI omentum, aut intestinum sine fæce (nam quando cum stercore omento rupto descendit, exitiale est) in scrotum descendat, ob solam extentionem, resupinato ægrotante diductis cruribus, intestinum sensim reducere, atque reductum idoneis uinculis retinere oportet. Co- Signa. gnoscitur autem ob solam laxationem hoc mali continge- re, quando non uniuersim, sed particulatim tēporis spa- tio, & ob causas quaslibet intestinum deuoluitur, tumor æquabilis, et profundus apparet, intestino, quod deuolu- tū est, à peritoneo constricto. Si autem, quod plerunque

DE MORB. INTER. CVR.

contingit, loca scroto, aut inguini uicina magnis doloribus cum inflammatione affligantur, torminaq; , & flatus superuenerint, atque ideo intestina reductioni non obtemperent, emollientia, flatusq; dissoluentia, ac inflammationem, doloremq; leuantia balnea, aut fomenta adhibeantur, ex decocto maluarum, altheæ, chamæmeli, seminum lini, & fœnogr. Porro priusquam intestini reductio tentetur, agrotantem hunc in modum uacuare summè conferet. Recipe mel. ros. col. unc. iii. serapii ex cotton. unc. i. ß. serapii conseruationis corticis citri ʒ. i. stillicitiorum liquorum absinth. peculi ros. plantaginis, ana. unc. iii. Misceantur, fiat zuparium depuratum, quod adiecta nucis moscat. & caryophyllorum, ana drachm. i. ori suauius reddatur. Eo utetur agrotans ieiunus diluculo per triduum. Recipe pilul. de quinque generibus, myrobalanorum, pil. aggregatiuarum, pil. de agar. ana ʒ. i. excipiantur succo cotoneorum, finganturq; pil. quinque, quæ circa noctis dimidium sumantur.

Aut sic.

Recipe comm. medicinarum decocti ʒ. iiii. in quibus macerentur horis xii. myrobalanorum empeliticarum confricatarum ol. amygdal. dul. ʒ. iii. myrobal. flauarum similiter confricatarum ʒ. ii. lento deinde igni fricentur, & colentur, adiectisq; cathol. ʒ. ß. rhabar. puluerati ʒ. i. spicæ nardi gr. v. diaphœnici ʒ. ii. mel. ros. col. ʒ. ß. fiat potio, quæ sumatur in aurora. Recipe theriacæ ueter. ʒ. i. conseruæ ros. antiquæ ʒ. ii. Misceantur, & postridie manè sumantur sex horis ante pastum. Vacuato laborante, intestinum, ut dictum est, reducatur, reductumq; , emplastro prius constringente, ac glutinante admoto, idoneis uinculis

uinculis retineatur. Emplastrum autem huiusmodi sit.

Recipe emplastri contra rupturam unc. iij. emplastri de mastiche 3. iij. lapidis magnetis unc. ij. subigantur cum oleo ex cotoneis, & pauco terebinth. formetur ceratum, de quo sumatur quantum satis esse uidebitur ad emplastri loco laeso conuenientis formationem, quod in pelle arietis impositum alligetur, subligaculo deinde constringatur, nec ante diem nonum soluatur. Nono quoque die mutetur, recēsq; emplastrum admoueatur. Quiescat interea agrotans, & per dies xxx. in lecto iaceat, abstinens à motu uehementi, uino copiosiore, cibis flatuosiss, à clamore, & tussi. Cum aluum exonerabit, manu subligaculum comprimat. Prætereà summopere admittendum, ne aluus indurescat. Dum enim nimio conatu stercora excernuntur, intestinum delabitur. Utatur igitur pil. sequentibus, quæ laxant, & astringunt. Recipe pil. aleph. pil. de bdel. an. 3. ij. rhab. selecti 3. i. excipiantur melle ros. finganturq; pilul. vi. è drachma, è quibus sumantur tres per horam ante coenam bis in hebdomada. Si contigerit aluum astringi, sumatur bolus unus cas. per horam ante pastum.

Utatur & electario sequenti.

Recipe conser. symphyti unc. iij. corticis citri saccharo conditi, conser. ros. antiquæ, ana unc. i. polygonati utriusque plantaginis, iacæ albæ, & nigre, ana drac. iij. ualeriana, pimpinellæ, ana drach. ij. ʒ. nucum cupressi, nucis moschat. cinnamomi, rhabarbari torrefacti, ana 3. ij. thuris, mastich. sanguinis draconis, mumie, boli Armeniæ, terræ sigillatæ, an. 3. i. ʒ. limaturæ chalyb. unc. i. ʒ. subigantur cum serapio conseruationis myrobalanorum

V s empea

DE MORB. INTER. CVR.

empeliticarum, fiatq; electarium molle, de quo sumat in
star nucis quotidie manè cum uino crasso.

CALCVLI RENVM CVRATIO.

Cap.

XXXII.

CAlculus in renibus hominum ætatis prouectæ fre-
quenter, in puerorum renibus rarenter gignitur:
causa. Cuius causæ duæ sunt, una quidē, quæ est, ut ma-
teria, altera, ut efficiens. Humor crassus, uiscidus, & ter-
reus ab assiduæ cruditatibus coaceruatus, est ueluti mate-
ria: ardor, igneave caliditas renum humorem illum cras-
sum, & pituitosum adassans, & cogens, atque in lapidē
indurans, est ueluti efficiens. Pro ratione autem magni-
tudinis uentriculorū, qui sunt in renibus, calculi aut par-
ui aut magni gignuntur, aut plures, aut pauciores, inter
se colore, forma, leuitate, aut asperitate differentes. Qui
forma rotundi sunt, & leues, omnium facillimè excutiu-
tur, alia forma prædicti difficulter, omnium difficillimè
qui oblongi, & asperi sunt.

Signa.

Grauis dolor, aculeiq; infixi sensum præbens, nul-
lo foris apparente tumore, calculum in renibus comita-
ri solet. Vomitus, & nausea urgent. Id quod & in co-
lico dolore contingit: sed ab eo distinguitur, quòd in co-
lico dolore post cibum dolor augetur: in calculo minui-
tur. Præterea in calculo circa dorsum dolor est fixus:
in colico dolore circa uentrem & abdomen, nec fixus
stabilisq; magna ex parte est. Crus eiusdem lateris cum
rene patiente stupet in nephritide. Vrina circa ob-
structionis initium aquosa, paucaq; meijtur: obstru-
ctione autem perfecta, prorsus supprimitur, excremen-
ta retinentur, frequens tamen, sed inanis, egerendi cupi-
ditas

ditus adest. Calculo è renibus emoto, urina subsidentiam arenosam, habet. Et sanguis plerunque excernitur, ob uiolentiam uidelicet asperioris calculi excussi.

Curandi ratio à doloris mitigatione auspicienda. Vita
da autem inter initia solutiua fortia, atque diuretica. Curandi
ratio.
Nam solutiua fortia humores agitant, qui agitati ad renes decumbunt, doloremq; augent. Diuretica uerò, uentri-
culi humores, & intestinorum ad renes dirigunt, unde et
dolor augetur. Aluo non ut conuenit excrementa deiciē-
te, enema leniente, & emolliente ducatur, hunc in mo-
dum. Recipe altheæ cum radic. maluarum, uiolariæ,
brassicarum, ana M. i. ficus pingues vi. mixa. vii. florum
chamæmeli, & meliloti, ana P. i. s. surfuris in linteo liga-
ti M. s. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias: accipiantur
iuris decocti ʒ. x. cas. recens extractæ unc. i. butyri recen-
tis ʒ. ij. olei com. ʒ. ij. salis parum. Commistis omnibus fiat
enema, quod ante pastum infundatur, quoties ægrotan-
tis aluus astricta fuerit. Enemata hoc in affectu, quanti-
tate solito minore esse debent, ne renes comprimant, do-
loremq; augeant. Quare si balanis fæces educi possint,
potius immittantur, quàm enema infundatur. Aluo ua-
cuata, si ægrotantis robustum, corpus fuerit, & plenitu-
dine laborans, sanguis è uena poplitis cruris stupentis,
quod est è directo patientis renis mittatur, ne sanguinis
multitudo ob dolorem, & tensionem in particulam pa-
tientem procumbens dolorem augeat. Si uerò cacochy-
um fuerit, uitioso humore abundans, purgetur. Cæte-
rum calculo laborantes flatu in intestinis habent, qui re-
nes comprimentes, dolorem augent, sequenti igitur inie-
cto clystere discutiantur. Recipe maluarum, helxines,
anethi,

DE MORB. INTER. CVR.

anethi, meliloti, ana M.i. florum chamæmeli P.ij. semi.
anisi, cari, & fœniculi, an. 3.ij. Decoquantur in s.q. aquæ
ad tertias: accipiantur iuris deco. 3.x. olei chamæm. olei
anethi, an. 3.ij. benedictæ 3.ß. Commistis omnibus fiat ene-
ma, quod ante pastum iniiciatur.

Aut sic, & præstantius est.

Recipe olei chamæmeli 3.viiij. fiat enema, quod iniicia-
tur, ut dictum est. Perseuerante in renibus ob calculum do-
lore, sequenti fotu, renum regio foueatur. Recipe al-
theæ cum rad. maluarum, an. M.i.ß. helxines M.ß. florũ
chamæmeli, & meliloti (ista sunt anodyna. Nam quæ-
cunque habet calorem temperatum, anodyna uera sunt:
quoniam naturali calori sunt conforma, ipsumq; dele-
ctant,) ana P.i.ß. seminum lini, & fœnogr. ana 3.iiij. De-
coquantur in s.q. aquæ, spongiæq; in decocto madefacta,
& expressa, foueatur renum regio: ut dictum est. Dein-
de sequenti unguento ungatur. Recipe butyri recen-
tis, olei amygdal. dulc. axungie gallinæ, uel anseris, ana
3.i.ß. olei de lilio (nam emollit.) 3.i. olei scorp. 3.ß. His
commistis renum regio calidè post fotum per dies com-
plures ungatur. Peractis his, si dolor fixus permaneat, cu-
curbitula super renes affigatur, deinde alia paulò infe-
rius, alia, atque alia deinceps paruis interuallis oblique
usque ad inguina, ut sic calculus in uesicam descendat. Po-
stremò perseuerante dolore, calculoq; è renibus non emo-
to, lauetur ægotans in balneo ex decocto proximè di-
cto. Mitigato dolore, quod fieri debet prius, quàm lapi-
dem expellentia, & comminuentia exhibeantur, uentri-
culus expurgandus, & uie, quæ sunt ad renes, ne humo-
res alij unà cum medicamentis lapidem comminuentibus

sum=

sumptis ad renes descendant. Purgentur igitur & uentri-
culus, & uia hunc in modum. Recipe uuarum passa-
rum mundatarum, carycarū pinguium, glycyrrhi. ana
℥.ss. adianti recentis P. i. ss. trium flor. communium, an. P.
i. quatuor semi. frig. maior. an. ℥. i. ss. mixorum ℥. ij. Deco-
quantur in s. q. aquæ usque ad dimidij consumptionem: ac-
cipiantur iuris decocti ℥. iiij. cas. recens extractæ ℥. i. sera-
pij uiol. ℥. ss. Commistis omnibus fiat potio, quæ sumatur
in aurora. Prandeat ægotans sumpta potione hora soli-
ta, siue operata fuerit, siue non. Ante cœnam autem, si
nihil operata fuerit, utatur enemate sequenti. Recipe
iuris pulli ℥. x. cas. unc. i. mellis ros. co. ℥. i. ss. ol. communis
℥. iiij. salis parum. Commistis omnibus fiat enema, quod
ante cœnam infundatur. Mitigato dolore, uentriculo, et
uijs expurgatis, ea exhibeantur, quæ calculum expellūt,
& comminuunt hunc in modum. Recipe lithontripon-
tos ℥. iiij. sumatur drach. i. ss. manè horis quatuor ante pa-
stum cum iure cicerum rub. aut uino albo, aut uino arui-
sio, aut cum decocto radicis graminis. Similis quantitas
de Iustiniano sumpta idem præstabit. Laborans autem
si ualde extenuatus sit, renesq; siccos habeat, addatur ℥.
iiij. lithontripontos seminis papaueris albi, & seminis
melonum ana. ℥. i. Renum regio, & calidè, & sæpe unga-
tur oleo scorp. composito.

DE PRAECAUTIONE CALCULI

li. Cap. XXXIII.

Calculo comminuto, & expulso, danda opera, ne
rursum in renibus generetur, quod fiet, si renum
caliditatem augentia, & crassos, uiscidos. glutin-
ososq; humores generantia uitentur. Sint igitur cibi
boni

DE MORB. INTER. CVR.

boni succi, concoctu faciles, & moderati. Dura substantie cibi, qui manducando aigre conteruntur, uidentur. Legumina, frumentacea, caseus, lac, et quaecunque ex lacte preparantur obsonia, uidentur. Omnia denique quae succi sunt crassi, nimiumque calidi, & acris. Vino utendum tenui, & albo. Exercitium sit mediocre. Omnia urinam citentia, siue sint cibi, siue medicamina, conferunt. Vitentur praeterea renes extrinsecus calefacientia, ut culcitra plumea, pelliceae uestes, & alia id genus. His obseruatis, quos calculus affligit, ne rursus affligantur, hunc in modum Vere & Autumno purgandi. Recipe serapij adianti ʒ.ii. oxymelitos simpl. ʒ.i. ʒ. serapij intybi satiui latioris ʒ.i. stillatitiorum liquorum, lupi salictarii, cicho. graminis, ana ʒ.iii. Misceantur, & a ieiuno per triduum diluculo bibantur. Recipe diarrhodi abb. ʒ.ʒ. utatur cum serapiis. Recipe pil. agregat. ʒ.ii. pil. de agar. drach.ʒ. Excipiantur stillatio liquore adianti finganturque pilul. v. quae circiter noctis dimidium sumantur.

Aut sic.

Recipe cas. recens extracta ʒ.ʒ. diaphoenici ʒ.ii. elect. de succo rosa. ʒ.iiii. serapii adiant. ʒ.ʒ. Excipiantur unc. iiii. communis medicinarum decocti. fiatque potio, quae sumatur ad auroram. Recipe diarrhodi abb. tessellam unam sumatur postridie mane. Temporibus intermedijs utendum sequentibus pil. Recipe pil. de hiera simp. aloelota in stillatio liquore intybi satiui latioris drach.ii. agar. recens in pastillorum formam redacti ʒ.i. ʒ. rhab. selecti ʒ.i. Excipiantur serapio rosa. purgatorio, finganturque pil. vi. e drachma, e quibus sumantur tres per horam ante coenam semel in hebdomada. Aestiuo autem tempore

pore sumat bolum ex cas. 3. i. cum baccis quatuor oxyacanthæ, loco pilularum, horis quatuor ante pastum mane. Sumat præterea semel in mense 3. i. 3. terebinth. lotæ in stillatitio liquore halicacabi, æstate excepta, horis quatuor ante pastum. Renum quoque regio ungenda sequenti cerato. Recipe cerati albi Gal. 3. iiii. 3. ol. uiol. unc. ii. His commissis ungatur regio renum frigide, in lecti ingressu, bis in hebdomada.

CALCVLI VESICAE CVRATIO.

Cap.

XXXIIII.

Calculus interdum à renibus in uesicam descendit, ibiq; ob crassitiam retinetur, & temporis progressu augetur, alijs humoribus crassis, & lentis, qui se illi in uesica coniungunt, induratis. Cognoscitur autem à renibus profectus, quando in renibus, ut Capite proximo superiore dictum est, dolores præcesserunt. Generatur & in uesica, sed pueris frequentius, quàm ætate prouectis, ob crassitiam urinae ipsorum, & calorem. Voraces enim sunt, cibis utcunque oblatis utentes, siue sint utiles, siue noxii, sæpe priore cibo nondum concocto alium ingerentes, hora cibum sumendi neque certa, neque ordinata seruata. Perpetuò præterea mouentur, efficitq; motus eorum uehementior, præsertim à cibo, ut crudus, & incoctus chylus in uenas distribuatur. Cum autem ob mollitiem eorum corpora facile cedant, obturatio circa renes non fit, ceterum urina in uesicæ amplitudinem crassissima fertur, quæ ibidem ueluti uini fæx, aut aquæ limus subsedit. Quod autem subsedit, ob caliditatem, quæ in pueris multa est, desiccatur, ac lapidescit. Circa initia generationis lapidis, urina aquæ similis est,

iis

DE MORB. INTER. CVR.

in eaq; subsident sabulosa quædam, ubi iam genitus est, urina alba est, & tenuis sine sedimine ullo, grauitasq; in perinæo, & pectine. Vesicæ calculo laborantes crebrò pruriunt, pudendaq; scalpunt, eaq; uel laxa, uel præter rationem intenta. Calculus autem nonnunquam in uescæ ceruicem incidit, repenteq; urina supprimitur. Quod ubi contigit, supinus laborans ita figurandus est, ut crura reliquo corpore multò sublimiora sint, deinde multifariam concutiendus, ut lapis ex meatu recedat. Quibus peractis, si nihilominus urina supprimitur, ænea, aut argentea fistula, aut candela cerea demissa, lapis à uescæ ceruice repellatur, urinaq; cuocetur. Vbi igitur lapide in uescæ fundum detruso, laborans minxerit, dolorq; sedatus fuerit, foueantur pestes, & perinæum sequenti decocto. Recipe maluarum, althææ cum rad. ana M. iij. anethi, chamæmeli, melil. ana M. ij. semi. lini, & fœnogr. ana lib. ß. Decoquantur in aqua, coq; decocto partes dictæ frequenter foueantur. Aut in eo decocto ad umbilicum usque irrigetur, & lauetur. Aut embroca fiat ex eo decocto super pectinem. Deinde ungantur partes prædictæ unguento sequenti. Recipe olei amygdal. dulc. axungie gall. axungie cuniculi, ana unc. 3. i. ß. ol. de lilio, succi belxines, ana 3. ij. sang. hirci præparati 3. ij. commistis omnibus ungantur loca prædicta post fotum calidè. Si in raphanum cauatum ueretrum immittatur, lapidem, nisi magnitudo obstet, trahet. Quidā in raphano cauato crocum adiiciunt. Nec solum calculi causa hoc fiat: sed etiam in difficultate urinæ ob crassum, uiscidum, & glutinosum humorem, aut sanguinis trombum meatum obstruentem. Sumantur autem sequentia. Recipe cas. recens extractæ

tractæ unc. i. olei amygdal. dulc. drach. ij. Adiecto saccharo fingatur bolus, qui manè sumatur boris quatuor ante pastum. Quoties autem aluus, non ut conuenit, excrementa deiiciet, utatur emolliente enemate. Sumat & sequentem potionem ad lapidem pellendam. Recipe sanguinis hirci præparati ℥. ij. uel 3. i. serapij adianti 3. i. Excipiantur iure cicerum rub. aut decocto rad. apij, & graminis, fiatq; potio, quæ ad auroram sumatur. Aut loco sanguinis hirci detur 3. i. lithontripontos. Fiat præterea iniectio in uesicam ex oleo scorpionum composito, & oleo de lilio æquis portionibus commistis.

ARDORIS VRINAE CURATIO.

Cap.

XXXV.

VRinæ ardor interdum est sine hulcere, & sine caliculo, fitq; à sola caliditate acri urinæ, ob bilem cū ipsa permistam: ex qua quidem acrimonia sequitur interdum hulceratio, & renum, & uesicæ. Priusquam autem hulceratio fiat, acritudo illa ab urina remouenda tū uictus ratione opportuna, tum medicamentis tam sumptis, quam admotis. Abstinentium igitur ab aceto, à Causa. Vicius ratio. salsis, à speciebus acribus, ab omnibus denique acres humores gignentibus, ab omnibus diureticis, à uino albo & tenui, à quatuor seminibus frigidis, quæ licet sint frigida, diuretica autem calida, tamen diuretica sunt, & à tota substantia urinam euocant. Urinam autem euocantia in urinæ ardore nocent, urinam enim multiplicent, atque ita dolor augetur.

Curandi autem ratio ab humoris biliosi concoctione Curatio. cum urina permisti, & euacuatione auspicianda. Recipe serapii uiolacci simpl. 3. i. β. stillatitij liquoris intybi
X satiui

DE MORB. INTER. CVR.

satiui latioris 3.ii. stillatitij liquoris portulacæ 3.i. Misceantur, & à ieiuno diluculo sumantur. Repetantur autem alijs quinque diebus. Ardore autem uehementi existente sic concoquemus. Recipe serapij de portulaca unc.i. serapij de acetositate citri 3.ß. stillatitiorum liquorũ oxalidis, nymphæ, intybi satiui latioris, an. 3.i. Misceantur, & à ieiuno diluculo sumantur. Repetantur alijs quinque diebus. Perseuerante autem ardore, pro serapio de portulaca substituatur serapium de papauere. Recipe cas. recens extractæ 3.x. serapij uiolacei unc.i. stillatitiorum liquorum oxalidis, & intybi satiui latioris q.s. fiat potio, quæ sumatur horis quatuor ante pastum.

Aut sic.

Recipe manne granulosi unc.ij. stillatitiorum liquorum oxalidis, & nymphæ q.s. fiat potio, quæ sumatur horis quatuor ante pastum. Si uerò hæc pariem contulisse uideantur. sequens potio sumatur. Recipe myrobala. flauarum drach.ij. macerentur in decocto uuarum passarum, ex stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, et oxalidis facto, horis xij. deinde exprimantur, adiectisq; rhabar. pulucrati drach.i.ß. serapij ros. de infusione rosa. 3.i. fiat potio, quæ sumatur mane horis quinque ante pastum. Hoc in affectu non utendum medicamentis fortibus, nec acribus, nec compositis, quoniam maiorem acrimoniam inducunt, sed lenibus, & simplicibus. Vacuato corpore bilis reuellenda frictionibus, & leni uomitu. Fiat igitur lenis fricatio capitis, brachiorum, & scapularum ad reuellendam bilem ne defluat ad renes. Sudor quoque si fricando excitetur, confert. Vomitus lenis in corpore ad uomendum apto irritetur haustu aquæ tepidæ, & olei communis.

nis. Aluus quoque ne astringatur, sed semper mollis sit, excrementa, ut conuenit, deijciens, utendum igitur enemate sequenti semel aut bis in hebdomada. Recipe maluarum, altheæ, uiolarie, ana M.i. pruna xij. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias: accipiantur iuris decocti libr. i. ß. cas. recens extractæ ʒ. i. ol. uiolacei ʒ. iij. fiat enema, quod ante pastum immittatur: ut dictum est. Poterit & aluus sumpto medicamento sequenti loco enematis leniri. Recipe cas. recens extractæ ʒ. i. baccas oxyacanthæ iij. Adiecto saccharo fingatur bolus, qui mane sumatur horis quatuor ante pastum semel in hebdomada.

Aut sic.

Recipe cas. recens extractæ drach. vi. diapruni simpl. drach. ij. Adiecto saccharo fiat bolus, qui sumatur mane horis quatuor ante pastum semel in hebdomada. His peractis, membra ad calidum lapsa, quæ urinam ad calidum alterant, præcipue renes, & hepar, refrigerare oportet, medicamentis tam sumptis, quam admotis. Extrinsecus autem hæc admoueantur hepati. Recipe stillatitij liquoris intybi satiui latioris unc. viij. stillatitiorum liquorum rosa. & nymphæ, ana ʒ. iij. santali albi, & rubri, corallij albi, & rubr. ana drach. i. ß. seminum oxalidis, & portulacæ, ana ʒ. ij. spice nardi ʒ. ß. caphuræ (si inflammatio magna fuerit) gran. ij. aceti ʒ. i. fiat epithema hepatis tepide, mane, & uespere ante pastum. Epithemata, quæ cordi fiunt, aut hepatis, & si refrigerandi gratia fiunt, tepide tamen admoueri debent. Aut admotis sacculis hunc in modum paratis, refrigeretur. Recipe rosa. rubrarum, florum nymphæ, & uiolarum, an. P. i. ß. intybi satiui latioris quartam partem M. i. santal. albi et rubri,

X 2 ana

DE MORB. INTER. CVR.

an. 3. ij. seminum oxalid. portula. & intybi satiui latioris,
an. 3. i. spica nardi ʒ. i. Commistis omnibus, & in sericeo
panno rubro, & raro impositis, sacculus fiat semilunæ in
star, qui stillatitio liquore rosa. & intybi satiui latio. ir
rigatus, tepidè regioni hepatis applicetur manè ante pa
stum. Cùm autem friges fieri cœperit, auferatur: rursusq;
tepefactum admoveatur. Sequens quoque unguentum ad
hepatis alterationem, hoc est, ad infrigidandum, uim non
modicam obtinet. Recipe cerati santalini ʒ. iij. ol. rosa
cei, ol. nymphaeæ, an. 3. ij. spica nard. ʒ. β. Laentur hæc
(excepta spica nardi) in stillatitio liquore intybi satiui
latioris, hisq; commistis hepatis regio manè ante pastum
tepidè ungatur. Cauendum autem ne ab his infrigidanti
bus septū transuersum attingatur, etenim immobile red
deretur, fieretq; difficilis admodum respiratio. Si quando
tamen id contigerit, infrigidantia hæc omittantur, se
ptum autem transuersum calidis temperatis foveatur,
uerbi gratia, chamæmeli, & meliloti decocto. Quod si
hoc fotu in priorem habitum non restituatur, ei origani,
calaminthæ, stœchados Arab. ana M. β. addatur. Septo
transuerso curato, ad dicta infrigidantia redeundum. Re
nes autem extrinsecus admotis hunc in modum refrige
randi. Recipe unguenti Gal. unc. ij. cerati santalini ʒ.
i. Subigantur cum oleo ex cotoneis, hisq; regio renum fri
gidè ungatur, cùm lectum uesperis laborans dormiturus
ingredi uolet. Sumptis autem elect. sequentibus, tam he
par, quàm renes refrigerabuntur. Recipe santali al
bi & rubr. ana ʒ. i. santali citrini ʒ. ij. sacchari dissoluti
in stillatitio liquore ros. aut semperuiui (si calor intensus
sit) q. s. fiat elect. solidum in rhomborum figuram, sintq;
sin=

singuli ponderis 3.ij.ß. sumatur unus duabus, aut tribus horis ante pastum matutinis horis, quo deglutito, parum stillatitij liquoris intybi satiui latioris bibatur.

Aut sic.

Recipe conferuæ rosarum, conferuæ nymphaeæ, cōseruæ florum cichorij, ana unc. i.ß. seminum oxalidis, portulacæ, & intybi satiui latioris, an. 3.i. omnium santalorū, ana 3.i.ß. trochiscorum de caphura 3.iiij. Excipiantur serapio uiolaceo, aut nymphaeæ (si inflammatio magna sit) fiatq; elect. molle, de quo sumatur castaneæ instar, horis tribus ante pastum, eoq; deglutito, parum stillatitij liquoris intybi satiui latioris bibatur. Porro quoniam bilis ab hepate cum urina iā solita sit defluere, hepar quoque quantumuis temperatum sit, bilem generet, nec prohiberi possit, quin adhuc cum urina aliquid bilis feratur, medicamentis glutinosi, & mucaginosi uim humorū ad renes, uesicam, meatusq; urinarios transeuntium obtundentibus, hunc in modum utendum. Recipe seminis altheæ, seminis maluarum, seminis cotoneorum, ana 3.i. gummi tragacanthæ 3.iiij. macerentur in decocto rad. altheæ, seminum papaueris albi, & halicacabi, fiatq; mucago. de qua sumatur 3.i.ß. cum 3.iiij. prædicti decocti mane, per dies octo, aut nouem. Aut bibantur 3.iiij. aut iiij. lactis ouium acidi, à quo butyrofa pars separata sit, horis quatuor ante pastum. Lac deinde, quodcunque sit illud, tepidum per catheterem infundatur. Aut aqua albuminis oui diu agitati cum lacte & oleo uiolaceo commista. Aut loco aquæ albuminis oui, in ardore magno, mucago psyllij substituatur. Pudendis quoq; in uas lacte plenum aliquatisper immersis ardor magnus mitigabitur. Perinæū

DE MORB. INTER. CVR.

præterea, & uenter inter umbilicū, & pectinem ungatur ol. nymphae & rosa. æquis portionibus mistis. Perseuerante ardore, laetetur atque irrigetur in balneo ex decocto maluarum, uiolarum, lactuæ, & florū nymphae.

DIABETES CVRATIO.

Cap.

XXXVI.

Causa. **P**roprium hoc malum renum est, sit in multam inducens. Potus autem simul, ut assumptus est, & plerumque quali assumptus est, mox redditur. Huius origo mali ex retentricis renum facultatis imbecillitate est, attractricis uerò eorundem immodicè calentium tanto robore, ut uniuersum corpus ob calorem uehementem exhauriat. Hinc in toto corpore ariditas, & tandem mors. **Curatio.** Inter initia, si agrotans iuuenis sit, curabilis hæc quidem est passio, in sene nequaquam. Curatur autem iisdem remedijs, quibus urinae ardor, exceptis muccaginibus, iniectionibus, & unguentis, quæ circa perinaeum, & inter umbilicum, & pectinem admouentur, excepta quoque pudendorum in lacte immersione. Crassa in cibis conueniunt, ut oriza, & caro bubula.

HVLCERV IN RENIBVS CV-

ratio. Cap. XXXVII.

Causa. **H**ulcerantur renes aut ab acribus, et mordacibus humoribus in ipsos delatis: aut quoniam uenæ, quæ in ipsis sunt, ruptæ sunt: aut propter suppurationem inflammationis. **Signa.** Hulus autem in renibus cognoscitur ex dolore in lumbis cum grauitate. Pus quoque cum urina miscetur, quod à pure cum urina excreto ab hulcere uesicæ discernitur odore. Nam ab hulcere uesicæ foetet pus, ab hulcere renū non foetet. Vesica enim cum sit exanguis,

guis, & nerueæ substantiæ, pus concoquere non potest, ut renes. Pus præterea ab hulcere renū urinae primum permiscitur, deinde subsidet, & cum urina tantum exit: pus uerò ab hulcere uesicæ urinae quoque permiscetur, et subsidet, sed sine urina etiam exit. Pus etiam interdum ab hepate male affecto defluens, cum urina mistum excernitur, quod ab hepate esse deprehendere est facile, tum ex doloribus, qui in eo præcesserunt, tum ex ipso pure, quod cum urina permistum est ualde, nec unquam subsidet. Hulceratis præterea renibus carunculæ parvæ, aut ueluti pili una cum urina plerunque exeunt. Hæc ubi apparuerint, satietas, cruditatesq; uitandæ, ob multiplicationem excrementorum. Nihil edendum, quod crudum sit, aut ægrè concoquatur, aut corrumpatur facile, aut inflationes pariat, aut citò acescat. Vitandus aer calidus, ardorem enim urinae auget. Vitanda acida, acuta, & salsa, & quæcunque acrimoniam generant. Quare si citranguli apponantur, sine saccharo ne sint, ad tollendam aciditatem. Bilem gignentia auersetur laborans, ut sitim multam, inedia, laborem, iram, solitudinem, exercitationem uehementem (quæ facit ut humores motu agitati ad renes defluant) uigilias, species acutas. Somnus prolixior uitandus, quòd plura excrementa aggreget: sit igitur sex, aut septem horarum, non plurium. Nec super mollem culcitram plumeam cubet, sed quæ de goßipij lanugine facta sit. Renum quoque regio leuiter tecta sit. Vescatur pane recenti, & accuratè apparato, carnibus hœdinis, et id genus carnem teneram habentibus, piscibus saxatilibus, cancris fluuiialibus, amylo cum lacte cocto, lacte ouis permisto, iusculis caponum, gallinarum, pullorum gallinaceorum, ouis sorbilibus.

Victus
ratio.

DE MORB. INTER. CVR.

uuis passis, nucibus pineis, amygdalis decorticatis, et probe mundatis. Oleribus uti potest, sed coctis, intybo, portulaca, lactuca, & quæ simili sunt facultate prædita. Diuretica omnia uitanda, & uehementer dulcia. Insipida leuiter dulcia, & glutinosa, ut animalium pedes, ex usu sunt. Potus sit lac ouillum, aut caprinum, aut amygdalinum, aut uinum rubrum dilutum, si ferre potest, hordei, & glycyrrhizæ decocto. Frigidus autem potus ne sit, cum sit frigidum hulceribus inimicum. Coitus etiam perniciosus, præsertim si laborans ætate prouecta sit, aut natura imbecillus. Danda quoque opera, ut aluus lenis sit, & mollis, excrementa (ut conuenit) deiciens: quod fiet sumptis cibis aluum emollientibus, ut prunis, quæ sicut cibi omnes uentrem lenientes per quartam horæ partem ante cibum sumi debent: aut balanis immixtis, aut enemate infuso, hunc in modum parato. Recipe maluarum, althææ, uiolariæ, acanthi, an. M. i. prunæ x. hordei M. ss. Decoquantur in ss. q. aquæ ad tertias: accipiantur iuris decocti lib. i. ss. cassia recens extracta, sacchari rub. ana ʒ. i. olei uiol. unc. iij. Cum mistis omnibus fiat enema, quod ante pastum infundatur. Hoc autem enemate utetur, quoties aluus astricta uidebitur. Vomitus etiam irritandus, potu aquæ tepidæ, & olei communis ante pastum quo solo remedio sæpe repetito hic affectus interdum curatur. Nam uomitus humores ad renes defluentes reuellit, et auertit. Humores deinde, qui cum urina miscentur, concoquantur, & euacuentur. Recipe serapij uiolacei, serapij de portulaca (cuius defectu geminetur serapium uiol.) serapij de glycyrrhizæ, an. ʒ. ss. stillatitiorum liquorum fumarizæ, oxalidis, an. ʒ. i. Misceantur, & à ieiuno sumantur. Repetantur alijs quinque diebus:

lus. Recipe cas. recens extractæ 3. i. mixorum 3. ij. baccas oxyacanthæ (cas. ardorem tollit) aut oxyphœnicas iiij. aut v. seminis althææ 3. β. Adiecto saccharo fingatur bolus, qui manè sumatur, horis quatuor ante pastum. Potest etiam sumi per horam unam ante pastum. Hoc bolo utatur laboras semel singulis hebdomadibus. Cuius aluus si facile laxetur, exhibeatur cas. 3. β. non autem 3. i. & cas. loco, exhiberi potest 3. i. β. mannæ granulosi. Hoc in affectu medicamentum solutivum lene debet esse: Nam fortia humores agitent, fieretq; ad renes maior defluxus. Et bolum præstat exhibere, quam potionem, quod potio facilius ad renes means quam bolus, arimoniam auget. His peractis, hulnera à pure purificanda sunt, deinde glutinanda. Purificabuntur autem sumpto manè hordei decocto cum glycyrrhiza ante pastum. Aut sumptis unc. vi. feri capri cum saccharo albo. Mundatis autem, & purgatis hulneribus, quod palam sit, pure nullo cum urina exeunte, aut certe per paucos, & eo sub albo, leni, & æquali, tunc resicantia, astringentia, & glutinantia medicamenta exhibere oportet. Utatur igitur ægrotans lacte ouillo, aut uaccino, cum bolo Armenia, & sang. dracon. manè horis quinque ante pastum. Trochisci autem sine opio à Gordiano in Capite de Renum ulceribus traditi, adhuc affectum utiles admodum sunt. Siquis enim hulus renum purificare magis, quam glutinare uelit, trochiscum quotidie manè cum hordei decocto, aut lacte caprino dissoluat, & bibat. Contrà uerò, si glutinare magis, quam purificare hulus uelit, trochiscum in lacte ouillo dissoluat. Pus uerò si crassum fuerit, dissoluatur trochiscus in aqua mulsa, cum qua parum decoctum sit spicæ nardi, & hyssopi.

DE MORB. INTER. CVR.

Gordonii trochisci.

Recipe quatuor seminum frigidorum maiorum mundatorum, seminis papaveris albi, seminis maluarum, seminis gussipij, seminis portulacæ, seminis cotoncorum, baccarum myrti, tragacanthæ, gummi Arab. nucum pinearum mundatarum, pistaceorum, penidiarum, glycyrrhizæ mundatæ, mucaginis psyllij, amygdalarum dulcium, hordei mundati, ana drach. ij. boli Armeniæ, sanguinis draconis, spodij, rosarum, myrrhæ, ana unc. ß. Excipiantur hydromelita, & fingantur trochisci, qui sint singuli ponderis 3. ij. qui, cum uti uoles, dissoluantur, ut dictum est.

HVLCERIS VESICAE CVRATIO.

Cap. XXXVIII.

Hulcus esse potest, aut in uesicæ profundo, amplitudineq; aut in eius ceruice, iuxta urinæ meatum.

Signa.

Cognoscitur autem hulceratio in uesicæ amplitudine, ex dolore perpetuo, qui circa pubem sentitur: in uesicæ uerò ceruice hulcus si fuerit, tempore mictionis tantum, & potissimum ubi meiere aut cœperint, aut desierint, dolor percipitur, qui quantò urina est acrior, tantò est maior. Hulcerato uesicæ profundo, plerunque pelliculæ tenues instar foliorum, & lamarum cum urina excernuntur. Si hulcus serpendo depascat, præsertim in uesicæ ceruice, subcruenta excernuntur, & saniosa, & foetentia. Accedit urinæ difficultas, pudendorumq; arrectio, ac petulantia. Si sordidum hulcus fuerit, feculenta meiendo excernuntur, & muccosa, crassamq; subsidentiam urina instar farine habet. Hulcera in uesicæ profundo incurabilia, aut certè sunt curatu difficillima: tum quia uesica

ca

a nervosæ est substantiæ, tum quia urina, quæ ferè acris
 est, ea semper contingit, atque erodit, nec glutinari per-
 mittit. Nunquam enim uniuersa c' uesica euacuari po-
 test urina, cumq; eius copia meiando excreta est, uesicæ
 in sese concidentis partes omnes cōtingit id urina, quod
 relictum est. Cæterum cum uideamus multa aliquando
 præter spem euenire, huius mali curationem aggredi o-
 portet, ut si non prorsus tolli, dolores saltem unde & fe-
 bres, & uigiliæ oriuntur, minuantur. viſtus
ratio. Viſtus ratio ead-
 dem sit cum ea, quæ in renum exulceratione est tradita,
 lactis potus huic malo remedium est eximium, asperita-
 tes. n. lenit, hulcerationes eluit, abstergit, & glutinat.
 Aluo non (ut conuenit) excrementa, sua spōte deſciente,
 sequens enema infundatur, prono laborante, et in genua
 reclinato. Recipe caput ueruecis, decoquatur in aqua us-
 que ad osium separationem, accipiantur iuris decocti li-
 br. i. β. uitelli ouorum duo, commisceātur, fiatq; enema si-
 ne sale. Si uerò cum hulcere uesicæ flatus in intestinis con-
 tineantur, quod interdum contingit, addantur lenia ali-
 qua flatus dissoluentia, uerbi gratia, florum chamæmeli,
 & melilo. an. M. i. Decoquantur autem cum capite uerue-
 cis. Præterea semel in hebdomada sumatur bolus sequēs.
 Recipe cas. recens extractæ ꝑ. i. baccas oxyacanthæ iiij.
 mixorum ꝑ. ij. adiecto saccharo fingatur bolus, qui manè
 horis quatuor ante pastum sumatur. Quo sumpto, ne dor-
 miat. Sumpto enim medicamento leni & debili solutiuo,
 dormiendū non est, ne natura, quæ somni tēpore intrinse-
 cus est fortior, quàm in uigilijs, tãquam nutrimentū me-
 dicamen in suam substantiam conuertat. Medicamen au-
 tē si acre, forteq; fuerit, siue sit potio, siue bolus, siue pil-

DE MORB. INTER. CVR.

eo sumpto, dormiat egrotans. Solutium autem medicamentum non operatur, nisi reducat de potētia ad actū à calore naturali, qui intrinsecus in dormiente fortior est, quàm in uigilante. Minus autem dormiendum sumpta potione, quàm bolo: minus uerò sumpto bolo, quàm pilulis. Sed ad institutum reuertamur. Si materia biliosa corpus affluere uideatur, leniatur hunc in modum aluus. Recipe di. pruni non solutiui 3. vi. mixorum 3. iij. saccharo albo adiecto fingatur bolus, qui manē horis quatuor ante pastum sumatur. Si uerò pituita salsa abundet, hunc in modum. Recipe cathol. (respicit pituitam, & bilem) 3. β. cas. recens extractæ 3. vi. adiecto saccharo, fingatur bolus, qui manē sumatur horis quatuor ante pastum. Præstat huius in mali curatione bolis uti, quàm potionibus. Remedia deinde topica admoueantur, quæ ardorem repriment, pus abstergant, & hunc glutinent. Fiat igitur hunc in modum. Recipe trochiscorum Gordonij sine opio unc. ij. dissoluatur unus in lacte caprino, aut hordei decocto, si hunc purificare quis malit, quàm glutinare, & per catheterem in uesicā per dies aliquot injiciatur. Purificato hunc, dissoluatur trochiscus unus in lacte ouillo (nam glutinat) & per catheterem in uesicam injiciatur manē, & uesperī. Si uerò pus, quod inheret, admodum crassum sit, trochiscus unus in aqua mulsa dissoluatur, & per catheterem, ut dictum est, in uesicam injiciatur. Hæc autem magis conducunt, quàm sumpta, quod ab ore ad uesicam longa sit uia. Dolor autem, quem meiendo patitur egrotans, hunc in modum mitigetur. Recipe maluarum, radicis altheæ, ana M. i. chamæ. meliloti, an. M. β. radicis nymphæ, & seminis eiusdem, ana 3. i. β. seminis

LIBER TERTIVS. 167

seminis halicacabi unc.ß. calami aromatici ʒ.ij. Decoquã
 ur in aqua, in qua calida madefacto filtro & expresso
 fiat fotus super pectinem. Fotus autem sponsia non fa-
 ciendus propter salsedinem, quam à mari habet. Deinde
 ungatur unguento sequenti. Reci. ol. amygd. dulc. ʒ.i.ß.
 olei uiolacei, muccaginis althææ, & fœnogr. & seminis
 cotoneorũ, an. ʒ.i. seminis halicacabi in tenuissimum pul-
 verem redacti, seminis nymphææ, an. ʒ.i.ß. croci (ingredi-
 tur enim omne medicamentum sedatiuum doloris) ʒ.i.
 adiecta cera fiat unguentum, quo ungatur pecten, & pe-
 rinaeum post fotum.

DIONYSII FONTANA

NONI DOCTORIS MEDICI

Mompessulensis. De morborum
 internorum curatione.

LIBER QVARTVS.

DE FEBRIBVS HVMORALI-

bus. Cap. I.



N humoralibus febribus materie com-
 munes sunt quintuplices, quæ de mate-
 ria febris quidem non sunt, febrem ta-
 men augent. Sunt igitur euacuandæ. Ha-
 rum autem aliquæ contingenter, & non
 semper adsunt, aliæ necessariò & semper. Primum, san-
 guinis copia, uenas implens, & meatus obstruens: qui
 (ut

DE MORB. INTER. CVR.

(ut in febre tertiana) febris materia non est, febrem tamen auget, & interdum materiei febris tertianæ, hoc est bili, miscetur. Euacuatur autem hæc materia communis uenæ sectione. Secundum, humores in uentriculo nauseam excitantes. Euacuantur uerò aut uomitu, si laborans facile uomat, alioqui non cogendus: aut leniēte sumpto pharmaco, puta à cas. aut manna, præsertim cum in ipso uentriculo sentitur grauitas. Tertium, feces in intestinis, aut superfluitates in uenis meseraicis: enemate autem euacuantur. Quartum, scrofi, & aquosi humores in uenis. Euacuantur autem in morbo à causa calida, ut in tertiana, emulsione quatuor seminum frigidorum maior. Causa uerò frigida existente, stillatitio liquore adianti, aut hordei, & radicis fœniculi decocto. Quintum, uaporosæ materie, ex humoribus ad superiores partes euaporantes. Euacuantur autem per poros cutis, fricando apertos, aut sudoribus, operimentis ægrotantem tegendo, leniter elicitis.

SYNOCHI CITRA PUTREDINEM

Curatio.

Cap.

II.

Causa.

Fit hæc febris à sanguinis inflammati copia, uenas, & eas maxime quæ cordi propinquæ sunt, replentis, non tamen putris, per quam quidem copiam fit coartatio, debitaq; transpiratio prohibetur. Hac plerunque

Signa.

corripiuntur iuuenes corpulenti, & succulenti, ac rubicundi hyeme, aut uerno tempore. Vrina his rubra est, & pulsus fortis. scq; ægrotans intumescere putat, ac inflari.

Curandi ratio.

Curandiratio à uenæ sectione auspicanda, quæcunque diei hora sit. Metus enim est ne sanguis ad pulmones repat, indeq; peripneumonia nascatur: aut in thoracem,

acem, unde pleuritidis oriretur: aut ne putreat sanguis, utrisq; fiat febris ex non putri. Antè tamen quàm uena incidatur, si alius sua sponte (ut conuenit) excrementa non deiecerit, enemate molliatur potiùs, quàm lenitiuo pharmaco, periculum enim est, ne interea dum lenitiuù operatur, ab ebullientis sanguinis copia egrotans, ut dictum est, ledatur. Si tamen in uentriculo crudi humores fuerint, ante sanguinis missionem uacuandi: ne inanità uenæ crudos è uentriculo humores ad se raptant, mutanturq; non putris febris in putrem. Vacuabuntur autem crudi illi humores aut lenitiuo pharmaco, aut uomitu, aut inedia, si quidem morbus tantas dederit inducias. Enema autem hunc in modum paretur. Recipe quatuor emollientium herbarum, ana M. i. lactucarum M. ß. pruna x. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. accipiantur iuris decocti colati lib. i. & ß. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana unc. i. ol. uiol. 3. iij. salis parum. Commistis omnibus fiat enema, quod infundatur, eoq; effuso incidatur uena iecoraria dextri cubiti, aut media (ita uult Constātinus) si laborans sano, fortiq; pectore fuerit. Sit autem sanguinis missio copiosa: præstabit tamen rursum sanguinem detrahere, quàm semel ad animi usq; deliquium. Toto morbi tempore, quoties alius astricta uidebitur, utendum enemate prædicto. Materiæ deinde biliosæ uacuentur hunc in modum. Recipe corticum myrobalano. flauarum confricatarum olei amygdal. dul. oxyphoenicœ, ana unc. ß. rhabarb. selecti drach. i. maccrentur in stillatio liquore intybifatiui latioris horis xij. deinde exprimantur, adiectisq; serapii rosa. purgatorii unc. ij. fiat potio, quæ manè sumatur horis quatuor ante

pa

DE MORB. INTER. CVR.

pastum. Satis erit interdum $\mathfrak{z}.$ iij. serapii uiolacei sumi, ad sanguinis purificationem. Concedatur agrotanti potus frigida multa, si non ante febrem uentriculo imbecillo fuerit: alioqui sequentibus infrigidationis gratia utatur.

Recipe conseruae rosa. conseruae nymphaeae, conseruae oxalidis, an. $\mathfrak{z}.$ vi. conseruae buglossi $\mathfrak{z}.$ β . trochiscorum de caphura $\mathfrak{z}.$ i. pul. diamarg. frigidi, pul. elect. trium santalorum, pul. corallii rub. an. $\mathfrak{z}.$ i. fragmentorum communium preciosorum, an. $\mathfrak{z}.$ i. bracteas auri vi. sacchari q. s. Commistis omnibus fiat conditum aureis bracteis opertum, quo saepe & cum aqua, & sine ea utatur. Aut electario, quam Christi manum perlatam appellant, frequenter utatur. Renum quoque infrigidanda regio cum dorso, hunc in modum. Recipe cerati albi Gal. unc. iij. caphura gran. iij. Misceantur, & ungatur regio renum, & dorsi frigide. Porro quoniam hoc in morbo & cor, & hepar inflammari solent, ea hunc in modum refrigeranda sunt. Recipe stillatitij liquoris rosa. unc. viii. stillatitiorum liquorum oxalidis, & nymphaeae, ana unc. iii. omnium santalorum, corallii rub. ana $\mathfrak{z}.$ i. β . caphura gran. v. croci (ad seruandam naturalem temperiem partis) $\mathfrak{z}.$ i. aceti unc. semissem. His commistis fiat epithema cordi. Recipe stillatitii liquoris intybi satiui latioris unc. viii. stillatitii liquoris rosa. unc. vi. omnium santalorum, ana sesquidrachmam, spodij $\mathfrak{z}.$ ij. aceti $\mathfrak{z}.$ β . spicae nardi (ad seruandam naturalem temperiem partis) $\mathfrak{z}.$ β . his commistis, fiat epithema hepatis tepide ante pastum. Praeterea fricationes lenes fiant, ad cutis poros aperiendos, ut per eos, uapores ab humoribus excitati expurgentur.

SYNO=

LIBER QVARTVS. 169
SYNOCHI CVM PVTREDINE

Curatio. Cap. III.

Sanguis aliquando putret in uenis solus, alijs humo-
ribus sanis manentibus, & hoc contingit, aut ob ni- Causa.
miam ipsius quantitatem, aut malam qualitatem. Ali-
quando putret ob permissionem alterius humoris corru-
pti, ut puta bilis, aut pituitæ, aut melancholie. In hac signa.
febre urina aliquantum rubra ad liuiditatem accedere ui-
detur, foetetq;. Calor autem intensior est, quam in febre
proximè dicta, pulsus ut in illa magnus, sed uelocior, sy-
stoleq; quam diastole maior, multi enim fumi eleuantur,
qui expulsioue indigent. Hæc febris intermissione caret,
mitior tamen est matutino tempore, non ratione quidem Curandi
febris, sed horæ matutinæ frigida. Curandi ratio in ratio.
euacuatione consistit, & alteratione. Euacuandæ pri-
mum materiæ communes aut enema, aut leniente phar-
maco. Deinde materiæ propriæ, febrem efficientes. Ter-
tiò, pori aperiendi, obstructionsq; tollendæ. Quartò,
æquandi humores. Postremò putredo corrigenda. Pri-
mum itaque si aluus excrementa non deiecerit, enema
sequenti eluenda. Recipe quatuor emollientium her-
barum, an. M. i. lactucarū M. β. florum nymphae P. i. pru-
na x. hordei M. β. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. ac-
cipe iuris decocti libr. i. β. cas. recens extractæ, sacchari
rub. ana ʒ. i. ol. uiol. ʒ. iij. Commistis omnibus fiat enema,
quod ante pastum, & uenæ sectionem inijeatur. Si autem
in superioribus uentris partibus grauitas percipiatur,
aut in uentriculo humores corrupti contineantur, consul-
tius erit, aluum leniente sumpto pharmaco subducere
hunc in modum. Recipe cas. recens extractæ ʒ. i. serapij
Y uiol.

DE MORB. INTER. CVR.

uiol. 3.ß. aquæ fructuum Mesuæ 3.iiij.ß. his commistis fiat potio, quæ sumatur manè horis quatuor ante pastum. Si non fuerit aquæ fructuum Mesuæ, substituuntur stillatitij liquores intybi satiui latioris, & buglosi.

Aut sic.

Recipe cas. recens extractæ 3. i. baccas oxyacanthæ iiij. adiecto saccharo fingatur bolus, qui sumatur per horam ante pastum. Ante enematis iniectionem, aut lenientis pharmaci sumptionem, si periculum suffocationis esset, sectio uenæ fieri potest, postquam statim alterum duorum exhibendum. Toto morbi tempore quoties aluus excrementa, (ut expedit) non deiciet, utatur prædicto enemate, aut lenienti pharmaco. Bilis si cum sanguine mista sit, hunc in modum concoquatur, deinde euacuetur. Recipe serapii de acetositate citri, serapii simpl. oxalidis, serapii de ziziphis, an. 3. i.ß. stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris, oxalidis, buglosi, an. 3. iiij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo sumantur. Repetantur usque ad humoris concoctionem, quæ ex urina cognoscitur. Recipe elect. trium santalo. 3. i. utatur cum serapijs.

Recipe oxyphoenicæ 3. vi. myrobalanorum flauarum 3. iiij. rhabarb. selecti 3. i. Macerentur in stillatitijs liquoribus intybi lati folij, & buglos. horis xij. deinde exprimentur, adiectisq; serapij rosa. de infusione rosa. sine scamon. aut de ix. infusionibus 3. i. stillatitiorum liquorum oxalidis, & buglosi 3. iiij.ß. fiat potio purgans, quæ sumatur ad auroram. Sanguis autem putridus corrigetur serapio de limonibus, & de acetositate citri: pane quoq; intincto in granatorum succo. Vt autem uapores euacuetur, aperienti sunt pori frictionibus: aut oleo chamæmelino.

lino. Postremò febris hæc alterationem, siue frigidationem requirit, id quod frigida potus præstabit, siquidem iuuenis sit, forti uentriculo, nec apostema in uisceribus habeat, & aquæ potui sit assuetus. Galenus uult frigida potū ante humoris concoctionem non exhibendum, ne maior inde obstructio nascatur. Si dentur induciæ cōcoctio nē expectare conducibile est. Febris tamen si uehemens a. modū fuerit, non desunt qui uelint ante concoctionem quatuor frigida libras posse exhiberi: gloriaturq; Auerrois multos se frigida potu à morte liberaffe. At satius erit ægrotantē aliter tam sumptis, quàm admotis infrigidare. Sumatur igitur serapiū acetatū simplex cum mucagine psyllij. Extrinsecus autem admoueātur epithemata & cordi, & hepati in synocho citra putredinem tradita. In principio tamen non est infrigidandū cū his, quæ stipticitatem habent, in declinatione uerò astringentia non exhibeantur. His peractis, partibus per calorē debilitatis, robur hūc in modū restituendū. Recipe pul. elect. trium santal. 3. ij. trochiscorum de spodio, trochiscorum de caphura, ana drach. β. corallij rubri scrup. iiij. conseruæ rosarum, conseruæ radices buglossi, ana drach. ij. sacchari dissoluti in stillatitio liquore rosarum q. s. Fingatur elect. in rhomborum figuram: e quibus unū sumet marie, & uespere ante pastum. Quo deglutito, bibat parum stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris, & buglossi. Sanguine uerò cum pituita permisto, sequentibus utendum. Recipe serapij acetati simpl. 3. ij. oxymelitos simpl. 3. ij. β. stillatitiorum liquorum adiantici (incidit pituitā) buglossi, intybi lati folij, an 3. iiij. Miscantur, & à ieiuno per triduum diluculò sumantur. Recipe diar-

Y 2 rhodi

DE MORB. INTER. CVR.

rhodi abb.unc.ß.utatur cum serapiis . Hæc autem repetantur, donec ex urina completa coctio appareat . Quæ apparente hunc in modum purgetur. Recipe agar. recens in pastillorum formam redacti 3.i. medullæ enici 3.iiij. Macerentur in oxymelitæ simpl. & stillatitijs liquoribus adianti, & intybi satiui latioris, horis xij. Deinde exprimantur, adiectisq; cathol.unc.i. serapii adianti unc.ß. communis medicinarum decocti q.s. fiat potio purgās, quæ ad auroram sumatur. Recipe corticis citri saccharo conditi, conseruæ rosarum, an. 3.ij. pul. diarrhodi abb. 3.ß. Misceantur, & postridie mane sumantur.

DE FEBRIBVS BILIOSIS.

Cap.

IIII.

Biliosarum febriū alia pura, & simplex, quæ ab bile est alij humori non permixta : altera notha, à bile cum pituita, aut melancholico humore mixta . Et hæc est multiplex, prout pituita, quæ bili miscetur, aut crassa est, aut aquea, & tenuis: aut prout magis, aut minus cum bile miscetur. His itaque in febribus Medicum circumspectum esse oportet, & rationem habere euacuandæ pituitæ pro eius natura, quantitate, & qualitate. Febris autē biliosa, à bile simplici & pura, triplex est . Aut enim est intermittens, aut continua, aut causos. Cū enim extra uenas bilis putret, atque id quod putruit resoluitur, priusquam alia portio putruerit, oritur hæc tertiana intermittens, ideo sic dicta, quòd ad infebrecitationē perueniat . Si autem in uenis bilis putrescat, sintq; eæ uenæ à corde remotæ, continua est tertiana. Si uerò putrescat in uenis pulmonis, aut hepatis, aut alijs cordi propinquis, causos est, siue febris ardens, exiguam habens requiem.

Conz

Continua maiorem habet requiem, neutra tamen ad infebrecitationem peruenit, sed tertio quoque die exacerbat, medioq; tempore est mitior.

TERTIANAE PVRAE INTERMITtentis, idest, à bile pura factæ, Curatio.

Cap.

V.

SEPTem paroxysmos febris hæc non superat. paucioribus plerunque finitur. Longissimus paroxysmus signa. horarum est duodecim. Hac febre corripitur solent iuuenes biliosi, & graciles, cibis calidis, siccis, & bilem generantibus usi, anni potissimum tempore & aere calido, & regione calida. Inuadit cum rigore acuum puncturis simili non diu durante, cui statim uehemens succedit calor cum sudore copioso. Si paroxysmi principio nausea egrotantem infestat, uomitus hunc in modum eliciatur. Recipe serapij acetati simpl. unc. β. aquæ tepidæ unc. v. Misceantur, & bibantur, uomitusq; digitis in os immisus magis irritetur. Si in intestinis grauitatem, & molestiam egrotans paroxysmi tempore sentiat, balanus communis, ex sale, & melle immittatur. Enemata enim in paroxysmo non est utendum. Cum incipit calere, corpus leniter fricetur, ut meatibus apertis uapores euacuentur. Nec cibus, nec potus egrotanti in paroxysmo exhibeatur, nisi forte in declinatione. Si uero uehementer sitiat, nec potu abstinere possit, serapio uiolaceo cum aqua cocta misto utatur. Egrotans autem si biliosus insigniter fuerit, & corpore gracili, atque exucco, ei in ipsa accessione, si antea cibum non sumpserit, cibus exhibeatur, cremor uidelicet hordei, heclicæ metu. Corporibus quoque sanguineis texturæ raræ, si antea non fuerit exhibitus,

Y 3

paulò

DE MORB. INTER. CVR.

paulò ante acceſſionem, atque adeò in ipſius acceſſionis principio, cibus exhiberi poteſt, ne nimium diſſoluatur. In declinatione, ſi ſudet agrotus, operiatur leuiter, ſudor quoque abſtergatur, ne poros obſtruat. Ipſa etiam abſterſio ſudorem alium elicit. Aqua cocta cum pauco uini albi ſi tunc bibatur, copioſior ſudor elicietur. Febris huius curatio à materiæ communium, quæ febrem non efficiunt, eam tamen augent, & ſunt in uentriculo, inteſtiniſ, & uenis meſeraicis, euacuatione inchoanda. Inijciatur igitur aut hoc, aut ſimile enema. Recipe quatuor emollientium herbarum, ana M. i. pruna. xij. Decoquantur in ſufficienti quantitate aquæ ad tertias. Accipiantur iuris decocti libr. i. ſ. caſ. recens extractæ. ſacchari rubr. ana ʒ. i. ol. uiolac. ʒ. iij. ſalis parum. Commiſtis omnibus fiat enema, quod ante paſtum infundatur. Aut enematis loco ſumat potionem ſequentem, ſi nolit enema, aut ſi materia aliena ſit in uentriculo. Enema .n. uſque ad uentriculum aſcendere non poteſt. Recipe caſ. recens extractæ ʒ. i. ſerapij uiolacei ʒ. ſ. (caue à melle, quòd caſ facit, hìc autem refrigerandi ſcopus eſt) ſtillatitiorum liquorum in tybi lati folij, & bugloſi, ana unc. ij. Ccmmiſtis omnibus fiat potio.

Aut ſic.

Recipe diapruni ſimplicis, caſiæ recens extractæ, ana. unc. ſ. ſerapij uiolac. ʒ. i. communis medicinarum decocti ʒ. iij. ſ. adiectis oxyphœnicw drac. vi. fiat potio, quæ ſumatur manè horis quatuor ante paſtum. Poſt horas quatuor paſcatur agrotus, ſiue potio ſumpta operata fuerit, ſiue non, propoſitum enim eſt materias communes tantum uacuare. Materijs communibus euacuatis, propriæ, que

quæ febrē efficiunt, deinde euacuentur, sed non ante co-
tionem, quæ ex urina cognoscitur, nisi materia abun-
det, metusq; sit ne ab ipsius copia natura suffocetur: aut
nisi turgcat. sentiatq; egrotus aliàs in capite, aliàs in pe-
tore, aut alia quavis corpore parte dolorem. Tūc. n. peri-
culum est, ne repat ad aliquam corporis partem nobilē,
aut ne de intermittente, continua fiat. Cum. n. intermit-
tens in continuam uertitur, plerunque lethalis est: ar-
guit enim imbecillitatem uirium, quæ non possunt extra
tenas putrescentem humorem depellere. Vbi igitur mate-
ria turget, hunc in modum uacuetur. Recipe rhab. sele-
cti ℥. iij. myrobalano. flauarum (incrassant, & adstrin-
gunt turgentem, & discurrentem humorem) confricata
rum ol. amygd. dul. ℥. iij. macerentur in stillatio liquore
intybi lati folij, et paucio uini albi horis xii. deinde expri-
mantur. Adiectis serapij ros. de nouem infusionibus sine
scammonio ℥. ij. stillatitiorum liquorum oxalidis, & bu-
gloss. ℥. iij. ℥. fiat potio, quæ ad auroram sumatur.

Aut sic.

Recipe cas. recens extractæ ℥. ℥. elect. de succo ros. ℥. ℥.
ij. ℥. serapij ros. purgatorij ℥. i. communis medicinarum
decocti ℥. iij. ℥. adiectis oxyphœnicōn ℥. vi. fiat potio,
quæ sumatur in die quietis ad auroram. Materia turgen-
te, exhibeatur pharmacum eradicans: cum uerò non tur-
get, sed tantum abundat, & multa est, exhibeatur phar-
macum ipsam duntaxat minuens hunc in modum in prin-
cipio. Recipe cas. recens extractæ ℥. ℥. elect. de succo
ros. ℥. i. ℥. serapij rosa. purgatorii ℥. ℥. communis medici-
narum decocti q. s. fiat potio, quæ ad auroram sumatur
quatuor horis ante pastum.

Y 4 Aut

DE MORB. INTER. CVR.

Aut sic.

Recipe rhabarb. selecti ʒ.i. spicae nardi gra. iij. mace-
rentur in stillatitio liquore intybi satiui latioris, & pau-
co uini albi horis xij. deinde exprimantur, adiecto q̄; sera-
pii rosa. ʒ.β. fiat potio, quæ ad auroram sumatur. Si uerò
materia nec turget, nec abundat, expectanda concoctio,
prohibenda autem interim ulterior humorum putrefac-
tio, iuuandaq; natura ad concoquendum hunc in modū.

Recipe serapij acetati simpl. (corrigit putredinem
humoris) ʒ.ij. serapii uiola. ʒ.i.β. serapij intybi lati. folij
ʒ.i. stillatitiorum liquorum cichorij, intybi satiui latio-
ris, buglossi, an. ʒ.ij. Misceantur, & à ieiuno per triduum
diluculò bibantur. Serapium uiolaceum ne sit in feбри-
bus biliosis in multo usu, præsertim solum, nam propter
dulcedinem facile inflammatur, & uertitur in bilem, au-
getq; calorem. Miscendus igitur cum serapiis de acetoe-
sitate citri, aut de limonibus, & similibus. Nec etiam
his in febribus serapium adiantinum conuenit, quòd hu-
mores tenues, ac subtiles reddat. Utatur autem laborans
serapiis prædictis donec perfectæ concoctionis appa-
reant signa, deinde sumat aliquod ex pharmacis prædic-
tis eradicantibus. Vena si incidenda uideatur, id fiat in-
ter primum, & quartum paroxysmum in die quietis, nō
autem post: tunc enim morbus est in statu, in quo non est
dandum medicamentum, neque uena secanda. Quoties
aluus (ut conuenit) excrementa non deiciet, utendum e-
nematè superius tradito, aut bolo ex cas. aut manna. Ca-
lor præterea febris mitigabitur potu aquæ hordei, aut
aquæ coctæ, adiecto serapio uiola. misto cum serapijs,
aut de limonibus, aut de acetositate citri. Serapia quo-
niam

niam ad perfectionem coquuntur, inspissantur, igitur stillatitijs liquoribus miscentur & diluuntur: zulapia non item, quoniam mediocriter tantum coquuntur. Aqua cocta non utrit, ideo in paroxysmis, ubi nutriendum non est, præstat aquam coctam bibendam dare, quam aquam ordei. In ore habenda aliqua, quæ refrigerent, & huc neceſſent, qualia sunt hæc. Recipe seminis psyllij integri drach. ij. seminis cotoneorum drach. i. ß. gummi tragacanthæ 3. i. sacchari candi 3. ß. linteis raris in ligulariæ nodum formatis, acutq; interpunctis insuantur, quæ stillatio rosarum liquori crebrò immersæ in ore habeantur, præsertim quando nigra est lingua. Refrigerant & mali punici acini in ore habiti, aut saccharum candum: & hæc quoque compositio. Recipe conseruæ ros. conseruæ nymphææ, conseruæ buglossi, ana unc. ß. pul. elect. trium santal. pul. diamargar. frigidi, ana 3. i. ß. coral. rub. 3. i. trochisco. de caphura 3. ß. sacchari q. s. his commistis fiat conditum auro coopertum, quo utetur agrotans cū aqua cocta, & sine ea tempore sitis. Accessionis uerò tempore nihil est prorsus foris admouendum, ne admotis quibusdam frigidis calor febrilis intrò pellatur, atque tunc accessio multò quàm esset longior fiat. Verum extra accessionem epithemata sine periculo præscribi poterunt. Symptomatibus post hæc occurrendum, & primum dolori capitis. Recipe olei rosa. 3. iij. aceti 3. i. Misceantur, & applicentur fronti tepidè in hyeme, in æstate uerò frigide, deinde uigilijs. Recipe serapii de papauere 3. i. ß. stillatitij liquoris lactuæ 3. iij. pul. diamargar. frigid. 3. i. Misceantur, & appetente somni tempore ab egroto sumantur.

Y s Aut

DE MORB. INTER. CVR.

Aut sic.

Recipe seminum papaveris albi, & melonum mundatorum, an. \mathfrak{z} . β . inuoluantur in panno linco raro, fianturq; frustula auellanarum instar, deinde cum iure pulli fiat emulsio, quæ somni, ut dictum est, appetente tempore sumatur. Postremò tollenda inflammatio, si qua in toto corpore, aut aliqua eius parte post febrem, & humorum euacuationem, à quibus febris erat, remanserit: ne illa inflammatio alios, aut corrumpat, aut generet humores, febrem rursus excitaturos. Recipe electa. trium santalo. duplicato rhabar. \mathfrak{z} . iij. in rhomborum figurā formatas, è quibus sumatur unus manè horis tribus ante pastum: quo deglutito, parum stillatitij liquoris intybi satui latioris bibendum. Hepatis quoque regio sequenti unguento ungenda. Recipe cerati santalini \mathfrak{z} . iij. ol. nymphaeae, ol. uiolacei, an. \mathfrak{z} . i. β . Lauentur hæc accuratè aqua frigida, aut stillatio rosarū liquore, ne poros obstruāt, & unguentum penetrare prohibeant, deinde adde spicæ nardi \mathfrak{z} . β . ad seruandum naturalem temperiem partis. Misceantur, & tepidè manè ante pastum hepatis regioni applicentur. Post euacuationem humorum, febrem efficiendum, qui tamen omnino euacuari non potuerunt, ut reliquæ euacuentur, eliciantur sudores fricationibus, & operimentis non grauib. Eliciantur & urinae potu uini albi, & euulsionis quatuor seminum frigidorum maiorum in iusculis posita.

TERTIANAE NOTHAE, SIVE NON pure intermittentis, Curatio. Cap. VI.

DVplex hæc febris est. Aut. n. fit à bile mista cum pituita, aut aquea, aut crassa, & hæc frequentius accidere

videre solet, quæ dicitur cholera maioris famæ: aut à cholera mista cū atrabile, & hæc rariùs accidere solet, quæ dicitur cholera minoris famæ. Cholera autem maioris famæ duplex est, citrina, & vitellina. Quando enim bilis cum pituita tenui, & aquea miscetur, appellatur bilis citrina: quando uerò cum crassa pituita miscetur, vitellina bilis appellari solet, quòd vitellis ouorum sit similis. Et hæc quidem vitellina rursum duplex est, sicuti vitellorum uorum duplex est color. Quidam enim magis alijs albi-
ant, alijs rufiores uidentur. Bilis autem quæ rufioribus sit similis, per assationem fit. Minoris quoque famæ cholera duplex est. Aut enim cholera naturalis miscetur træ bili ex bilis naturalis assatione facta: aut miscetur bilis naturalis cum humore melancholico naturali, qui in hepate cū alijs humoribus generatur. Dicemus igitur primum de tertiana notha quæ fit à bile maioris famæ, & prius de ea, quæ fit à bile citrina. Hæc autem non multum differt à tertiana pura, non enim multò longiores habet paroxysmos, suntq; excrementa, et urinæ citrini coloris.

Victus ratio sit in hac febre plenior, quàm in pura, quæ nec aliquantò longior esse soleat. Ceterum iisdem penè præsidijs utraque curatur. Curandi itaque ratio ab euacuatione materialium communium auspicianda, quæ fiet aut euacuante pharmaco sumpto, aut enemate infuso. Debet autem enema propter materiam pituitosam, quæ in intestinis, & uenis meseraicis continetur, esse acre, cui rei plurimum conuenit ℥.ss. hieræ picræ, hunc in modum. Recipe quatuor emollientium herbarum ana M.i. helxines M.℥.ss. quatuor seminum frigidorum maiorum, ana 3.i. seminum anisi, & fœniculi, ana 3.i.℥.ss. florum chamæmeli, & me

Victus
ratio.
Curandi
ratio.

DE MORB. INTER. CVR.

meliloti, ana P.i. Decoquantur in sufficienti quantitate aquæ ad tertias. Accipiantur iuris decocti lib.i.ß. cas. 3.i. hieræ picræ simpl. unc.ß. mel. rosac. col. unc.i.ß. ol. com= mu. unc. iij. salis communis 3.i.ß. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Aut si nolit enema æger, sumat pharmacum leniens hunc in modum. Re= cipe cathol. cas. ana unc.ß. serapii adianti unc.ß. propter pituitam. Communis medicinarum decocti q. s. fiat potio, quæ sumatur manè horis quatuor ante pastum.

Aut sic si utrunque recusset.

Recipe cathol. 3.vi. cas. 3.ß. adiecto saccharo fingatur bolus, qui horis quatuor ante pastum sumatur, & pran= deat non expectata ampliore eius operatione. Nam si dif= ferretur prandium, natura, quod benignum est medica= mentum, illud in alimentum mutaret. Confert plurimum quotidie in hoc febris genere uti, aut enema, aut lenien= te pharmaco, cum ad materias communes educendas, tum ad muccositates intestinorum abstergendas, & præcipue die quietis. Vomitus probatur in febre tertianæ pura, et exquisita, ieiuno uentriculo, in hac uerò post cibum, aut initio accessionis. Facilius enim educitur materia pituito= sa pleno uentriculo, quàm uacuo, & ieiuno: propterea q. unà cum cibis pituito mista uacuatur per uomitum, qui sic elicietur. Recipe oxymelitos simp. 3.i.ß. aquæ plu= uie tepidæ 3.v. Misceantur, & sumpto cibo bibantur, aut in ipsius accessionis principio, si uomendi cupiditas incesse= rit. Turgente materia in principio medicamentũ eradicans potest exhiberi hunc in modum. Recipe ca= thol. 3.ß. diaphœnici, electar. de succo rosa. ana 3.ij. sera= pij adianti 3.ß. communis medicinarum decocti q. s. fiat potio

potio, quæ ad auroram sumatur.

Aut sic.

Recipe diaphœnici, elect. de succo rosa. elect. indi maioris, an. ʒ. i. ʒ. Adiecto saccharo fingatur bolus, qui ante diluculum sumatur. Bolus maturius sumendus quàm potio, seriùs enim operatur.

Aut sic.

Recipe rhabarb. selecti drach. i. cinnamomi gran. ʒ. turpeti selecti ʒ. ii. zinzib. ʒ. i. sacchari albi ʒ. ij. Redigantur in puluerem, qui iure cicerum rub. aut pulli excerptus hauriatur.

Aut sic.

Recipe pil. aggreg. ʒ. iiij. Excipiantur stillatitio liquore intybi satiui latioris, finganturq; pil. vij. quæ circa noctis dimidium sumantur. Deinde lotorium bibat ex ʒ. ʒ. sacchari rub. & aquæ hordei ʒ. vi. commistis, siquidem materia ualde sit calida: si mediocriter, et uires sint debiles, misceatur saccharum cum iure pulli: si uerò parum calida sit, cum iure cicerum rub. & saccharo. Recipe conseruæ rosa. conser. adianti, conser. rad. buglos. an. ʒ. i. ʒ. Misceantur, & postridie manè sumantur. Si materia non turgeat, multa tamen sit, exhibebitur medicamentum materiam propriam minuens. Talia autẽ erunt superius tradita medicamenta, si de singulis aliquid demas. Materia autem neque abundante, neque turgente, naturam, ut eam celerius concoquat, hunc in modum iuuabimus. Recipe serapii acetati simpl. ʒ. iiij. mellis rosa. col. ʒ. i. ʒ. stillatitiorum liquorum absinth. intybi satiui latioris, lupi salictarii, ana ʒ. iiij. (aperit enim leuiter, quæ autem ualenter aperiunt initio non conueniunt.)

Mia

DE MORB. INTER. CVR.

Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo sumantur. Rec. diarrh. abb. ʒ. ʒ. utatur cū serapijs. Repetantur hæc tribus alijs diebus, si concoctionis signa nondum appareant, quæ ubi apparuerint, purgetur aliquo ex prædictis medicamentis. Cæterum quoniam materia hæc contumax est, nec semel tota coquitur, nec uacuatur, igitur ubi ægrotus dies quinque, aut sex, quicuerit, rursus materia & coquatur, & uacuetur, utendo in morbi progressu serapijs magis aperientibus hunc in modum. Recipe serapij acetati de duabus rad. ʒ. ij. mellis ros. col. ʒ. i. ʒ. serapij adianti ʒ. i. stillatitiorum liquorum absinthij, adianti, intybi satiui latioris, ana ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo sumantur. Deinde uacuetur sumpto aliquo ex prædictis medicamentis solutiuis. Vbi dies aliquot quicuerit, perseueratq; febris rursus materia coquatur serapijs magis aperientibus, hunc in modum. Recipe serapij intybi lati folij compositi, serapij acetati de duabus radicibus, serapij adianti, an. ʒ. ij. stillatitiorum liquorum, apij, absinthij, buglossi, an. ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuno per quatrimum diluculo sumantur. Recipe diarrho. abb. ʒ. i. utatur cū serapijs. Deinde purgetur, aliquo ex prædictis medicamentis solutiuis. Vbi est post hæc dies aliquot quicuerit, rursus materia et coquatur, et uacuetur hunc in modum. Recipe serapij byzantini (nam in declinatione conuenit) ʒ. iij. serapij intybi satiui latioris compositi uncias ij. serapij adianti ʒ. i. stillatitiorum liquorum, apij, foeniculi, pimpinellæ, cichorij, ana drac. iij. Misceantur, & à ieiuno per quatrimum diluculo appetente sumantur. Recipe diarrhodi abb. unc. i. utatur cū serapijs. His peractis, si febris perseueret, tædeatq; ægrotum

LIBER QVARTVS. 176

um & serapiorum, & solutiuiorum medicamentorum,
hoc apozemate utatur. Recipe quinque radic. com.
maceratarum in uino albo, ana unc.ß.v. herbarum ca=
pill. pimpinellæ, pilosellæ, intybi lati folii non loti, bu=
gloss. cum. radic. eupatorij, ana Manipul. i. quatuor se=
minum frig. maior. ana drachm. i.ß. seminum anisi, apij,
fœniculi, ana drachm. ij. cicerum rub. M.ß. uuarum pas=
sarum detractis uinaceis unc.ß. polipodij quer. (melan=
tholiam, & pituitam educit) foliorum sennæ orien=
talis mundatæ, ana ʒ. i. (quoniam multæ partes bilis
in melancholiam uertuntur à calore febrili) medullæ
cenici drachm. vi. agarici in pastillorum formam red=
acti unc.ß. trium florum com. ana. P. i. Decoquantur in
s. q. aquæ donec dimidium absumatur: accipiatur iuris
decocti libr. i.ß. adiectoq; saccharo dulcedo inducatur, fi=
atq; serapium mediocriter coctum, in quo depurato ma=
cerentur drachm. ij. rhabarb. selecti, spicæ nardi, cinna=
momi, ana drachm.ß. horis xii. deinde exprimantur, &
utatur diebus quatuor, aut si malit quinque, matutinis
horis. Postremò symptomatibus occurrendum, & pri=
mò sitis. Recipe serapij uiolacei, serapij adianti, ana
unc. ij. Misceantur cum aqua cocta, aut aqua hordei
tempore sitis extra pastum. Imbecillitati autem uen=
triculi hunc in modum succurrendum. Recipe olei ab=
sinth. unc. iij. olei mastich. olei cotoneorum, ana unc. i.
ß. menthæ siccæ caryophyllorum, galangæ, corallij ru=
br. ana drachm. i. rosa. rubr. scrup. ij. adiecta cera fiat
unguentum, quo uentriculi regio ungatur manè et uestpe
ri ante pastum sed non in acceßione. Dolori autem ca=
pitis hunc in modum medendum. Recipe olei ros. unc. ij.
olei

DE MORB. INTER. CVR.

olei chamæmeli unc. i. ß. aceti unc. ß. His commistis ungetur frons tepide.

TERTIANAE NON PVRAE ABILE

uitellina, quæ fit per adustionem pituitæ crassæ

se Curatio. Cap. VII.

Simili modo, ut in proxima superiore traditum est, & coquendi, & euacuandi humores, nisi quod in hac, serapia humores magis tenuantia esse debent. Febris hæc longior, quàm antè dicta, esse solet, longioresq; habet paroxysmos, pleniore igitur uictu utetur ægrotus, ut diutius durare possit. Tres plerunque menses febris hæc superat, atque ad horas triginta paroxysmus nonnùm quam extenditur. Sunt qui præcipiunt ægroto cibum duntaxat exhibendum die quietis, altero uerò non. Si paroxysmus horas triginta occupet, cibus ægroto exhibetur horis sex ante accessionem. Utatur uino tenui, albo: aut rubro claro, tempore pastus. Extra pastum autem, & die accessionis utatur aqua hordei, in qua fœniculi radix decocta sit, cum serapio adiantino. Cum cibis misceantur humores attenuantia, ut ius cicerum rubrorum. In rigore accessionis lapides calidi pannis inuoluti pedibus apponendi, cum in alijs febribus panni calidi duntaxat sint admouendi. Vbi autem caluerit, fricetur ægrotus & quidem ualide, quoniam & uapores, & humores crassiores sunt. Curandi ratio à materiæ communium educatione exordienda, quod fiet enemate infuso, aut leniente medicamento sumpto, hunc in modum.

Curandi
ratio.

Recipe maluarum, helxines, althææ, betæ, ana M. i. seminum anisi, & fœniculi, ana ʒ. ij. quatuor seminum frigid. maior. ana ʒ. i. ß. furfuris frumenti (ad abstergendas

das muccositates intestinorum) florum chamæmeli, & meliloti, ana P.i. Decoquantur in s.q. aquæ ad tertias. Accipiantur iuris decocti lib.i. & β. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana 3.i. mell. rosar. col. 3.i. β. olei comm. unc. iiij. salis drach. i. β. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Si enema displiceat ægroto, aut in uentriculo, & partibus superioribus grauitas, & plenitudo percipiatur. sumat sequens medicamentum leniens.

Recipe cas. recens extractæ, cathol. an. 3. β. serapij uiolacci 3.i. (ad leniendum) stillatitiorum liquorum intybi lati folij, & absinth. q.s. aut communis decocti 3. iiij. β. adiecto adianti recentis (ad incidendum) P.i. & β. fiat potio, quæ mane horis quatuor ante pastum sumatur. Si urina rubra sit, adsit q; sanguinis copia, secus non, incidatur uena media, uel iecoraria, fiat q; lata uenæ diductio: nam materia crassa est. Materia deinde si multa sit, quæ febrem faciat adeo, ut eam natura uincere non possit, in principio ipsam hunc in modum minuere licebit. Recipe diaphœnici 3. ij. (educit utranque materiam, sed pietuitam magis) elect. de succo rosar. 3. i. (bilem purgat) cathol. 3. β. ser. ap. uiol. unc. β. com. deco. 3. iiij. β. commistis omnibus, fiat potio, quæ ad auroram sumatur horis sex ante pastum. nam materia est fortis.

Aut sic.

Recipe rhabarb. selecti 3. i. cinnamomi gran. v. agar. in pastillorum formam reducti scrup. ij. Maccrentur in stillatitiis liquoribus intybi satiui lati folij, & absinth. ac pauco uini albi horis. xii. deinde exprimantur, adijciantur q; serap. rosa. laxat. 3. i. β. diacnici drachm. i. quibus omnibus com. decocti unc. iiij. β. exceptis fiat potio,

Z

que

DE MORB. INTER. C V R.
quæ ad auroram sumatur.

Aut sic.

Recipe pil. aggreg. ℥.iiii. excipiantur stillatitio li-
quore bugloss. fingaturq; catapotia septem, quæ circa no-
ctis dimidium sumantur. Facta operatione sumat loto-
rium sequens. Recipe saccha. rub. ʒ.β. iuris cicer. rub. de
coctorum, aut aquæ hordei (si febris cum intenso calore
fuerit) ʒ. vi. fiat lotorium, quod hora post sumptum medi-
camentum purgans sexta, bibatur. Recipe corti. citri,
sacchar. conditi ʒ. iii. (non tantum daretur in tertiana à
cholera citrina, quoniã non est tanta debilitas uentricu-
li.) conseruæ ros. ʒ. i. β. Misceantur, & postridie manè su-
mantur. Humores deinde cōcoquantur, sumptis primū
serap. tenuantibus, & abstergentibus, deinde magis ape-
rientibus, fiatq; ut dictum est in febre proxima superio-
re. Utendū autem serapijs per multò plures dies ad mate-
riam concoquendā. Præterea per sesquihoram ante pastū
sumat sequentis electarii tessellam unam. Recipe specie-
rum diarrhod. abb. ʒ.β. specierū arom. ros. maio. Gabriel.
ʒ. i. β. (harum parum detur propter febrem, quia calidæ
sunt) conser. adianti, & buglos. an. ʒ. ij. saccha. dissoluti in
stillatitio liquore absinth. & ros. q. s. fingatur elect. so-
lidum in rhomborum figuram, sintq; singuli ponderis
drachm. ii. β. hæc roborant membra, & uentericulum,
cuius magnoperè solliciti esse debemus. Nam si is im-
becillior fiat, malè concoquet: atque ita multam pitui-
tam generabit. Tempore autem paroxysmi utatur con-
dito sequenti, cum aqua hord. aut sine ea.

Recipe conseruæ bugloss. conseruæ rosa. conseruæ a-
dianti, ana unc. β. pulue. diarrho. abb. drachm. ii. corallii
rub.

rub. scrup. iij. conseruæ florum roris marini (propter pituitam, calida enim est) drachm. iij. sacchar. q. s. fiat conditum auro coopertum. Post usum serapiorum, apparentibus concoctionis signis, utendum medicamentis solutiuus iam dictis. Perseuerante febre utendum & apozemate, supra proximè tradito. Medicamenta autem solutiuia, & serapia prædicta non solum semel danda sunt, sed repetitis uicibus, partem humorum, qui non facile concoquuntur, & coquendo, & eam euacuando. Humoribus autem aliqua ex parte euacuatis, roboretur uenter unguento sequenti. Recipe olei absinthij, olei nardini, ana unc. ii. olei ex cotoneis, olei mastichini, ana unc. i. menthæ siccæ, cardamomi, caryophyllorum, galangæ, corallij rubri, ana drachm. ii. styracis calamitidis drachm. i. ß. coriandri præparati unc. iiii. rosa. rubrarum scrup. ii. ceræ flauæ q. s. fiat unguentum, quo ungatur regio uentriculi manè, & uespere ante pastum. Aut unguenti loco utatur sequenti emplastro. Recipe emplastri de mastich. emplastri pro stomacho, ana unc. i. galangæ drachm. iii. corallij rubr. drachm. ii. Subigantur cum oleo ex cotoneis, fingaturq; emplastrum in scuti (ut Medicorum uulgus loquitur) stomachalis figuram, quod regioni uentriculi, uitato hepate, nam calidum est nimium, admoueatur. Cibi autem tempore auferatur, nam propter uin astringentem, quam habet, prohiberet cibum in fundum uentriculi descendere. Inunctio autem non item, ut quæ iam sit tempore pastus imbibita.

Z 2

TER=

DE MORB. INTER. CVR.
TERTIANAE NON PVRAE, A BILE
mista melancholico humori Curatio.

Cap.

VIII.

causa.

Bilis melancholice bifariam miscetur. Aut enim miscetur melancholice, quae ex ipsius bilis assatione fit, quae proprie atra bilis dicitur, & simul miscentur bilis usta, & non usta. Aut miscetur melancholice naturali,

signa.

quae proprie melancholicus humor appellatur. Si quispiam tertiana intermittente laboret, sitq; is iuuenis, biliosus ualde, & gracilis, qui cibis, & speciebus acribus sit usus, sint praeterea tempus anni, regio, caeli constitutio calida, urina ignea cum aliqua obscuritate, iudicare licet febrem illam ex mistione bilis & melancholice per bilis assationem factae consistere. Si uero usus fuerit cibis melancholicum humorem gignentibus, febrem ex bilis mistione cum melancholia naturali consistere existimabimus. Non multum haec febres a tertiana puta differunt, nisi quod in his rigor quidam fortior percipitur, ut agrotanti ossa frangi uideantur, & dentes tremant, ob grauitatem materiae, quae in tertiana pura leuis est: & propterea in ea rigor breuior, in hac uero in qua bilis cum melancholia miscetur, longior est. Humectantia in hac febre magis conueniunt, in tertia pura magis infrigidantia. Curandi ratio a materiis communium euacuatione aspicienda hunc in modum. Recipe maluarum, betae, bu gloss. (propter melancholiam) iuloriae, ana. M. i. (ualde humectat) pruna. xii. ficus pingues x. (pruna & ficus humectant.) Decoquantur in s. q. aquae ad tertias: accipiat iuris decocti lib. i. ss. cas. recens extractae 3. x. dosis maior esse debet, nam humectandi scopus est, sacchari rub.

curandi
ratio.

rub. 3. i. mellis uiol. (est enim melancholia in se genita.)
 3. i. 3. ol. com. 3. iii. salis parum (ad irritandum.) Fiat ene-
 ma, quod ante pastum infundatur. Aut utatur medicamē-
 to lenienti ob causas sepe superius dictas hunc in modū.

Recipe cas. recens extracta. 3. 3. mannae 3. i. serap. uio-
 laccei 3. 3. stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris
 & bugloss. q. s. fiat potio, quæ sumatur horis quatuor an-
 te cibum, post quas prandendum, siue operata fuerit, siue Signa.
 non. Materia autem si turgeat exhibeatur in principio
 medicamentum eradicans, hunc in modum. Recipe ca-
 thol. 3. vi. elect. de succo rosa. (propter cholera) compo-
 sitionis hamech. ana 3. i. 3. serap. uiolac. 3. 3. communis de-
 cocti 3. iii. 3. adiectis polypod. quer. foliorum sennæ, ana
 3. i. & 3. fiat potio, quæ sumatur diluculo, sex horis ante
 pastum.

Aut sic.

Recipe rhabarb. selecti 3. iii. cinnamom. gran. vi.
 myrobalano. cerulearum confricatarum ol. amygd. dulc.
 drach. iii. macerentur in sero caprino, & pauco uini albi,
 vel in stillatitiis liquoribus intybi satiui latifolii, & bu-
 gloss. horis xii. deinde exprimantur, adiectisq; serapii ro-
 sa. laxat. 3. i. 3. elect. de succo ros. elect. diasennæ, (hoc adii-
 citur loco compositionis hamech ad uariandum) an. 3. i.
 3. communis decocti 3. iii. 3. fiat potio, quæ ad auroram
 sumatur. Recipe pul. sacchar. rub. unc. 3. cum iure pul-
 li, aut aqua hord. fiat lotorium. Recipe conseruæ ros.
 conseruæ radic. bugloss. ana drach. ii. Misceantur, & po-
 stridie manè sumantur. Si uerò bolus, aut pil. magis pla-
 ceant, hunc in modum parentur. Recipe confectio Ha-
 mech. elect. de succo ros. ana drach. ii. adiecto saccharo fin-

Z 3 gatur

DE MORB. INTER. CVR.

gatur bolus, qui ante lucem sumatur. Recipe pil. aggregat. pil. indarum, ana 3.ß. Excipiantur stillatio li-
quore buglossi, finganturq; pilul. v. aut vii. quæ circa no-
ctis dimidium sumantur. Si materia non turgeat, ante
quàm euacuetur, concoquatur hunc in modum. Recipe
serap. uiol. (ad humectadum sera. acetati simpl.) propter
bilem) serap. bugl. (propter melancholiam) an. 3. ii. stilla-
tiorum liquorum fumariæ, lupi salictar i, cichorii, in-
tybi satiui lati folii, an. 3. iii. Misceantur, & à ieiuno per
quatrimum diluculo sumantur. Plures doses sunt dandæ,
nam materia est crassa: ideo tã facile non educitur, quàm
pura bilis in tertiana pura. Recipe diarrhodi abb. unc.
i. ut atur cum serapiis. Euacuetur deinde aliquo ex præ-
dictis medicamentis solutiuis sumpto. Si febris perseueret,
repetantur & serapia, & medicamenta solutiua prædi-
cta. Fricationibus fortibus & in paroxysmo, & tempo-
re quietis aperiendi pori ad uaporum, qui sunt crassio-
res, quàm in tertiana pura, euacuationem, uacuo tamen
uentriculo, ne aliquid in ambitum corporis trahatur. In
declinatione utendum pharmacis mēbra roborantibus,
hunc in modum. Recipe specierum diarrhodi abb. 3.
iii. (& in bile usta pul. electar. trium santalorum drac.
i.ß.) pul. elect. de geminis (propter melancholiam) scrup.
quatuor conseruæ rad. bugloss. conseruæ rosarum ana 3.
ii. sacchar. dissoluti in stillatio liquore rosarum, (quia
astringit, & est odorata) & bugloss. quantitate suffi-
cienti, fingatur electar. solidum in rhomborum figu-
ram, sintq; singuli rhombi ponderis drach. ii.ß. è qui-
busumat unum manè, & uespere horis tribus ante pa-
stum. Quo deglutito, bibat parum uini, quod in me-
lanch

lancholia plurimum confert, diluti stillatio liquore bu-
glossi.

TERTIANAE CONTINVAE CV.

ratio.

Cap.

IX.

FIt interdum hæc febris à bile pura in uenis, quæ cor-
di, sed non adeò, ut in causo propinquæ sunt, putre-
scente: interdum à bile mista pituitæ, nonnunquam à bi-
le mista melancholiæ. Quarum omniũ signa, ex his quæ Signa.
dicta sunt, colligi possunt. Principium huius febris est si-
ne horrore, sine tremore, nullus sudor, nisi in crisis die,
linguæ asperitas cum citrinitate, & nigredine sitis, &
alienatio maior, quàm in tertiana intermittente, urinæ
rubræ intensæ, ualde subtiles, subrusæ cū quadā liuidita-
te. In hac calor nō tam intensus quàm in causo, & maio-
rem habet hæc quietem, quàm causos. Crisis in hac, &
in syncho non superat diem xiiii. Et quoniā bilis diebus
imparibus mouetur, diebus imparibus si crisis fiat, aut p-
alui deiectionem, aut urinas, aut sudorem, bonũ: si pari-
bus, malũ. Quòd si uisis signis perfectæ coctionis natu-
ra nihil expellat, postridie detur solutiũ medicamentũ
modò non sit dies exacerbationis. Petatur autẽ solutiũ
medicamentum ex his quæ habentur in febris intermit-
tentibus superius traditis. Cõueniunt in hac febre magis
infrigidantia, quàm in intermittente. Curandi
ratio. Curandi ratio
exordienda ab eductione materiæ communium hunc
in modum. Recipe maluarum, uiolarie, lactuæ, ana
Manip. i. ß. florum nymphæ, florum uiolarum, ana P. i.
quatuor seminum frigidorum maiorum, ana. ʒ. i. pruna
decem. Decoquantur in sufficienti quantitate aquæ ad
tertias. Accipiantur iuris decocti libr. i. ß. ca. recens ex-
tracta,

Z 4 tracta,

DE MORB. INTER. CVR.

tractæ, sacchari rubr. ana. unc. i. olei uiolacei unc. iii. salis parum: fiat enema, quod infundetur ante pastum die minoris afflictionis. Si uerò grauitas in uentriculo fuerit, aut superioribus intestinis sumatur medicamentum leniens. Recipe cas. recens extractæ drach. vi. diapruni simpl. unc. ij. serapii ros. laxatiui unc. i. stillatitiis liquoribus intybi satiui latioris & buglossi excipiantur, fiatq; potio, quæ manè horis quatuor ante pastum sumatur. Curandum ut aluus quotidie excrementa deiciat, si non sponte ob nimium febris calorem, certè enemate infuso, aut sumpto leniente medicamento, aut balanis immisissis. Vomitus in hac febre non adeò, ut in tertiana intermittente conuenit, nisi nausea urgeat, & ægrotans facile uomat, tunc eliciatur aqua tepida, & pauco aceto. Vrina si rubra fuerit, aut ad ruborem tendens, incidatur uena iecoraria, nisi si quid aliud obstet, sanguisq; pro ægrotantis uiribus detrahatur. Si materia turgeat, detur in principio medicamentum eradicans: aut si multa est, detur medicamentum minuens propriam materiam: quæ omnia petenda sunt ex his quæ tradita sunt in febribus tertianis intermittentibus. Si uerò concoctio expectari potest, iuuanda est natura, ut ipsam celerius perficiat, hunc in modum. Recipe serapii acetati simp. oxy sacchare ana unc. i. ß. stillatitiorum liquorum oxalidis, buglos. ana unc. ii. Misceantur, & à ieiuno per biduum sumantur diluculo. Repetantur autem donec materia appareat perfecte concocta. Utatur elect. trium santalorum cum serapiis. Vti quoque licebit emulsione quatuor seminum frigid. cum serapiis, loco stillatitiorum liquorum in progressu febris, cui summa caliditas inesse uidetur. Deinde materia

teria concocta, detur aliquod solutium ex dictis in tertianis intermittentibus. Succurrendum etiam symptomatibus, & primò siti. Recipe serapij de limonibus, serapij uiolacei, ana ʒ.ij. Misceantur cum aqua frigida, si sit robustus, aliàs cum aqua cocta frigida, aut aqua hordei frigida, & utatur tempore sitis. Conueniunt etiam serapia de succo uuarum acerbarum, & de acetositate citri. Utatur etiam manu Christi perlata, tempore sitis, & sine siti quando libuerit, & hoc condito. Recipe conseruæ rosarum, conseruæ oxalidis, cōseruæ nymphae, ana ʒ.ʒ. pul. diamargar. frigid. ʒ.i. ʒ. fragmentorum communium lapidum preciosorum, corallij rub. ana ʒ.i. bracteas auri x. fiat conditum auro coopertum, quo utendum cum aqua cocta, & sine ea cum uolet.

Ad nimias uigilias.

Recipe serapii de papauere ʒ.i.ʒ. stillatitij liquoris lactucae ʒ.iiij. pul. diamarga. frigid. ʒ.i. semper enim sunt admiscenda quedam corroborantia propter narcotica. Misceantur, & bibantur appetente somni tempore.

Aut sic.

Recipe foliorum lactucae, foliorum salicis, foliorum cucurbitae, ana M.iiij. florum nymphae, florum uiol. rosa. rub. ana P.ij. corticis papaueris albi unc.i.ʒ. seminis papaueris albi contusi ʒ.ʒ. Decoquantur in aqua, qua & brachia, & crura lauentur.

Ad capitis dolorem.

Recipe olei rosa. ʒ.iiij. olei nymphae ʒ.ij. aceti ʒ.i. Misceantur, & fiat oxyrhodon: in aestate frigide, in hieme tepide.

Ad nigredinem linguae.

Z S

Reci

DE MORB. INTER. CVR.

Recipe muccaginis psyllii extractæ instillatio ros. liquore lib. i. madesiant in ea pāni linei, qui uicissim lingue superponantur. Curata febre, calor ab hepate hunc in modum tollatur. Recipe cerati santalini unc. iiii. olei nymphææ, olei rosa. ana ʒ. ii. lauentur hæc accuratè ad tollendam uiscositatē, ne obstructionem pariat, in aqua frigida, aut in stillatio rosarum liquore, deinde adiecto spicæ nardi ʒ. ʒ. misceantur, & hepatis regioni admoucantur tepidè.

Aut sic.

Recipe rosa. rub. florum nymphææ, florum uiolarum, an. p. i. ʒ. omnium santalorum, an. ʒ. i. ʒ. seminis oxalidis, seminis portulacæ, seminis intybi satiui latioris, ana ʒ. ii. spicæ nardi ʒ. ʒ. insuātur in sindone rubra, singaturq; sacculus in semilunæ speciem, qui stillatitiis liquoribus intybi satiui latioris & rosarum irrigatus, hepatis regioni admoucantur tepidè manè ante pastum. In morbi progressu tutius est cordi quàm hepati refrigerantia apponere, quoniam gibba pars hepatis uenas multas habet, quas metus est propter frigiditatem obstrui. Fiat igitur cordi hunc in modum. Recipe stillatitii liquoris ros. lib. ʒ. stillatitiorum liquorum oxalidis, & buglos. ana ʒ. iiii. omnium santalorum, utriusque corallii, ana ʒ. i. ʒ. pulue. diamarg. frig. ʒ. i. fragmentorum communium, preciosorum, an. ʒ. i. croci (ad seruandam naturalem temperiem partis) ʒ. ʒ. aceti ʒ. ʒ. fiat his commistis epithema cordi tepidè, si uideatur intensus calor.

CAUSI CVRATIO Cap. X.

Febbris hæc biliosa, & continua est, cum maximo, & ardore, & dolore, nullam, aut certè perquàm exiguan

quā habens requiē, nisi (ut synochus) in aurora, non à se quidem, sed à tempore, quod tunc est frigidius, & eo tempore cibus laboranti præbendus. Symptomata lōgē sunt signa. grauiora, quā in tertiana continua, ut sitis: cui tussicula superuenit, linguae ariditas, & nigredo, sed quæ non tantum apparent, cum aliquid humoris qui linguā humectat, à cerebrō in os defluit, mordicatio circa uētriculū, uel regionē hepatis, uel pulmonis, in quorū uasis plerumque putret bilis, quæ hanc febrē facit, aut in uenis cordi magis propinquis. Et quoniā uapores aliqui non cutem, ubi fieret rigor subeūt, sed musculos ossibus uicinos, ideo percipitur quasi quædā ossium fractura, nō tamen cū grauitate, ut in quartana, quia leuior, & tenuior est eorum materia. Delirium etiā solet cōtingere, propter uapores biliosos cerebrū ascendentes, propter quos oritur interdū phrenitis uera. Accidit etiā nonnunquā conuulsio, propter nimiam cerebri exiccationē à uehementi ardore. Prætereā uigiliæ, & inquietudo. Potest & hæc febris à sola bilis incensione sine putredine, ut synochus à sola sanguinis inflammatione sine putredine, fieri. victus ratio. Victus ratio sit humectans, & refrigerans, ac ad frigidū, & humidū alteretur, præsertim si à bile in pulmonibus prodeat febris. Potus aquæ frigide detur etiam ante concoctionē. Admo ueantur epithemata ad infrigidandū in ipsius febris augmento, & statu, nō expectata declinatione, capiti, cordi, hepatis, & testiculis. Curatio. Cæterum quoniā excrementa alui propter uehementem calorē plerumque sicca sunt, igitur curandi ratio ab enematis molliētis, et infrigidantis iniectione inchoanda. Recipe cas. recens extractæ ʒ. x. sacchari rub. ʒ. i. ol. uiol. ʒ. iiii. Cōmista hæc excipiantur lib. i. ʒ.

DE MORB. INTER. CŪR.

i.ß. decocti quatuor emollientium herbarum, adiecto fo-
liorum lactucae & cucurbitae, ana M. i. cum prunis x. fi-
atq; enema, quod ante pastum sine mora infundatur. Aut
ob causas superius frequenter commemoratas sumat labo-
rans medicamentum leniens, quod sequitur. Recipe cas-
sacens extractae 3. i. serap. uiol. 3. ß. excipiantur commu-
nis decocti unc. iij. ß. adiectis oxyphoenic. 3. vi. fiatq; po-
tio, quae ad auroram sumatur.

Aut sic.

Recipe pruna damasc. x. uuarum passarum detractis
uinaceis unc. ß. iij. flor. comm. an. P. i. quatuor semi. frig.
maior. an. 3. i. ß. oxyphoenic. 3. vi. Decoquantur in s. q.
aquae tantisper dum dimidium absumatur, colo deinde ex-
pressa transfundantur. Accipiantur iuris decocti colati
unc. iij. ß. mannae unc. i. cassacens extractae unc. ß. serap.
uiol. unc. i. Commistis omnibus fiat potio, quae sumatur
ad auroram. Quando autem aluus aegre soluitur, lenien-
tium quantitas est augenda. Quae quidem lenientia au-
cta non solum materias communes, sed & aliquid de ma-
teria propria educunt. Quod si leniente medicamento
natura non iuuari uideatur, eodem die glandes hunc in
modum paratae immittantur. Recipe mel. uiol. unc. ij.
salis triti 3. i. ß. fingantur balani iustae quantitatibus, hoc
est longitudinis quinque aut sex digitorum. Si uero ex
urina rubra aut aliis signis plenitudinis aegrotus sangui-
ne abundare uideatur, aut bilis uideatur sanguini mista,
poterit fieri uenae sectio, sed in ipso statim principio post
enematis eiectionem. Raro hac in febre fit sanguinis mis-
sio, ne bilis nimium efferuerat, maioresq; uires minuto
sanguine acquirat, ac morbus augeatur. Itaque uitanda,
nisi

uſi nos alia circumſtantiæ cogant, tuncq; non ultra qua-
 tuor uncias ſanguis detrahendus. Aduerſus ſitim detur
 aqua frigida, aut aqua hordei etiam frigida, aut aqua co-
 ſta, ſed quoque frigida. Dentur autem in magna quantita-
 te cum modico de ſcrapiis aut de acetofitate citri, aut de
 limonibus, aut omphacio, aut de ſacco oxalidis. Deinde
 fiant epithemata primum cordi hunc in modum. Re-
 cipe ſtillatitij liquoris roſati libram ꝑ. ſtillatitij liquoris
 oxalidis, ſtillatitij liquoris nymphae, ſtillatitij liquoris
 bugloſi, ana unc. iij. omnium ſantalorum, utriuſque co-
 rallii, ana ꝑ. i. ꝑ. margaritarum ꝑ. ꝑ. (roborant enim) cæ-
 phurae gr. iij. aceti ꝑ. ꝑ. croci ꝑ. ꝑ. Commiſtis omnibus,
 fiat epithema cordi tepide, hepatis uero ſequens epithema
 paretur. Reci. ſtillatitij liquoris intybi ſatiui latioris ꝑ.
 viij. ſtillatitij liquoris roſ. ſtillatitij liquoris cichorii, an.
 ꝑ. iij. omnium ſantal. ana ꝑ. i. ꝑ. caphurae gr. iij. aceti ꝑ.
 ꝑ. ſpicae nardi ꝑ. ꝑ. Commiſtis omnibus fiat epithema he-
 pati tepide per dies complures. Si magna quoque partiũ
 pectoralium exiccatio appareat, utendum unguento ſe-
 quenti. Recipe olei uiolacei, olei nymphae, an. unc. ij.
 muccaginis pſyllii in ſtillatitio roſarum liquore extra-
 ctæ unc. i. ꝑ. cere albæ q. ſ. fiat unguentum, quod lauetur
 ter, aut quater in ſtillatitio liquore plantag. eo deinde
 pectus ungatur. Conferet etiam renes, & dorſum ſequen-
 ti unguento ungere, licet in eis nullus percipiatur dolor.

Recipe unguenti Gal. ꝑ. iij. olei uiolacei, olei nym-
 phae, ana unc. i. ꝑ. caphurae gr. iij. his omnibus commi-
 ſtis, actu frigidis ungantur renes, & dorſum. Sequens
 quoque epithema teſticulis fiat. Recipe uini aromatici
 unc. i. ſtillatitij liquoris plantaginis, ſtillatitij liquoris
 nym-

DE MORB. INTER. CVR.

nymphaea, ana unc. iiii. His commistis, linantur testiculi, quoniam magnum habent consensum cum toto corpore. Si materia biliosa febrem faciens in principio multa appareat, metusq; sit eam à natura uinci nō posse, detur medicamentum materiam propriam minuens, quod minoratium proprium Medicorum uulgus appellat. Ea autem, quæ dantur leniendi uentris gratia, ad materias cōmunes educendas, si maiore quantitate exhibeantur, propriam materiam, ut dictum est, minuent. Materia uerò si turgeat, in principio detur medicamentum eradicans. Porro neque in morbi incremento, neque in statu dandum medicamentum propriam materiam minuens. Itaque diligenter est utrumque cognoscendum, & considerandum. Quibus autem signis morbi tempora discernantur, uidere est apud Galenum libro de Crisibus. Sumpto autem medicamento materiam minuente iuuatur natura ad humorem morbum facientem concoquendum serapiis infrigidantibus, & humectantibus hunc in modum.

Recipe serapii de acctositate citri, serapii *nymphaea*, serap. uiolacei, ana ℥. i. ℞. stillatitiorum liquorum oxalidis, intybi satiui latioris, buglos. ana ℥. iii. Misceantur, et à ieiuno per triduum diluculò sumantur. Recipe elect. ex tribus santal. ℥. ℞. utatur cum serapiis. Hæc autem repetantur, donec materia planè concocta uideatur. Causos exquisitus septimum diem non excedit, quò dum peruenerit, animaduertendum an natura moueatur ad crisin, & humorum morbum facientium expulsionem. Quæ si moueatur quidem, sed imperfectè, iuuanda est, per eam quidam uiam, qua euacuationem tentat. Si per fluxum sanguinis è naribus, iuuatur setis porcinis. De locis itidem aliis

liis dicendum, per quos se natura expurgare consuevit. Quod si natura nihil moueatur, remittatur tamē febris, ut octauo, aut nono die detur medicamentum eradicās, tunc in modum. Recipe rhabar. selecti ʒ.i.β. cinnamoni gra.v. oxyphœnicon ʒ.β. macerentur in stillatitio liquore intybi satiui latioris, & pauco uini albi horis xii. leinde exprimantur, adiicianturq; serapii rosa. laxatiui ʒ.ii. rhabarb. puluerati ʒ.β. hoc in declinatione est addendum, ut membra roborentur. Excipiantur stillatitiis liquoribus intybi satiui latioris, & buglosi, fiatq; potio, quæ hora quarta matutina sumatur.

Aut sic.

Recipe decocti communis ʒ.iiii.β. in quibus maceretur horis xii. corticum myrobalanorum flauarum confriatarū, oleo amygdalarum dulc. ʒ.β. lento deinde igni fricentur, & colentur, adiectisq; cas. recens extractæ ʒ.vi. electar. de succo rosa. ʒ.ii. serapii uiolacei unc.β. fiat potio. Recipe conferuæ rosa. conferuæ radicis buglos. an. ʒ.ii. Misceantur, & postridie manē sumantur. Febre soluta, ad morbi reliquias educēdas, fricationibus leuibus eliciatur sudor, & potu uini albi diluti. Eliciantur & urinae hunc in modum. Recipe emulsionis quatuor seminum frig. maiorum ʒ.ii. stillatitii liquoris intybi satiui latioris q.s. fiat potio, qua diebus aliquot utendum. Asperitati autem, & nigredini quoque linguae prospiciendū. Fricetur lingua panno linco molli leniter, qui aliquando immergatur muccagini psyllii, aliquando uerò malorum punicorum succo. Habeatur interdum in ore nucleus pruni carnis non expers. Os quoque hordei aqua colluatur frequenter, nonnunquam & frigida.

Ad

DE MORB. INTER. CVR.

Aduigilias.

Recipe serapij de papauere unc.i.ß. stillatitij liquoris lactuce unc.iiij.pul. diamargar.frigid.℥.i. (ut corrigatur mortificatio papaueris) his commistis fiat potio, quæ somni appetente tempore bibatur. Confert & crurū, brachiorumq; lotio, hunc in modum. Recipe foliorum lactuce, foliorum cucurbitæ, foliorum nymphææ, & florum eiusdem, an. M.i. foliorum salicis, & uitis, ana M.i.ß. De coquantur in aqua, qua crura, & coxæ uesperili lauentur: habent enim hæ partes magnum cum cerebro cōsensum. Prohibendum præterea magnum cerebri incendium, ne in phrenitidem incidat ægotans, hunc in modum.

Recipe olei rosa. unc.iii. olei nymphææ unc.i.ß. aceti unc.i. Misceantur, & fronti, & temporibus applicentur, in æstate quidem frigide, in hyeme uerò tepide. Quæ si non contulerint, fiat hunc in modum. Recipe unguenti popul. unc.ij. ol. nymphææ ol. rosa. ana unc.i. Misceantur, & fronti, & temporibus applicentur, deq; his in aures aliquid immittatur. Prohibenda etiam nimia exiccatio partium pectoralium, ne inde respiratio impediatur, & suffocetur laborans, hunc in modum. Recipe olei uiolacei, olei amygdalarum dulc. olei nymphææ, ana unc.i.ß. his commistis inungatur pectus frigide frequenter, fiant & epithemata hepatis, & cordi superius tradita. Si contigerit hac in febre naturam crisin per fluxum sanguinis e naribus facere, & sanguis plus quam par sit fluat, sistatur iniiciendo in nares bolum Armeniam cum stillatitijs liquoribus rosa. & plantag. aut admouendo cucurbitulas hypocōdrijs, utriusque quidem, si ab utraq; fluat nare sanguis: aut illi tantum quod est eiusdem lateris

cum

LIBER QVARTVS. 185

um nare è qua fluit sanguis. Laudant quoque practici
succum stercoris asinini, & porci. Plurimum ualet
etiam succus lysimachiae, si inueniatur. Sed hæc fusius
sunt tradita Libri primi. Cap. xxxi.

DE FEBRIBVS PHLEGMA

ticis.

Cap. XI.

Febbris phlegmatica duplex est, continua, & inter-
mittens. Continua frequentior est intermitten-
s, quartana non item.

QVOTIDIANAE FEBRIS PHLEG-
maticae intermittens, Curatio. Cap. XII.

Acc febris quotidiana dicitur, quia quotidie inua-
dit, & fere totum diem occupat. Longissimus pa-
roxysmus durat horas xvij. quietis uero horas sex hæ-
ret, quæ tamen uera quies non est, nam non perfecte quie-
rit, semper enim fit aliqua effusio, cum materia sit
crassa, & lenta. Paroxysmi nonnunquam breuiores
sunt, & tunc maior apparet quies. Signa autem uni-
uersalia, quibus hæc febris cognoscitur, & distinguitur
tertiana duplici, aut à quartana triplici, hæc sunt. Nã
febris hæc cum rigore non incipit, ut tertiana, sed prin-
cipio sentitur in extremitatibus frigiditas quædam, quæ
inde per totum diffunditur corpus, perinde ac si gla-
cies quædam comprimeret. Nulla est, aut certe minima
horripilatio, quoniam materia nec pungens est, nec acu-
ta, nisi forte esset à phlegmate salso. Frigiditati succedit
calor mitis propter pituitam, non autem uehemens, ut
in tertiana à bile. Nulla, aut per quàm pauca sitis est,
quæ alijs in febribus multa esse solet. Os habent hæc fe-
bre laborantes insipidum cum muccagine quadam uiscosa. Co-
lorem

A a

lorem

DE MORB. INTER. CVR.

lorem uerò liuidum, pallidum, aut plumbeum. Debilitas uentriculi hanc febrē comitatur ob pituitam, hinc mala concoctio, & uomitus phlegmaticus. Splenis quoque dolor, unde nonnunquā illi Hydriops succedit. Pulsus est mollis, debilis, tardus, et in principio paroxysmi inæqualis, & inordinatus. Quantò phlegma aquosius, tantò mollior pulsus est. Quantò uerò magis est uariū, & è diuersis phlegmatibus cōpositū, tantò pulsus inæqualior, & inordinatior. Cū uerò febris est à phlegmate salso, pulsus nō tā inæqualis, ac inordinatus, nec tā mollis, ac tardus. Urina in hac febre principio alba, & tenuis propter materiā crudam, ubi autē materia concoqui incipit, colorata, & turbida euadit. Cū autē concocta est, maior est eius quantitas, et spissitudo, frigus minuitur, calor augetur, accessio prolixior fit. Nā materia concocta, natura facta fortior maiorem materiæ copiā mouet, hinc fit paroxysmus longior. Sudor in hac febre nullus, nisi in statu uniuersali morbi, & declinatione: nā principij uniuersalis tempore materia nimis adhuc crassa est, & uiscida. Huius febris principij uniuersale longū est, durat enim interdum dies xviij. declinatio quoq; longa est, status uerò breuis, omnium uerò longissimum est augmentū. His igitur signis omnibus, aut pluribus ex eis apparentibus, non dubitabit quisquam febrem phlegmaticam appellare, præsertim si in corpore humido fuerit, ut in puero, aut sene, aut muliere, aut ocioso, & comedone, aut eo qui se uehementer post cibum exercet, aut qui cibis pituitam generantibus uictitauit, & hyeme, quo quidē tēpore febris hæc potissimū inuadit. Aestate enim rarò contingit, nisi à forti causa. Tam autē uictus, quàm curandi ratio sit

fit ad humores incidendos, et attenuandos idonea, magis quidē, aut minus pro humorū natura. Adnitatur hoc in affectu. Medicus magis morbi causam, quā morbū tollere, quod non sit in biliosis febribus. In huius febris principio per dies septem, aut octo, uictu utendū tenui. Utatur itaq; iure pulli cū modico panis. potusq; sit aqua cocta cum saccharo rubro, quod magis ad mellis naturā accedit. In progressu morbi utatur uictu paulò pleniore, quoniā febris hæc longa est. Poterit igitur uti oliuis, capparibus, ouis sorbilibus, iure cicerū rub. buglosso, betis. Quæ comedet obsonia condiantur cinnamomo & croco. Vino quoq; licebit uti, sed tenui, & oligophoro. Cibus sumatur horis quatuor ante paroxysmum. Vigiliæ, & exercitium magis ex usu sunt, quā somnus, & quies. In accessionis principio somnus uitetur. Ad iram quoque ægrotum concitare, non est inutile. Curandira tio potius ab enematis iniectione auspicanda, quā a lenientis pharmaci sumptione, potissimū si aluus (ut conuenit) excrementa nō deiciat. Nam stercus magis abundat in crassioribus intestinis, quā in alijs, impellitur enim deorsum à materia biliosa, quæ ad duodenum intestinum non fluit. Recipe maluarū, betæ, linozostidos, an. M. i. furfuris frumenti (ad abstersionē muccositatū intesti norū) in panno ligati. M. β. florum chamæmeli, et melialoti, an. P. i. Decoquantur in. s. q. aquæ ad tertias. Accipiantur iuris decocti lib. i. β. cas. recens extractæ, sacchari rub. an. ʒ. i. mellis uiolacei. ʒ. i. β. olei com. ʒ. iij. salis. ʒ. i. β. Commistis omnibus fiat enema, quod ante partum infundatur. Postridie uerò detur medicamentum leniens ad tollendas muccositates uentriculi, & superiorum

Aa 2 intesti

DE MORB. INTER. CVR.

intestinorū hunc in modū. Recipe cas. recens extra-
cta. ʒ. i. serapij adianti. ʒ. β. excipiantur. ʒ. iiij. β. stillati-
tiorū liquorū buglosi, & graminis, fiatq; potio, quæ su-
matur manē horis quatuor ante pastum. Prandeat dein-
de egrotans siue potio operata fuerit, siue nō, hora nō
insolenti. In morbi progressu nō utendū leniētibus me-
dicamentis ex cas. nā hac febre laborantes uentriculo im-
becillō esse solent, cas. autem, si quis ea frequentius uta-
tur, ipsum nimis emollit. In febris progressu, quoties al-
uus excrementa (ut expedit) nō deiciet, utendū enema-
prædicto, additis hieræ picræ Galen. ʒ. vi. quod tamen in
principio fieri nō debet. Hoc etiā enema, adiecta hiera
picra ut licebit solutū medicamenti loco, si contigerit
laborantē adeo debile esse, ut nō citra periculū solutiuo
pharmaco uteretur. In hac febre nō est timendū materiā
turgere posse, cū frigida sit, & immobilis, tanta tamen
esse potest, ut eam natura nō possit uincere, metusq; sit,
ne ab ea suffocetur. Tunc igitur dandum medicamētum
materiam propriam minuens, hunc in modum. Recipe
turpeti selecti. ʒ. i. zinzib. ʒ. β. (quando materia ualde
crassa est, ut est pituita uitrea, zinziberis quantitas au-
genda, aliās minuenda, ut cū est pituita) sacchari. ʒ. ij.
fiat puluis, qui cum stillatitijs liquoribus adianti & bu-
glosi ad auroram sumatur.

Aut sic.

Recipe elect. indi maioris. ʒ. ij. serapij adianti. ʒ. β. cō-
munis decocti. q. s. fiat potio, quæ ad aurorā sumatur. Ho-
ris sex post utrumuis horū medicamētorū sumptū, suma-
tur lotorium ex. ʒ. β. sacchari rub. & ʒ. vi. iuris cicerum
rubrorū. Nisi materia ualde multa appareat, minuens
pharmacum

pharmacum ante coctionem exhibendum non est: nam per medicamentū minuens sumptū materia agitata intumescit, & maiores obstructions parit. Neq; unquā ferē in hac febre fit crisis, neq; materia ad unicā criticā expulsionem seruatur: est enim crassa, lenta, ob id ualde tarda. Quamobrē morbi potius solutio fit, ut ait Galen. Dato igitur medicamento minuente, aut non dato, quia nō fuerit necesse, iuuanda natura ad humorū cōcoctionē attenuantibus, & incidentibus in principio quidē debilibus, progressu uerò fortioribus, & ualētioribus, gradatim ascēdendo, hunc in modū. Recipe mel. rosa. ʒ. i. ʒ. stillatitiorū liquorū, adianti, buglos. an. ʒ. i. ʒ. Misceātur & à ieiuno diluculò sumantur. Repetantur alijs quinq; diebus. Recipe Aromatici rosa. ʒ. i. ʒ. utatur cum serapijs. Die septimo sumat agrotus alterū ex medicamētis solutiuis paulò antè traditis. Debemus enim partim concoquere, partim euacuare. Deinde ubi dies aliquot quieuerit, materia rursus hunc in modū cōcoquatur. Recipe oxymelitos simpl. mel. rosa. colati, ana. ʒ. i. serapij de duabus radic. ʒ. ij. ʒ. stillatitiorū liquorū fœniculi, intybisatiui latioris, buglos. an. ʒ. iij. Misceantur, et à ieiuno per triduū sumantur diluculo. Recipe aromatici rosa. ʒ. ʒ. utatur cū serapijs. Repetantur hæc tribus alijs diebus. Deinde uacuetur. Recipe turpeti selecti. ʒ. iij. zinzib. ʒ. i. sacchari. ʒ. ij. puluerata iure cicerū rub. excipiātur, & ad aurorā sumantur. His factis, et nō ante, sit Medicus sollicitus de robore cerebri, uentriculi, et cordis tuēdo hunc in modū. Recipe cōseruæ adianti, cōseruæ ros. an. ʒ. ʒ. aromatici ros. in mollis elect. formā cōpositi. ʒ. ij. pul. elect. de gemmis (propter cor) pul. diarrhodi ab. an.

DE MORB. INTER. CVR.

3.i. coraliij rub. 3.iiij. sacchari. q.s. fiat cōditū auro coo-
pertum, quo frequenter utatur. Aut unguento sequen-
ti ungatur uentriculi regio. Recipe ol. absinth. olei
nardini, olei mastichini, olei ex cotoneis, an. 3.i.β. cora-
lij rub. galangæ, caryophyllorū, menthæ siccæ, cardamo-
mi, an. 3.i.β. ros. rub. 3.ij. ceræ parum, fiat unguētū, quo
uentriculi regio ungatur mane & uesperī antē pastum.
Aut uentriculo sequens admoueatur emplastrū. Recipe
emplastri de mastiche, emplastri pro stomacho, ana. 3.i.
coraliij rub. galangæ, an. 3.ij. subigantur cum oleo nardi-
no, fingaturq; emplastrum in scuti stomachalis figuram,
quod uentriculi regioni ante pastum applicetur. Ceterū
dum cibus ingeritur auferatur, ne prohibeat cibū in uē-
triculi fundū descendere, propter uim astringendi, qua
præditū est. Aut hunc in modū paretur sacculus, qui uen-
triculo admoueatur. Recipe menthæ siccæ, absinthij
sicci, sisymbrij, an. M.β. rosarū rub. florū rorisma. an. P.i.
coriandri preparati. 3.β. caryophyllorū. 3.ij. maceris. 3.
i. insuantur hæc puluerata in panno sericeo raro, & ru-
bro, fingaturq; sacculus acu interpunctus in scuti (ut lo-
quuntur) stomachalis figurā, qui super uentriculi regio-
nē deferatur. Rursum ubi ægrotus dies aliquot quicue-
rit, humores hunc in modum cōcoquantur, morbus enim
est diuturnus. Recipe serapij byzantini, serapij de rad.
serapij adianti, an. 3.ij. stillatitiorū liquorū, absinthij, fœ-
niculi, buglossi, an. 3.iiij. Misceantur, & à ieiuno per qua-
triduum diluculò sumantur. Recipe electar. diamoschi
dulc. 3.i. utatur cū serapijs. Repetatur hæc alijs quatuor
diebus. Hac in febre rarò fit sanguinis missio, nisi labo-
rans sanguine admodum abundare uideatur, sitq; urina
rubra,

rubra, tunc poterit sanguis in exigua tamen quantitate
 mitti, cū lata diductione uenæ. Probatur in huius febris
 curatione uomitus, sed non ante septimū, aut octauū diē,
 nā ante hos dies materia ualde cruda est, quæ nō euome-
 retur sine magno & dolore, & labore. Tutò autē potest
 prouocari uomitus, signis cōcoctionis apparētibus. Post
 igitur septimū diē, præsertim si facile uomat laborans,
 atq; adsit nausea, aut apparenti coctionis signis prouoce-
 tur uomitus, ante paroxysmum, leuat enim ipsum, & mi-
 nuit, uel in augmēto paroxysmi circa ipsius principiū,
 nō aut in principio paroxysmi, nā tunc est magnum frē-
 gus. Hunc aut in modū eliciatur. Recipe seminis atrē-
 plicis, seminis anethi, seminis raphani, an. ʒ. i. Decoquan-
 tur in .s. q. aquæ usq; ad dimidij cōsumptionē. Accipiātur
 iuris decocti. ʒ. vi. oxymelitos simpl. aut scillini, si ualde
 sit crassus humor. ʒ. i. ʒ. Cōmista hæc bibantur tepida, an-
 te paroxysmū, ut dictū est. Quòd si uomitus tēporibus il-
 lis elici nō potuerit, cibetur æger raphanis et piscibus sa-
 litis, & sumantur prædicta post cibum. Vrina quoq; eli-
 cienda, per quam aliquid de materia propria morbū fa-
 ciēte euacuari potest, id quod efficiet asarū, nam aperit.
 His omnibus peractis, perseuerante febre, si tædeat agro
 tantē tot pharmacorū, & serapiorū, utatur sequēti apo-
 zemate. Recipe quinq; radicum com. maceratarum in
 aceto, ana. ʒ. ʒ. quinque herbarum capil, pimpinellæ, cas-
 suthæ, ana. Manip. i. pentaphylli, filipendulæ, absinth. an.
 Manip. ʒ. buglossi cum rad. Manip. i. uuarum passarum
 detractis uinaceis. ʒ. i. seminum apij, anisi, fœniculi, ana.
 ʒ. ij. quatuor seminum frigid. maiorum, ana. ʒ. ʒ. cicerum
 rubr, Manip. ʒ. trium florum com. ana. P. i. medullæ
 A a 4 cnici,

DE MORB. INTER. CVR.

cnici, agar. in pastillorū formam redacti, ana. vi. turpe-
ti selecti. 3. β. zinzib. 3. i. polypodij quer. 3. i. foliorū sen-
næ oriental. 3. β. Decoquantur in. s. q. aquæ tantisper dū
absumatur dimidiū. Accipiantur iuris decocti lib. ij. adie-
ctisq; sacchar. & melle, dulcedo inducatur, fiatq; in zu-
lapij modū, quod depuretur, deinde adiectis cinnamomi
selecti. 3. iij. iucundiore & odore, & sapore reddatur. Eo
utatur laborans dies sex appetēte diluculo. Propter lon-
gitudinē morbi debilitantur uentriculus, & hepar, hinc
& prima, et secunda cōcoctio malē perficiuntur, quo fit,
ut & pedes, & crura intumescere uideātur, immineatq;
aquæ inter cutē periculū, cui hunc in modū occurrendū.

Recipe corticū radic. cappar. 3. i. quinq; rad. com. ma-
ceratarū in aceto, an. 3. β. eupatorij, pentaphylli, filipen-
dulæ, absinth. an. M. β. quinque herbarū capil. pimpinel-
læ, an. M. i. asari, cassiæ lignæ, an. 3. ij. cicerū rub. Manip.
β. seminū anisi, apij, fœniculi, ana. 3. ij. quatuor seminum
frigid. maiorū, an. 3. β. florum sambuci, & genistæ, an. P.
i. β. trium florum com. an. P. i. medullæ cnici (ducit aquo-
sum humorē, ob id in maiori quantitate ponendū est) 3. i.
polypodij quer. foliorum sennæ orientalis, an. 3. vi. agar.
in pastillorū formā redacti. 3. β. corticum myrobalano-
rum, cepularum, & empeliticarum, confricatarum oleo
amygdalarum dulc. an. 3. β. Decoquantur in. s. q. aquæ do-
nec dimidium absumatur. Accipiātur iuris decocti lib. ij.
adiectisq; saccharo, & melle fiat scrapiū mediocriter
coctum, quod depuretur, in eo deinde macerētur rhabar.
selecti. 3. iij. quæ horis post duodecim exprimantur. Po-
stremò adiectis cinnamomi selecti. 3. ij. spicæ nardi, &
iunci odorati, an. 3. β. suauiore & odore, et sapore reddat-
tur.

tur. Eo utetur laborans diebus. v. appetēte diluculo. Por-
rò quoniā appetitus hac in febre deijcitur, eum hunc in
modum excitabimus. Recipe serap. de absinthio. 3. iij.
sumantur ante pastum per horam manē, & uesperī duo
aut tria cochlearia: aut uinum absinthile bibatur: & id
potissimū in declinatione. Cū autem egrotus debilis
relictus est, et conualefcit, ut maturius reficiatur, utatur
aromatici ros. 3. ij. s. horis ante prandium & coenā dua-
bus. Utatur et pilul. sequētibus. Recipe pil. alephang.
3. iij. agarici in pastillorum formam redacti. 3. i. s. masti-
chis. 3. s. Excipiantur melle rosa. finganturq; pilul. vi. ē
drachma, de quibus sumantur tres per horā ante coenam
bis, aut ter in hebdomada. Et non solum his pilul. utatur,
qui ab his febribus reualefcunt, sed & ab alijs omnibus.
Si uerò uideatur aliqua caliditas in hepate relictā, quod
rarò in febribus phlegmaticis contingit, sæpe autem in
biliosis, addatur prædictis pilul. rhabarb. & oxyphœni-
con, ana. 3. s.

DE FEBRE PHLEGMATICA, IN
qua Melancholia admista cum Pituita

est.

Cap. XIII.

Febri hac inuadit cū frigore, putatq; egrotās ossa signo.
sibi frangi, quod propter melancholiæ grauitatem
cōtingit. Materiæ cōmunes & enematibus, & leniēti-
bus medicamētis in febre superiore proxima traditis ua-
cuentur. Serapia aut, & solutiua pharmaca nō solum pi-
tuitam concoquant, & uacuent, sed & melancholiā, pro-
cedendo gradatim à minūs incidētibus, ad magis inciden-
tia & aperientia. Materia igitur hunc in modū conco-
quatur. Recipe oxymelitos simpl. 3. iij. stillatitij li-

Aa 5 quoris

DE MORB. INTER. CVR.

guoris buglosi (propter melancholiam) 3.iiij. stillatiti
liquoris foeniculi. 3.ij. Misceantur, & adiecto cinnamo
mo origratoria reddantur, quibus per biduum egrotus
diluculo utetur. Repetantur & alijs quatuor diebus.

Recipe cathol. 3.vi. confect. Hamech. 3.i. 3. diaphoen
ci. 3.ij. (plura sunt, quæ pituitam respiciunt, nam nos pe
nimus eam dominari alijs) mellis rosa. col. 3.i. communis
decocti. 3.iiij. 3. adiectis in eo cassuthæ, florum buglos. et
cirsi, an. P. i. sennæ, thymi, & epithymi, ana. 3.i. fiat po
tio, quæ hora quarta matutina sumatur. Recipe con
seruæ rad. buglo. 3. 3. pul. diamoschi dul. 3. 3. Misceantur,
& postridie manè sumantur. Cum aut dies aliquot egro
tus quieuerit, rursus materia hunc in modum concoqua
tur. Recipe oxymelitos compositi. 3.ij. serapij de bu
gloss. 3.i. stillatitiorum liquorum, fumariæ, absinthij, fo
eniculi, an. 3.i. Misceantur, & adiecto cinnamomo sapo
re suauiore reddantur, quibus egrotus per triduum dilu
culò utetur. Repetantur hæc altero triduo. Vacuetur de
inde sumpto medicamento solutio prædicto.

Aut sic.

Recipe pilul. de agar. 3.ij. pil. indarum. 3. 3. Excipiã
tur stillatio liqore buglos. finganturq; pilul. vij. quæ
circa noctis dimidium sumantur. Postridie sumatur
bolus paulò antè traditus. Interea augmenti uniuersa
lis præsertim, & flatus tempore cor hunc in modum ro
borandum. Recipe conseruæ rad. cirsi, conser. buglosi,
corticis citri, saccharo conditi, ana. 3. 3. conseruæ rosa
rum, conseruæ uiolarum, (propter febrem, neque enim
est tantopere negligenda, ut nihil non, quod eam respi
ciat, addamus, quod tamen in minori quantitate esse de
bet)

LIBER QVARTVS. 190

bet) ana. 3. i. ʒ. pul. elect. de gem. pul. electarij diamoschi
dulc. (quod si desit, eius loco pliris cum moscho) pulueris
diarrhodi Abbatis, ana. 3. i. fragmentorum pretiosorum
communium, ana. ʒ. i. margaritarum. ʒ. ij. bractes au-
ri. x. saccha. quantitate sufficienti fiat conditum, quo se-
pe utatur. In declinatione uero, & non ante, cor hunc
in modum roboretur.

Recipe pul. diarrhodi abb. pul. diamoschi dulc. ana. 3.
i. ʒ. pul. aromatici rosa. maior. ʒ. iiij. conseruæ rosa. cor-
ticis citri saccha. conditi, ana. 3. i. ʒ. sacchari dissoluti in
stillatio liquore buglossi, quantitate sufficienti singa-
tur electar. solidum romborum figuram, sintq; singule
rhombi ponderis. 3. ij. è quibus sumatur unus, duabus, aut
tribus horis ante pastum. Quo deglutito, bibatur pa-
rum uini diluti. Post declinationem, ubi reualefcere
coeperit, ut maturius reficiatur, utatur pil. sequentibus.

Recipe pil. alephang. 3. ij. agar. in pastillorum formã
reducti. ʒ. iiij. foliorum sennæ orientalis. 3. i. Excipian-
tur serapio de buglossi, singanturq; pilul. vi. è drach. de
quibus tres sumat per horam ante cœnam alternis die-
bus. Robur autem uentriculo hac in febre addatur, præ-
sidijs in febre proxima superiore traditis.

FEBRIS PHLEGMATICA QVO-

tidianæ à pituita mista cum bile, hoc est,

à phlegmate falso, Curatio.

Cap. XIII.

HAc in febræ materiæ cōmunes uacuētur, et enema-
tibus, et leniētibus medicamētis traditis in febre à
bile uitellina proueniente. Concoquant aut serapia, &
uacuent

DE MORB. INTER. CVR.

uacuent solutiua medicamenta non solum pituitam, se-
 & bilem, magis quidem aut minus, prout ipsa cū pitui-
 ta miscetur. Nam si solam pituitam uacuaremus, feru-
 ret, fureretq; bilis, & quoddam aliud febris genus long-
 periculosius excitaret: Si uero sola bilis educeretur, pi-
 tuita incrudaretur. Itaq; danda sunt mista medicame-
 ta. Materia autem si multa appareat, non expectata co-
 ctione, detur medicamentum utranque minuens hunc in-
 modum. Recipe rhabar. selecti. ʒ. i. cinnamomi gra. v.
 agarici in pastillorum formā redacti. ʒ. iij. propterea
 quod superat pituita bilem, datur agaricus in maior-
 dosi: macerentur in oxymelite simp. & stillatitijs liquo-
 ribus intybi satiui latioris, & buglossi horis duodecim.
 deinde exprimantur, adiectisq; cas. recens extractæ. ʒ. iij.
 mellis rosa. col. ʒ. i. communis decocti. ʒ. iij. ʒ. fiat potio,
 quæ sumatur ad auroram horis sex, ante lotorium supe-
 rius sæpe commemoratum.

Aut sic.

Recipe cas. recens extractæ. ʒ. ʒ. diaphoenici. ʒ. ij. ele-
 ctariū de succo ros. ʒ. i. pro bilis copia possumus aut au-
 gere, aut minuere doses. mellis rosa. col. ʒ. i. Excipiantur
 cō. decocti. ʒ. iij. ʒ. fiatq; potio, quæ ad aurorā sumatur.

Aut sic.

Recipe pilul. aggregat. respiciunt utranq; materiā,
 magis tamen pituitosam. ʒ. iij. Excipiantur stillatitio
 foeniculi liquore, singanturq; pilul. vij. quæ circiter no-
 ctis dimidiū sumantur. Dato medicamento materiā mi-
 nuente, aut nō dato, si forte dari nō expediebat, materiā
 hunc in modū cōcoquemus. Recipe serapij acetati sim-
 pli. ʒ. ij. mellis ros. col. ʒ. i. stillatitiorum liquorū absinth.
 intybi

LIBER QVARTVS. 191

intybi satiui latioris, fœniculi, an. 3. i. ʒ. cinnamo. parū,
saporis gratia. Misceantur, & à ieiuno per triduum su-
nantur diluculo. Repetantur & alijs quatuor pōst die-
bus. Vacuetur deinde sumpto aliquo de solutiuis medi-
camentis prædictis. Interea in augmento, & statu uni-
uersali, partes principes hunc in modum roborentur.

Recipe conseruæ rosarum, conseruæ buglossi, cōseruæ
adianti, ana. 3. ʒ. pul. diarrhodi abb. respicit utraq; ma-
ceriam. 3. ij. manuschristi cum unionibus. 3. ij. pul. elect. de
gem. pul. diamoschi dulc. an. ʒ. ij. fragmentorum commu-
nium pretiosorum, an. ʒ. i. bractæas auri, si sit diues. x.
sacchar. q. s. fiat conditum auro coopertum. In declinatio-
ne uerò hunc in modum robur eisdem addemus. Recipe
pul. diarrhodi abb. pul. diamoschi dulc. ana. 3. i. ʒ. corallij
rub. ʒ. ii. sacchari dissoluti in stillatitio liquore rosa. q.
singatur elect. solidum in rhomborum figuram, sintq;
singuli rhombi ponderis. 3. ii. è quibus sumatur unus dua-
bus, aut tribus horis ante pastum mane, & uesperis. Cū
autem ægrotus dies aliquot quieuerit, materia rursus
hunc in modum concoquatur. Recipe serapii intybi
lati folii compositi uncias duas, mel. rosa. col. 3. i. ʒ. sera-
pii adianti. 3. i. stillatitiorum liquorum absinthii, fœnicu-
culi, cichorii, an. 3. iii. Misceantur, odorisq; & saporis
gratia parum cinnamomi adiciatur, & à ieiuno per tri-
dium sumantur. Repetantur & altero triduo. Vacuetur
deinde sumpto aliquo ex prædictis medicamentis soluti-
uis. His omnibus peractis, si perseueret febris, & denuo
materiam concoquere opus sit, utendum serapiis proxi-
mè dictis, mutato duntaxat serapio de intybo lati folio
composito in serapium byzantium. Post declinationem
febris,

DE MORB. INTER. CVR.

febris, ubi reualefcere ægrotus cœperit, ut maturius ref-
ciatur, utatur pilul. fequentibus. Recipe pil. Alephang
ʒ. ij. β. agarici in pastillorum formā redacti. ʒ. i. rhabar
selecti, oxyphœnicon, an. ʒ. ij. Excipiantur serapio ros
laxatiuo, finganturq; pil. vi. è drachma, de quibus sumat
tur tres alternis diebus per horam ante cœnam.

LIPIRIAE, ET HEPIALAE FEBRIVM
(ex Arabum magis, quàm Galeni sententia, ut
etiam multa antè dicta) Curatio.

Cap. XV.

Causæ He-
pialæ.

HAc quoque febres de genere quotidianarū inter-
mittentium sunt. Verū in Hepiala interiora in
toto paroxysmo, excepto corde frigent, exteriora uerò
calent. In Lipiria contrà est. Fit Hepiala à phlegmate
uitreo, quod uel in uentriculo, uel in hepate, uel in liene,
uel aliquo alio uiscere interiore, putà in aliquo interio-
re musculo putret pro parte aliqua fui, pars uerò altera
non putret. Vapores autem à parte putrescente in exte-
riores corporis partes elati, in illis calorem excitant.
Pars autem, quæ nondum putruit, agitata, frigoris in in-
terioribus causa est. Ante quàm autem à natura agitare-
tur, non infrigidabat, quòd ei loco in quo quiescebat, as-
suetæ, & familiaris foret.

Lipiria
causæ.

Lipiria fit à phlegmate quoque uitreo, in interiore
aliquo uiscere putrescente: sed phlegma illud crassum nō
est, sed aqueum, & bili permistum, quod in interioribus
putrescens, ibi calorem excitat: uapores autem, qui exte-
rius feruntur, quoniam sunt debiles, nec multi, citò frige-
scunt: quo fit, ut exteriora frigeant, interiora uerò ca-
leant. Materie cōmunes & enematibus, & lenientibus
icaz

medicamentis traditis in superioribus febribus phlegmaticis uacuentur, dictis quoq; ibidem medicamentis solutis utendum. Concoquatur autem materia & uacuetur, ut dictum est, incipiendo à minus incidentibus, & attenuantibus, ut ab oxymelite simpli. stillatitijs liquoribus fœniculi, buglossi, & absinthij, adiecto cinnamomo odoris, & saporis gratia, ascendendo gradatim ad magis incidentia, attenuantia, & aperientia, ut ad serapium de duabus radicibus, postremò ad oxymeli compositum, cum stillatitijs liquoribus prædictis. Interea sollicitus sit Medicus de robore partium internarum, hunc igitur in modum roborande. Recipe, corticis citri saccharo conditi. ʒ. i. conseruæ rosarum, conseruæ adianti, ana. ʒ. ʒ. aromat. rosar. maior. in elect. mollis formam compositi. ʒ. ʒ. pul. diamoschi dulc. ʒ. ij. pul. elect. de gem. ʒ. i. ʒ. Excipiantur serapio conseruationis corticis citri, fiatq; conditum auro coopertum, quo utatur sæpe laborans & in paroxysmo, et extra paroxysmum. Extrinsecus autem uentri culus roboretur, ad motis præsidij in superioribus febribus phlegmaticis dictis. Porro quoniam pituita hæc uictræ in intestina nonnunquam decumbit, doloremq; efficit colicum, id si hac in febre contigerit, et hunc in modum medebimur. Recipe maluarum, helxines, florum chamæmeli, brassicarum rubrarum, ana. Ma. i. medullæ enici. ʒ. vi. centauri minoris Ma. i. seminum anisi, anethi, fœniculi, an. ʒ. ij. Decoquantur in .s. q. aquæ, aut iuris omarum coctorum ad tertias. Accipiantur iuris deco. lib. i. cas. sacchar. rub. an. ʒ. i. mel. anthosati. ʒ. i. ʒ. hieræ Gale. aut diaphœnici. ʒ. vi. ol. chamæmel. ʒ. iij. salis fossilis. ʒ. i. ʒ. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum iniiciatur.

DE MORB. INTER. CVR.

iniiciatur. Agaricus in colico dolore non miscendus enematibus, intestina enim lædit. Conferet & plurimum sequens enema. Recipe gallum unum annosum, fatigetur, sæpeq; uerberetur, tandem caput abscindatur, sanguisq; effluere sinatur. Deinde in .s. q. aquæ decoquatur adiectis medul. cnici, polypod. quer. an. 3. vi. semin. anisi anethi, foenic. an. 3. ii. florum de chamæmel. & meliloti an. P. i. β. accipiatur iuris decocti lib. i. adiectisq; saccharub. mel. rosa. col. ana. 3. i. hieræ Gale. 3. β. ol. anethi. 3. iii. fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Interea uerò disparantur enemata, si laborās ingenti dolore afficiatur, sequenti fotu foveatur. Recipe althææ, florum chamæmeli, & meliloti, an. M. i. β. seminum lini, et fœnogræci, an. 3. ii. Decoquantur in aqua, qua calida foveatur uenter. post fotum ungatur ol. chamæm. & aneth. æquis portionibus mistis. Hoc quoque mox iniiciatur enema. Recipe olei chamæmeli, ol. aneth. an. lib. β. fiat enema, quod post fotum, & unctionem iniiciatur, post hoc, suprā dicta ad perfectam curationem addantur.

Q VOTIDIANAE FEBRIS CONTINUÆ, Curatio. Cap. XVI.

IN hac febre humor intra uenas putet. Victus ratio sit tenuior, quàm in intermittente, minusq; ad calidum, & siccum declinet. Vino igitur non utatur, nec odoramentis. Cibus autem exhibeatur egrotto, quo tempore minus affligitur. Id autem tempus accurate obseruandum. Materiarum communiumeductio, materie propriæ minutio, concoctio, & eradicatio, remediis in Febre quotidiana intermittente traditis fiant, aucta in serapiis concoquentibus serapij

rapij intybi fatiui latioris quantitate. In conditis quoq;
diarrhodi abb. & cōseruæ rosa. quantitas augeatur. Pilu.
alephang. quæ reualefcentibus, ut maturius reficiantur,
exhibentur, addantur refrigerationis gratia, ad reprimē
dam aromatum caliditatem myrobalani, aut aliud eadem
facultate præditum.

FEBRIS SINCOPALIS AB HVMORE
phlegmatico Curatio. Cap. XVII.

HAcc febris sic dicta est, q, in paroxysmo solet su-
peruenire Syncope, & maximè circiter uesperam
pituitæ accommodam, si quidem febris intermittens sit:
si uerò continua fuerit, in exacerbatione Syncope cōtin-
gere solet. Sunt quoq; hæ febres de phlegmaticarum Causæ.
genere interdum, à multa pituita uenenata, à qua putre-
fcente uenenati uapores ad cor efferuntur, à quibus spi-
ritus leduntur. Hæ autem febres magna ex parte lethaa-
les sunt quoniam medicamento solutiuo materia uacua-
ri sine periculo non potest. Medicamentum nanque so-
lutiuum materiam illam uenenatā magis agitare, quā
in paroxysmo agitari solcat, quare & grauiorem Synco-
pem induceret. Non sunt igitur danda neque minuen-
tia medicamenta materiam propriam, neq; eradicantia,
sed tantum lenientia aluum, atque enemata ad materiariū
cōmunium uacuationem. Duo traduntur huius febris cu-
randæ modi. Primus à Gal. qui iubet agrotantem frica-
tionibus ualidis panno aspero per triduum fatigari, ex-
cepto somni tempore, qui quidem somnus breuis esse de-
bet. Primum fricentur pedes, & crura, deinde reliquum
corpus ascendendo usque ad brachia, & manus, quæ etiā
fricentur, deinde collum, dorsum denique, & pectus. Fric-

Bb

centur

DE MORB. INTER. CVR.

centur autem, & dorsum & pectus oblique, latera uersus, ut à corde uapores auertantur: ceteræ autem parte rectè deorsum uersus. Pannus autem, quo fricatur pectus, suffiatur caryophyllis, agallocho, & cortice citri si per prunas incensis. Toto autem hoc triduo, quo fricatur, utatur solùm aqua mulsa cum hyssopo: huncq; tenuissimũ uictum, si uires permittant, ad septimum usque differat. Secundus modus ab Auerroce, & Alexandro traditur, iubentibus hanc febrem curari serapijs incidentibus, attenuantibus, aperientibus, & medicamento solutiuo debili, & forti: quale est turpetum, quod cum zinzibere forte est: si uerò in pauca quantitate detur, debile est. In summa, ægrotantis cubiculum sit lucidum, moderatè autem calidum, ac frigidum. Nam si calidus fuerit, uires resoluet: si uerò frigidius, per ipsum obstructio fiet. Si calidius fuerit, alteretur infrigidantibus superius sæpe commemoratis: si frigidius, temperetur igne facto ex rore marino, iunipero, & id genus alijs aromaticis lignis. Fiat & hic suffitus in cubiculo.

Recipe thuris, masticis. ana ʒ. i. corticis citri sicci ʒ. ʒ. styracis calamitidis, agallochi, caryophyl. ana ʒ. iij. ex his leniter contusis suffitus fiat paulò antè paroxysmũ.

Ægrotantis cubiculum ne sit in loco humido, acrum enim humidus illi obest. Utatur uino albo oligophoro à principio, quamuis in alijs febribus non detur, nisi apparentibus concoctionis signis. Cibus sit paucissimus, sed qui sæpe exhibeatur, sitq; concoctu facilis, ut ouorum uitelli, pulli parui, pulli contusum, aut stillatus liquor ex pullo conciso in frustula, & contuso, stillatio rosarum liquore rigato, ac uino albo, caryophyllorum,

rum, santalorum, & cinnamomi puluere consperso.

A principio, aut certè post fricationes, cor sequenti epithemate roborandum.

Recipe stillatitij liquoris buglosi, stillatitij liquoris cirsi, stillatitij liquoris melissophylli, ana lib.ß. agallochi 3.ij. corticis citri sicci 3.i.ß. croci 3.ß. His commistis, fiat epithema cordi panno in chermes tincto immerso, & admoto. Deinde fingatur sacculus, qui cordis regioni semper adhæreat hunc in modum.

Recipe melissophylli, florum buglosi, florum cirsi, an. P.i.ß. caryophyllorum, cinnamomi, agallochi, an. 3.i.ß. santalorum omnium, ana 3.i.rosa. rub. 3.ß. croci. 3.ij. cocci infector. drach. i. moschi, ambari. ana 3.i. Insuantur hæc puluerata panno sericeo rubro, & raro, fingaturq; sacculus acu inter punctus, in cordis figuram, cuius pars augustior infrà, latior suprà dum cordi admouetur, collocetur. Materie communes sequenti enemate uacuentur. Recipe iuris decocti hordei, & furfuris, lib. i. uitellos duos ouorum, sacchari rub. 3.i. olei com. 3.ij. His comistis fiat enema, quod ante pastum infundatur. Hac febre laborantes neque meiendi, neque alui exonerandæ causa surgant è lecto, ne motus moueat humores, syncopeq; mox sequatur. Prohibeantur à somno syncopes tempore. Materia ciusmodi serapijs cõcoquatur. Recipe oxymelitos simpl. 3.ij. stillatitiorũ liquorũ buglosi, foeniculi, hyssopi, an. 3.ij. Misceantur, & à ieiuno per biduũ sumantur. Repetatur autem & alijs quatuor diebus. Deinde utatur sequenti medicamẽto solutiuo. Recipe turpeti selecti 3.ß. zinzib. gra. vi. saccha. 3.ij. Puluerata hæc stillatio buglosi liquore excepta ad aurorã sumantur.

DE MORB. INTER. CVR.

In morbi progressu, perseverante febre, & constante uirtute, utendum serapio de duabus rad. & stillatitijs liquoribus fœniculi, & buglosi, sicq; deinceps ascendendo à minùs incidentibus ad magis incidentia, attenuantia, & aperientia, ut in superioribus febribus phlegmaticis dictum est.

FEBRIS SYNCOPALIS AB ILIOSO humore Curatio. Cap. XVIII.

Causa. **F**it hæc febris à bile supra modum tenui, & uenenta in corpore iuuenili, macro, rara texture, & bilioso. Si igitur quispiam in paroxysmi principio Syncopem patiatur, & talis fuerit, qualem descripsimus certò à bile esse, nò à phlegmate possumus affirmare, idq; maxime si tempus anni, aut Aestiuum, aut Autunnale fuerit, quibus quidem temporibus in eas temperaturas grassari solet. Adde q, si sit intermittens, tertio quoque die paroxysmum facit: sin continua, exacerbationem. Plerumque lethalis est, & uix ad quartum paroxysmum peruenit, quin iugulet. Aer cubiculi, in quo decumbit ægotas, ad humidum, & frigidum declinet aut natura, aut arte.

Curandi ratio. Prohibeat Medicus quanta poterit diligentia, nimiam euaporationem, quæ multa contingere solet in corporibus raris, uiresq; exoluit. Immergatur igitur ueluti in balneo, in stillatio rosarum liquore, aut linteo in stillatio rosarum liquore madefacto inuoluatur: aut, quod conducibilius uidetur, inuoluatur linteo, puluere è rosis siccis consperso. Cibum sumat ægotans paulò ante paroxysmum. Quòd si tunc non licuerit, in ipsius paroxysmi principio. Cibus autem sit uitelli ouorum cum omphacio, panis in minutissimas partes, ueluti in scobem redactus

Etus & coctus (panatam uulgò appellāt) hordei cremor
 eum malorum Punicorum succo, aut ius stillatitium ex
 carnibus pulli irrigatis, stillatitijs liquoribus rosarum,
 oxalidis & bugloſi. Vinum bibatur acerbum, & pon
 ticum, dilutū aqua frigida, aut iure decocti cirſii radicis.
 Extra paſtum utatur aqua hordei cum zula pio roſa. In
 primis, quanta poterit Medicus maxima diligentia ſyn
 copæ occurrat, eiq; hunc in modum medeatur. Recipe
 manus Chriſti cum unionibus, & ſantalīs ʒ.ij. utatur fre
 quenter. Utatur & ſequenti condito. Recipe conſer
 uæ roſa. conſerue radic. cirſii, ana ʒ.ij. corticis citri, ſac
 charo conditi. ʒ.ij. fragmentorum comm. præcioſorum,
 margaritarum, ana drachm.ʒ. ſcobis auri, & argenti,
 ana ſcrupul. i. ſacchari quantitate ſufficienti fiat condie
 tum, quo ſepe utatur laborans. Utatur & potione ſe
 quenti cor mirificæ iuuante.

Recipe pul. diamarga. frigid. ʒ.ij. corallij rubr. ʒ.ʒ.
 compositionis alchermes, compositionis de hyacintho,
 ana. ʒ. i. ſerapij de acetofitate citri ʒ. i. excipiantur ſtil
 latitijs liquoribus oxalidis, & bugloſi, fiatq; potio, quæ
 ſyncopes tempore ſumatur. Non fiant hac in febre frica
 tiones, quoniam humores nimium ſubtiles ſunt, & te
 nues. Vacuentur autem materiæ communes aut bala
 nis, ut ſuperiùs ſepe dictum eſt, immiſſis, aut enema
 te, aut medicamento leniente ſumpto hunc in modum.

Recipe maluarum, uiolarum, althææ, betæ, ana Mani
 pul. i. pruna. xij. foliorum lactucæ Manipu. ʒ. Decoquan
 tur in ſufficienti quantitate aquæ ad tertias. Accipian
 tur iuris decocti libr. i. caſ. recens extractæ. ſacchari rub.
 ana ʒ. i. olei uiolacei. ʒ. iij. Cōmiſtis omnibus fiat enema,

Bb 3 quod

DE MORB. INTER. CVR.

quod ante pastum iniiciatur. Leniens autem medicamentum huiusmodi sit. Recipe pruna damasc. x. zizipha. vij. uuarum passarum detractis uinaceis. 3. 1/2. oxyphoenice. 3. i. Decoquantur in sufficienti quantitate aquae donec dimidium absumatur. Accipiatur iuris decocti. 3. iiij. mannae drachm. x. aut cas. recens extracta. 3. i. serapij de acetositate citri. 3. 1/2. his commistis, fiat potio, quae mane horts quatuor ante pastum sumatur, aut per horam duntaxat, si diutius in ediam ferre nequeat. Cor deinde refrigerare, & corroborare sequenti epithemate plurimum conferet. Recipe stillatitij liquoris ros. 3. viij. stillatitiorum liquorum oxalidis, nymphae, buglossi, ana unc. iij. omnium santalorum, utriusque corallij, ana drach. i. 1/2. croci. scropul. 1/2. aceti unc. 1/2. caphurae gran. iij. His commistis fiat epithema cordi, in aestate quidem frigide, coq; utendum mane, & uesperis ante pastum. Hoc eodem epithemate testiculos madefacere, atque irrigare non mediocriter conferet.

DE MELANCHOLICIS FEBRIBUS. Cap. XIX.

Melancholia multipliciter dicitur. Interdum morbus est, interdum animi symptoma, nonnunquam & melancholicum humorem melancholiam appellamus. Atque haec duplex est, naturalis, & praeter naturam. Naturalis dicitur melancholia faecalis, & propria humor melancholicus, aut melancholicus sanguis. Cum. n. chylus in hepate in quatuor humores conuertatur, pars subtilior, magisq; cocta in bilem, mediocris substantiae, & coctionis in sanguinem, minus cocta, & crassa in pituitam. (Minus quidem cocta dicitur respectu sanguinis, & bilis.

bilis, non ratione sui, nam ratione sui completè cocta est ad nutritionem partium phlegmaticarū) pars uerò crassior, quæ fecis instar residet, estq; ueluti fæx aliorum humorum, melancholia fecalis dicitur. Huius pars humoris ad lienem defertur, pars uerò cū sanguine per uenas ad nutritionem melancholicarum partium. Est autē hic humor frigidus, siccus, & crassus. Quare cum ex eo gignitur febris, propter frigiditatem calefactione indiget propter crassitiem attenuantibus, sed non in principio, ut posterius dicitur: propter siccitatem uerò, quæ in eo excellit, humectantibus eget. Dum itaque febrem excitat, ad humectandum præcipua Medici cura se cōuertat. Melancholia præter naturam: siue non naturalis est quadruplex. Aut enim fit ex adustione melancholiæ naturalis: aut ex adustione bilis: quæ omnium humorum facillimè aduritur, unde fit melācholia, quæ atra bilis dicitur, quæ in terram proiecta feruet more aceti fortissimi. Fit & ab adustione pituitæ, quo fit, ut nonnunquam quotidiana quartanam uertatur, pituita in melancholiam conuersa. Fit quoque à sanguine adusto, siue putrescente. Cæterum, oritur quartana febris interdum à melancholia naturali, interdum à non naturali, & ab unaquaque eiusdem specie, nempe à melancholia sanguinea, biliosa, pituitosa, & naturali adusta. Et sæpe contingit post tertianam, per bilis adustionem.

FEBRIS QVARTANAE INTERMITTENTIS ab humore melancholico, Curatio. Ca. XX.

Cum enim melancholia naturalis in corpore abundat, siue ratione uictus, siue à temperie ab initio comparata, & putret extra uenas, febris oritur

Causæ.

Bb 4 quarta

DE MORB. INTER. CVR.

Signa.

quartana intermittens, quæ pura, & exquisita dicitur

Dignoscitur primo ut docet Gal. statim paroxysmo solo pulsu. Nam cessante paroxysmo, pulsus minor, rarior, ac tardior naturali sentitur, cōtra aliarum febriū naturam. (Nam in alijs febribus post paroxysmum maior est, ac frequentior, quàm sanitatis tēpore) Cuius pulsus ratio est, gravitas humoris arteriam exiccantis. Præterea in huius febris paroxysmo ante calorem superuenit primum horror, deinde frigus, postremò rigor, &

Viæ ratio.

confractio quædā, perinde ac si ossa frangerentur, ob gravitatem humoris membra onerantis. Viæ ratio, cum melancholia sit frigida, & sicca, sed sicca magis, ad humiditatem magis declinet, quàm ad caliditatem: quæ viæ ratio communis est omnibus melancholicis morbis. Elixæ itaque conveniunt, non assæ. Quod si carnes elixæ febrienti displiceant, in aqua ad perfectam usque coctionem decoquantur: deinde, ut egrotō satisfiat, parum torrentur. Si elixæ non displiceant, illis solis utatur. Sint autem carnes, pulli gallinacei, hœdi, capi, perdices, & similes. Assiccantibus omnino abstinendum. In morbi progressu cibibus attenuantibus utendum, cuiusmodi sunt cappares, & oliuæ conditæ, at non in principio, ne his crassa materia agitetur, & agitata magis obstruat, & febrem augeat. Vuæ quoque aliquantisper suspensæ propter humiditatem cōferunt. Rape quoque, quoniam humectant, conveniunt: sed duplici aqua prius leviter coquantur, tertia deinde aqua perfectè.

Viæ tenuis non convenit, quoniam morbus chronicus est. Si tamen egrotans corpulentus, et succulentus fuerit, tribus septimanis prioribus, si viæ tenui utatur, ei plurimum cōducet. Liberalius deinde nutritur

triat^{ur} cibis supradictis. Huius febris rigori adhibenda sunt remedia. Oleo enim aneth. & chamemel. in rigore ungenda spina dorsi secundum longitudinem. Aut è pom^o colocinti^d. medulla auferatur, deinde ol. aneth. & chamemel. impleatur, ac super prunas torreatur usque ad oleorum feruorem, deinde pomum cū oleis exprimatur, ex oleoq; expresso, dorsi spina secundū longitudinē ungatur. Prohibeatur somnus, & potus usq; ad declinationem paroxysmi. Quòd si à potu abstinere nequeat: aquam coctam cū saccharo bibat, aut aquam hordei: aut cū illarū altera misceatur conditum sequens præsertim in declinatione uniuersali febris. Recipe conferuæ bu^glossi, conferuæ cirsii an. ʒ. i. pul. letitiæ Gale. uel diamoschi dulc. ʒ. i. fragmentorum communium pretiosorū an. ʒ. i. bracteas auri. x. His commistis fiat conditum, quod sitis tempore cum prædictis aquis misceatur, ut dictū est. Poterit & eo uti sine illis aquis extra sitim ad cordis, et partium internarum roborationem. Medicamētis aut in principio uehementer calidis, aut frigidis abstinendū, ut compositionibus, quas cōfectiones appellant, nā compositiones calide inflammant, crudaq; adhuc materia inflammatur: atque inde febris pessima continuaq; suboritur. Quare à theriaca, & ænosaccharo abstinendū. Ex usu enim calidorum hæc febris plerunq; transit in duplicem, deinde in continuam, quæ ferè lethalis est, ubi de intermittente, continua efficitur. Nimiū quoq; refrigerantia uitanda, quoniam materiam incrassant. Nec sunt à principio danda medicamenta solutiua fortia, nam hic humor est omnium maximè expulsionì rebellis, atq; ita agigaretur, non educeretur, aliosq; humores secum agi-

Bb s taret.

DE MORB. INTER. CVR.

Curatio.

taret, magno febrientis malo. Abstinentum quoque i principio à uehementer incidentibus, attenuantibus, & aperientibus, non enim hæc agerent in humorẽ crassum sed in subtiliorem, sicq; crassus humor crassior redderetur. Sint in principio serapia, quæ exhibentur, leuiter, & moderatè attenuantia. Præterea solutiua medicamenta hac in febre magis in forma potionis conueniunt, quàm in forma solida. Si tamen ægrotus potionem auerſetur, pil. uti licebit. Curandi ratio à materiæ communium euacuatione auspicienda, ut in alijs febribus, aut enemate iniecto, aut leniente medicamento sumpto hunc in modum, in quartana pura à naturali melancholia. Recipe betæ, maluarum, linozostidos, ana Manip. i. florum chamæmeli. P. i. ß. Decoquantur in suffiçienti quãtitate aque ad tertias. Accipiãtur iuris decocti lib. i. ß. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana. ʒ. i. mellis uiol. (magis enim lenit, quàm rosaccum) ʒ. i. ß. olei communis. ʒ. iij. salis ʒ. i. ß. Cômistis omnibus, fiat enema, quod ante pastum infundatur. Aut enematis loco utatur leniente medicamento sequenti. Recipe cas. recens extractæ. ʒ. i. serapij de bugloss. ʒ. ß. stillatitiorum liquorum cirsiij, bugloss. ana. q. s. fiat potio, quæ sumatur manè horis quatuor ante pastũ. Materijs communibus uacuatis, si melancholia fœcalis cum sanguine mista uideatur, sanguis mittatur, fiatq; uenæ diductio lata. Si sanguis niger exeat, sinatur exire, pauca tamen sanguinis quãtitas detrahatur, sin rubicundus, claudatur mox uena. Nonnulli tamen inter medicos non postremæ notæ, censent sanguinis missionẽ in morbi progressu, materia iam cocta potius, quàm in principio faciendam. His peractis, materia hunc in modũ concoquatur.

agatur. Recipe oxymelitos simpl. 3. iij. stillatitio-
rum liquorum cirsij, buglos, lupi salictarij an. 3. ij. Misceā-
tur, & cinnamomo saporis gratia adiecto, à ieiuno per
iduum diluculò sumantur. Repetantur alijs quatuor die-
bus. Et quoniam hæc materia concoctu admodum est dif-
fícilis, si per dies uiginti serapia concoquentia repetan-
tur, multò utilius erit. Vacuetur deinde materia medica
mento leui hunc in modum. Recipe cathol. 3. vi. compo-
sitionis Hamech. 3. i. serapij de buglos. 3. 3. communis de-
cocti 3. iij. 3. adiectis in fine decoctionis epithymi 3. ij.
epithymum coctionem multam non sustinet, siue in se-
rapijs, siue in apozemate, siue in solutiuo addatur, mul-
ta enim coctione uis eius exoluitur) fiat potio, quæ ad au-
roram posteriore die quietis sumatur: quo quidẽ die por-
tio melancholice, quæ sequentem paroxysmum factura
est, quodammodo mouetur, quæ sic mota facilius educi-
tur, quàm priore die. Recipe conferuæ buglos. 3. 3. su-
matur postridie mane. Transactis deinde diebus aliquot,
iterum atque iterum purgandus est, præmissis tamen se-
rapijs concoquentibus. Nam in morbis longis partem
humorum concoquere oportet, partem uacuare repetitis
uicibus. In morbi igitur progressu, rursum sic concoqua-
mus humorem. Recipe serapij de epithymo 3. ij. sera-
pij acetati simpl. 3. i. stillatitiorum liquorum cirsii, bu-
glosi, lupi salictarij, ana 3. ij. Misceantur, et à ieiuno per
biduum diluculò sumantur, adiecto cinnamomo saporis
gratia. Repetantur alijs quatuor diebus. Aut utatur
apozemate sequenti.

Recipe cortic. radic. cappar. 3. i. quinq; rad. com. mace-
ratarũ in aceto, an. 3. 3. buglos. cũ radice, fumariæ, cirsij,
melis-

DE MORB. INTER. CVR.

melissophylli, an. Manip. i. quinque herbarum capill. an.
Manip. β. uuarum passarum detractis uinaceis. 3. i. flor.
genistæ, trium florum communium, ana. P. i. β. polypod.
quer. 3. i. foliorum sennæ oriēt. al. 3. β. Decoquantur in.
q. aquæ, tantisper dum dimidium absumatur. Accipiātū
iuris decocti lib. ij. aceti passulati. 3. iij. in fine decoctio
nis addantur. 3. ij. epithymi, adiectisq; saccharo, & mel
le, fiat serapiū mediocriter coctum quod depuretur, dei
de cinnamomi selecti. 3. iij. & saporis, & odoris gratie
addatur. Hoc apozemate utatur ægrotus, sed diebus ma
ne. Deinde in hunc modum uacuetur. Recipe cathol. 3.
vi. compositionis Hamech. 3. iij. serapij de buglos. 3. β. de
cocti communis. 3. iij. β. adiectis foliorum sennæ, polypo
dij quer. an. 3. β. fiat potio, quæ die à paroxysmo secundo
sumatur ad horam quartam matutinam. Recipe ther.
ueter. 3. i. conferuæ rad. cirsi. 3. ij. Misceantur, & postri
die manè sumantur sex horis ante pastum. Apparente
concoctione, bis deinde singulis hebdomadibus duabus ho
ris ante paroxysmum, & cibum manè theriacam sumere
plurimum conferet. Ante autem concoctionem materiæ
sequenti compositione utatur ægrotus. Recipe specie
rum diarrhodi abb. specierū elect. ex tribus santalis ana.
3. ij. pul. diamoschi dulc. (calidum hoc est, sed cum frigi
dis in principio dari potest) pul. letitiæ Gal. an. 3. i. β. sac
chari dissoluti in stillatitijs liquoribus rosa. & bugl. q. s.
figatur electar. solidum in rhomborum figurā, sint aut
singuli rhombi ponderis. 3. ij. β. è quibus sumatur unus
manè, & uestperi per horam ante pastum diebus quietis,
quando aliud non sumitur, aut sumptum est. Post autem
materiæ coctionem utatur electario sequenti. Recipe
elect.

lect. diamoschi dule. & letitie Gale. an. ʒ. ij. capiat tab.
mane & sero per horam ante pastum, quando non su-
mit aliud.

FEBRIS Q VARTANAE INTER-

mittentis à melancholia per bilis adustio-

nem, Curatio.

Cap. XXI.

Cognoscitur hæc febris dupliciter. Primum si ter-
tiana præcessit, quæ in quartanam conuersa sit. Signa.
Secundò, si æstatis tempore, aut Autumni, iuue-
nis biliosus, cibis calidis, & bilem gignentibus antè usus
quartana laboret. Medicamenta, quæ adhuc febris cu-
rationem adhibentur, ad humidum, et frigidum præser-
im in principio declinare debent, quoniam multum ca-
loris in principio habet. In progressu uerò, minuto ca-
lore, calfacientibus utendum. Deinde prohibeatur bilis
ustio, & quæ iam usta est, si fieri potest, corrigatur. Ci-
bus quoque sit in principio frigidus. Lactucæ ferculis mi-
ſceantur. Melones, cucurbitæ, carnes suille recentes con-
ferunt. Quies motui utilior. Fiant fricationes leues par-
to molli. Cibus tribus aut quatuor horis ante paroxys-
mum sumatur, cum in alijs quartanis die paroxysmi ine-
lia ferenda sit. Potus sit uinum aqua hordei, aut aqua co-
cta dilutum. Vitanda & ira, & tristitia. Curandi ratio Curandi
ratio.
in materiæ cōmuniū uacuatione inchoanda, aut ene-
mate infuso, aut medicamento leniente sumpto hunc in-
modum. Recipe maluarum, uiolarie, bet. e, linozosti-
los, an. M. i. pruna. x. Decoquantur in s. q. aquæ ad ter-
tias. Accipiantur iuris decocti lib. i. ʒ. cas. recēs extractæ,
sacchari rub. an. ʒ. i. ol. uiol. ʒ. iij. salis triti parū. Fiat ene-
ma, quod ante pastū infundatur. Aut enematis loco uten-
dum

DE MORB. INTER. CVR.

dum medicamento leniente sequenti. Recipe pruna
 masc. x. trium florum com. an. P. i. oxyphœnicœ. ʒ. ʒ.
 coquantur in. s. q. aquæ, donec dimidium absumatur. A
 piantur iuris decocti. ʒ. iiij. cas. recens extractæ, uel m
 na ʒ. i. serapij uiola. ʒ. ʒ. Commistis omnibus fiat pot
 quæ manè horis quatuor ante pastum sumatur. Mater
 autem in principio humectantibus, & infrigidantibus
 hunc in modum concoquatur. Recipe serapij uiolæ
 (infrigidat & humectat) ʒ. ij. serapij acetati simpl. ʒ.
 stillatitiorum liquorum intybi satiui lati folij, buglo
 lupi salictarij, ana. ʒ. ij. Misceantur, & adiecto pulue
 santalorum citrinorum per biduū à ieiuno sumantur. I
 petantur quatuor alijs diebus. Vacuetur deinde leui me
 camento, forte enim in principio exhibendum non es

Recipe cathol. ʒ. ʒ. compositionis Hamæch. ʒ. i. ʒ. ser
 pij uiolacci ʒ. i. decocti paulò antè scripti ʒ. iiij. ʒ. fiat p
 tio, quæ sumatur die secundo post paroxysmum manè l
 ris sex ante cibum. Theriaca post solutium in principi
 huius febris est bona. Quiescat deinde dies aliquot, ac in
 tereà utatur electario sequenti. Recipe diacorallij ʒ.
 ij. sumat tessellam unam manè, & uesperis ante cibum. &
 uerò magna appareret in hepate inflammatio, loco dia
 corallij utatur electar. ex tribus santalis. Fiat & sequen
 epithema hepatis. Recipe stillatitij liquoris intybi s
 tiui latioris ʒ. viij. stillatitiorū liquorum oxalidis, & r
 sarum, an. ʒ. iiij. omnium santalor. an. ʒ. i. ʒ. aceti. ʒ. ʒ. spi
 ce nardi. ʒ. ʒ. Commistis omnibus fiat epithema hepat
 tepidè ante pastū. Prohibeatur potus in paroxysmo usq
 ad declinationem, si tamen sitim sustinere nō posset, au
 aquam coctam, aut aquā hordei utraq; cū serapio uio
 lacei

eo bibat, aut cū sequenti condito. Recipe cōseruæ ro
sa. cōseruæ buglos. cōseruæ cirsii, cōseruæ uiolarū, an.
℥.ss. manuschristi cū unionibus. ℥.i. ss. fragmentorū cō
munium pretiosorum, an. ℥.i. corallij rub. ℥. ss. sacchari.
q. s. fiat conditum adiectis auri bracteis x. Et sine aquis
prædictis eo interdum utatur ad partium principium ui
res roborādas. Vbi deinde dies uiginti, aut amplius quie
uerit, cōcoquatur humor hunc in modū, præsertim si mul
tus adhuc appareat calor. Recipe serapij de epithymo.
℥.ij. serapij uiolacei ℥.i. stillatitiorum liquorū intybi sa
tiui latioris, buglosi, fumariæ, an. ℥.ij. adiecto santalo cie
trino misceantur, & à ieiuno per biduum sumantur. Re
petantur & aliis quatuor diebus. Aut utatur apozema
te sequenti. Recipe succi buglos. succi cirsii, ana. lib. i.
ss. succi pomorum redolentiū lib. i. sacchari. q. s. Decoquā
tur usq; ad consumptionē tertiæ partis, addendo aceti ℥.
ii. Eo utatur sex diebus appetente diluculo. Deinde detur
solutium sequēs, quod fortius dari potest, quā in prin
cipio, si materia iam cocta sit. Recipe pruna damasce.
decem, uuarū passarū detractis uinaceis, mixorum, zizi
phorū, an. ℥.ss. trium florum com. an. P. i. ss. Decoquantur
in. s. q. aquæ usq; ad dimidii consumptionem, accipiantur
iuris decocti ℥.iiii. ss. in quibus macerentur myrobalano
rum flauarum & cærulearum cōfricatarum ol. amygda.
dulc. an. ℥.i. manē lento igni fricentur, & colentur, adie
ctisq; cathol. ℥. ss. compositionis Hamech ℥.iii. serapii
uiolacei unc. ss. fiat potio, quæ sumatur ad auroram die
secundo à paroxysmo. Hic dari potest theriaca hunc
in modum. Recipe theria. uete. ℥.ii. dissoluatur in
stillatitiis liquoribus rosarum, & buglosi, & postri
die

DE MORB. INTER. CVR.

die manè sumantur horis sex ante pastum. Circa statum
huius febris, si laborans corpulentus sit, & succulentus,
ac iuuenis, incidi poterit aut iecoraria uena, aut salua-
tella manus sinistrae. Sanguis autem si crassus, & niger
appareat, pro egrotantis uiribus detrahatur: si tenuis,
& minime melancholicus, statim supprimatur. In statu
uero sequenti elect. utatur. Recipe pul. diarrhodi abb.
pul. diamargar. calidi, uel elect. de gem. an. ʒ. i. ʒ. sacchari
dissoluti in stillatitio liquore buglossi. q. s. fingatur elec-
tar. solidum in rhomborum figuram, e quibus unum su-
mat manè, & uespero ante pastum. In febre quartana
melancholia naturali, & à bile adusta, quoniā in utraq;
siccitatis multū est, poterit egrotans ad humectandū cor-
pus in principio ante coctionē aquae dulcis balneo uti.

FEBRIS QVARTANAE A MELAN- cholia à sanguine adusto, Curatio. Ca. XXII.

HAcc febris si accuratè regatur, alijs quartanis bre-
uior esse solet, ut quae uix uiginti accessiones supe-
ret. Et uictus ratio, & medicamenta ad caliditatem, &
humiditatem moderatè declinent: nam haec melancholia
non adeò frigida est, & sicca, quàm aliae. Curandi ra-
tio ab educatione materiarum communium exordienda,
aut enematibus, aut medicamentis lenientibus hunc in
modum. Recipe uiolariae, maluarum, althaeae, an. Ma-
nip. i. spinæ albæ Manip. ʒ. quatuor seminum frigid. ma-
iorum, an. ʒ. i. Decoquantur in sufficenti quātitate aquae
ad tertias. Accipiātur iuris decocti lib. i. ʒ. cas. recens ex-
tractæ, saccha. rub. an. ʒ. i. ol. uiol. ʒ. iij. salis parum. Com-
mistis omnibus fiat enema, quod ante pastum infundae-
tur die quietis. Aut enematis loco, sumat sequens medi-
camentum

uictus
ratio.

Curandi
ratio.

LIBER QVARTVS. 201

amentum leniens.

Recipe pruna damasce. x. trium florum com. an. P. i. oxyphenicwn. 3. 3. Decoquantur in s. q. aquæ donec dimidiū absumatur. Accipiātur iuris decocti. 3. iij. adiectisq; cas. recens extractæ, uel manna. 3. i. serapij. uolacci. 3. 3. fiat potio, quæ die quietis manē horis quatuor ante pastum sumatur. Materijs communibus eductis, incidatur uena interna dextri cubiti, sanguinisq; 3. vi. detrahantur, si uires & ætas permiserint. Poterit & missio sanguinis rursum fieri incisa aut mediana, aut iccoraria sinistra brachij post paroxysmum sequentem priorem sanguinis missionem, nisi quid aliud obstet. His peractis, materia hunc in modum concoquatur. Recipe serapij acetati simpl. 3. ij. serapij uolacci 3. i. stillatitiorum liquorum, intybi satiui latioris, adianti, lupi salictarij. ana 3. ij. Misceantur, adiecto santalo citrino, & à ieiuno per bidduum diluculo bibantur. Repetantur alijs quatuor diebus. Hac in febre medicamentum solutiuum debile admodum sit oportet, in hunc modum.

Recipe rhabar. selecti. 3. i. spica gra. iij. foliorum senneæ oriental. 3. ij. Macerentur in sero caprino, & pauco uini albi horis xij. deinde exprimantur, adiectisq; serapij ros. laxat. 3. ij. stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, & bugloss. 3. iij. fiat potio, quæ die secundo post paroxysmum ad aurorā sumatur. Quiescat deinde per dies complures, atque interea utatur elect. diacorall. quotidie ante pastum matutinis horis. Si calor uehemens sit, pro liacorall. utatur elect. ex tribus santalis. Vbi dies aliquot quieuerit, rursum concoquatur materia hunc in modum.

Recipe serapij intybi satiui latioris 3. iij. stillatitiõrum
C c liquor

DE MORB. INTER. CVR.

liquorum fumarie, lupi salictarij, buglosi, ana. unc. ij. Misceantur, & à ieiuno per biduum sumantur. Repe- tantur & alijs quatuor diebus. Vacuetur deinde mate- ria sumptò rursum medicamento solutiuo proximè dia- sto. In fine augmenti utatur laborans electar. sequenti.

Recipe specierum diarrhod. abb. 3. ij. corallij rubri 3. i. margaritarum 3. ij. sacchari dissoluti in stillatitio li- quore buglos. q. s. fingatur elect. solidum in rhomborum figuram e quibus unum sumat manè ante pastum usque ad declinationem morbi. In declinatione autem utatur duntaxat elect. diarrhodi abb. Paroxysmi uerò die utatur condito superius tradito in Quartana à Melancho- lia à bile adusta.

DE FEBRE QVIN- TANA, SEPTANA, ET NONANA.



Vintana, Septana, & Nonana, curan- tur eo modo quo Quartana à melan- choliapituitosa.

Hippocrates in Epidemijs, ponit febrem quintanam, septanam, & no- nanam: asseritq; quintanam esse alijs deteriore, quàm sextana, & septana sint longiores, nō tamen mortales. At quintana mortalis est, non tamen omnis. Hoc intelli- gendum de quintana quæ præcedit, uel sequitur hectica. Nam febris erratica quæ migrat in quartanam, & ex quartana in quintanam lethalis est. Talis igitur quin- tana quæq; prædictas febres sequitur, et præcedit hecti- cam,

cam, lethalis est corpus incinerando et exsuccando. Quintana quæ sequitur febres erraticas uel hecticam, periculosa est.

Ceterum, notandum est, quod in corpore hectici aliquando sunt humores, qui incinerantur et paucificati faciunt quintanam, quæ materia à quartana non differt quauis materia quintanæ sit paucior & crassior. Præterea notandum est quod quartana neque præcedit neque sequitur quintanam. Potest enim aliquando ita incrassari & paucificari pituita ut quintanam incipientem excitet. Gal. exponens Hippocratem loquentem de Quintana, Septana, & Nonana ualde frigide exponit.

Porrò sextana, quintana, & aliæ possunt accidere ex errore Medici, uel ægroti, nempe à multitudine cibi. Galenus in Commentarijs quos edidit in Hippocratem ita inquit. Si esset sextana, esset sextus humor, & si esset septana, esset septimus, & si esset nonana, esset nonus humor. Galeno respondere possumus unum & eundem humorem excitare quartanā, quintanā, sextanā, septanam, et nonanam. secundū maiorem & minorem crassitiē: quoniam ut humor moueatur certo die, requiritur certa quedam magna quantitas talis humoris. Proculdubio in aliquibus regionibus quidā morbi dominantur, qui in alijs regionibus non dominantur. Rasis affirmat se uidisse hominem, qui quintodecimo quoque die laborabat febre, et alium, qui semel dūtaxat in mense laborabat febre. Has autem prædictas febres certum est fieri à sola Melancholia pituitosa, propterea quod humidior est alijs speciebus Melancholiæ, et per consequens sic uisita non est quin aliquid de humore retineat.

DE MORB. INTER. CVR.
DE FEBRE PESTILENTIALI.

Causa fe-
bris pestilē
tialis.

Causa Febris pestilentialis sunt multae: nempe aer, qui potest alterari multis modis. Potest enim calefieri, siccari, &c. Item potest putrescere: Putredo est uia ad corruptionem. Putrefactio est passio misti per quam quatuor elementa separantur, & tandem sequitur corruptio. Sed elementum purum multo modo potest putrere. Verum est quod putrefactione proprie dicta, aer & aqua, non possunt putrere. Aer tamen & aqua dicuntur putrere, quod uapores aliqui putridi eleuati à locis putridis miscentur aeri, & aquae, & ita aer & aqua dicuntur putrere, non tamen proprie.

Item Aristoteles quarto Metheororum asserit omnia elementa praeter ignem putrere, quod intelligi debet de putredine per mitionem, & non de putredine proprie dicta. At ignis nulla putredine potest putrere propter insignem caliditatem, quae potius assumit quam putreat.

Item in problematibus Aristoteles asserit aerem non putrere, quod intelligi debet de aere supernae regionis. hic enim non potest putrere propter uicinitatem ignis.

Causa putredinis elementorum.

Causae putredinis elementorum non simplicium, aliae sunt propinquae, ut delatio uaporum putridorum à cadaueribus, qui deferuntur per uentos, et attrahuntur per respirationem, & ita excitant febrē pestilentialem. Vapores eleuati à cadaueribus corporum humanorum magis inficiunt homines, quam uapores eleuati ab alijs cadaueribus.

Item uapores eleuati à cadaueribus equorum magis inficiunt equos quam alia animalia. Aer secundum diuersas sui alterationes diuersas febres in nobis gignit.

Putredo quid.

Item Putredo est remollitia quaedam cum febre in aer

et aqua. Aer humidus potest generare febres putridas, non pestilētes. Præterea causæ putredinis aeris remotæ, sunt influxus cælestis, qui potest etiam causare pestilentialia, quando simul coniunguntur causæ inferiores.

Nota q̄ Doctores dicunt hanc febrem pestilentialem fieri posse à solo influxu cælesti, non concurrente inferiori causa, nempe nec putredine aeris, nec aquæ. Hoc tamē rarò fit. Videmus enim aliquādo aerem purissimum esse, et tamen febris pestilens est.

Item à profunditatibus terræ aliquando oriuntur uapores qui inficiūt aerē, et pestē generant, et præcipuè si uapores fuerint longo tempore retenti intra terram.

Item nota quod aer putrens causat pestilentialem febrem perueniendo ad cor, cuius spiritus uitales corrumpit et humiditates quæ sunt in corde, et prope cor, quod est pars maximè sanguinea. Plus enim sanguinis in corde naturaliter quam in alijs partibus est, propterea igitur aer putridus perueniens ad cor corrumpit temperiē spiritus uitalis et cordis.

Re uera febris pestilens quæ fit à putredine aeris, et succendit spiritus cordis est diaria, quamuis spiritus possit putrere, sed statim dissoluitur cum putret.

Verum quod ut plurimum febris pestilentialis est humoralis ab humore putrido, quia aer putridus putrefacit humores cordis. In febre pestilente illico putret sanguis existens intra cor, secus si habet in alijs febribus in quibus sanguis qui est in corde non primo loco putret. Febris pestilens ut plurimum est synochos putrida, ideo sectio uenæ conuenit in febre pestilentiali: potest tamen esse Causos, si sit multa bilis in corde, rarò fit à melanc

DE MORB. INTER. CVR.

cholico humore, & pituita febris pestilens. In febre pestilenti humores & spiritus cordis corrumpuntur et putrescunt, præcipue in febre pestilentiali humoralis.

Item ut plurimum febris pestilentialis fit à sanguine, quia sanguis magis abundat in corde quam alij humores. Corpora ualde imbecilla, ut quæ nimio coitu utuntur, & cacochyma. Item humida quæ utuntur multo balneo, sunt obnoxia pesti. Item corpora pororū dilatatorū sunt obnoxia pestilentiali febre, idq; à natura: corpora densa à causa præter naturam, nempe propter humores obstruentes cutim sunt magis obnoxia pesti, sed corpora densa, naturaliter sunt minus obnoxia pesti, quam corpora rara.

Signa fe-
bris pe-
stilentialis.

Signa febris pestilentialis hæc sunt. Febris pestilens est quieta quoad tactum & caliditatem acrem, et est conturbans interius, quia humiditates cordis putrent uenosa putredine.

Item ægri sunt inquieti, & uolunt mutare locum, propter malignam putredinem, quæ est in corpore quando bilis putret.

Pestilens febris habet caliditatem externā exterius:

Item in febre pestilentiali est eleuatio anhelitus, quia natura conatur euentare cor. Interdum curtatur anhelitus, quia uires multum debilitantur, & ita symptomata statim à principio fortia apparent. Est etiam sitis magna propter uapores, est nigredo linguæ, & siccitas linguæ, & calor immodicus.

Quartum signum est, quod sæpe nausea accidit, quia aliquæ materiæ pergunt ad uentriculum.

Itē est prostratus appetitus ægri. Debent horatim sumere

mere cibū, quia putredo uenenosa corrumpit statim spiritus, qui citò restaurari debet, alioqui moreretur eger.

Item comedunt nolentes ægri, quibus dabimus uinū.

Aliud signum est quod pustulæ quædam nascuntur in lingua, et partibus oris propter uapores eleuatos acres ad partes oris, tales pustulæ statim hulcerantur. Dabimus lotiones oris.

Item Pustulæ sæpe accidunt infantibus propter lactis acrimoniā, puluis myrtillorū confert his pustulis.

Item Pustulæ impediunt transglutitionem, et hulceratur lingua, tum folia lauri contusa, et redacta in cinerem, conferunt huic affectui.

Aliud signum, quod Pustulæ multiplicantur in corpore febricitantibus febre pestil. Pustulas uocant, le rac.

Causantur à uaporibus malignis istæ Pustulæ, quæ sunt nigræ aliquando, nōnunquam uiolaceæ, subalbide, et subnigræ: quia subito liuescunt. Tunc malum signū est, quia tunc materia uenenosa redit ad cor.

Aliud signum est tensio hypochondriorum: nam propter imbecillitatem caloris innati multiplicantur multi flatus circa hypochondria: unde sequitur tensio hepatis uentriculi et aliarum partium.

Aliud signum est, q. tenditur uenter aliquando, ac si laborarent Tympanite, idq. propter multitudinem flatuum, generaliter propter imbecillitatē caloris natiui.

Item stercus est foetidū, quia aliqua portio humoris putridi symptomaticè ui morbi qui excitat naturā eijs: aliquando partes corporis aliquæ eliquescent sic, ut stercus sit oleaginosum. Sunt. n. foetida urinæ, propter putredinē. Finis putredinis et uersionis, est incineratio.

DE MORB. INTER. CVR.

ſudores etiam ſunt foetidi in hac febre, propter malignam putredinem, quæ eſt in uenenofitate. Notandum eſt quòd omnia prædicta ſigna ſtatim apparent à principio, quia à principio humiditates cordis putrent. Profectò datur aliqua febris peſtilens diaria, quæ citius interimit, quàm alia.

Quædam eſt febris peſtilēs, quæ rarò accidit, de qua tractat Gal. tertio de febribus, & eſt in qua non ſentit ager magnam ſitim: neque alterationem pulſus, uel urinarum, & tamen ſtatim ager moritur.

Dubium occurrit quomodo ager non ſentit multitudinem caloris? dicendum eſt ægrum ſentire calorem acrem ſed non plurimum. Item iſta febris contigit rarò, eam tamen uidi. Iſta febris citò interficit, quia habet uenenofitatem, quæ eſt occulta qualitas. Notandum eſt, quòd in hac febre peſtilenti pulſus non alteratur magna alteratione, quia febris peſtilentialis eſt, in qua natura non audet inuadere morbum. Sed hæc ratio nō eſt bona, quia ſequeretur naturam agere cum uoluntate. Altera ratio eſt, ob quam pulſus non alteratur alteratione magna ſecundum rationem febris, quia uires ſunt imbecillæ. Vel dicendum eſt, pulſus non alterari, quoniam in humoribus cordis, qui alterantur in hac febre, duo ſunt conſideranda, putredo, & uenenofitas. In hac febre aliquando à principio uenenofitas magna introducitur antè quam humores putreſcant, & ſtatim ſymptomata ſunt magna, aliquando uenenofitas & putredo ſimul corripunt humores & tunc calor magnus in initio apparet, aliquando prius putredo in cepit in humoribus cordis, aliquando uenenofitas, & tunc pulſus in initio parum alteratur,

LIBER QVARTVS. 205

tur, quia calor non est uehemens. Calor enim putredinis non est uehemens, & tamen uenenositas corripiciens humores interficit ægrum.

Sunt qui asserunt hanc materiam uenenosam posse esse in locis remotis à corde, & tunc materia uenenosa distans à corde parum alterat pulsum. Alii asserunt quod accidit aliquando febris materiam concoqui à natura, quia humor uenenosus mouetur ad cor, & ita interimittur æger, & hoc sæpius accidit in alijs febribus. Nam sæpe quando morbus non est periculosus in initio, moritur ægrotus humore concocto, nempe delata maligna materia ad cor, materia mota per crisim à natura.

Ceterum urina est excrementum hepatis, ideo quia hepar parum afficitur in febre pestilente urina bona, cū bona hypostasi potest apparere cū æger moritur. Hepar tamen fungitur suo officio, adiuuante corde facultate uitali, quæ defertur à corde.

Notandum est quòd licet hepar concoquat chylum beneficio cordis adeò ut facultas hepatis deficiat deficiente uitali facultate cordis. Tamen potest esse satis magnum nocumentum in corde non existente proportionaliter nocumento in hepate. Erit tamē aliquod nocumentum in hepate, & tamen poterit urina satis esse bona in hac febre. Iudicia Medicorum sunt uera ut plurimum. In febre omni pestilentiali, quando anhelitus foetet, statim æger moritur, quia talis foetor anhelitus procedit à putredine magna existente in corde, dummodo talis foetor non proueniat ab humoribus putridis, circa pulmones. Aliquando catarrhus putret circa pulmones, & tamen talis humor non est phtisicus.

Cc 5 Sunt

DE MORB. INTER. CVR.

Sunt nonnulli morbi, ut hectica, in quibus urina est laudabilis, & tamē aeger moritur. Hæc abundē de signis febris pestilentialis.

Signa febris pestilentialis ab aere in Autumno, quādo apparent in suprema regione aeris ignes diuersimodē propter aerem pestilentialem.

curatio.

Item isti ignes apparentes in principio Autumnū denotant futuram pestem per hyemem & autumnum. Cometa sequitur influxū alicuius maligni astri præcipue Martis, ideo cometa mouetur ab Oriente in Occidentem cum Marte, ideo cometa significat pestem & febres biliosas futuras. Reuera isti ignes apparentes in aere non sunt causa pestis, significant tamē uel influxum malignum syderis, & eleuantur ab infima aeris regione.

Ignes isti denotant multos uapores eleuari à terra, & crassi uapores remanent in infima aeris regione, & ita putrefaciunt aerem.

Item nota quòd pestilentia capitur bifariam, propriè nempe pro ægitudine, quæ multos interficit: Alia est pestilentia communiter pro morbo eueniente uno tempore, non tamen ita interimente homines, et hoc est quando multæ biliosæ febres, uel causi regnant in uno tempore, & in eadem regione.

Item nota quòd hyeme, quando Auster multiplicatur, est causa putredinis.

Item quando uentus Subsolanus qui est calidior Austro, flat hyeme, tunc est signum pestis futuræ in hyeme.

Item quando aer turbulentus apparet, et uidetur pluerē, & non pluit, tunc est signum pestis hyeme.

Præterea quādo uidetur uer siccum esse cum aliquali

Figore & non pluit uere, tunc futura est pestis æstate. Nam quando uer est siccum, tunc terra generat & eleuantur multi uapores qui permiscuntur cum aere, & iunt cum aere putrefaciente aerem, quia non pluit.

Nota etiam quòd quando non fuerit multum calida, significat aerem pestilentem.

Item quando in æstate uidemus quòd certa hora notis uiget frigus, & de die est caliditas. Idq; æstate tunc est signum pestis, quia uapores miscentur cum aere, & reducunt se ad frigiditatem.

Item nota quòd quædam sunt signa communia aeris pestilentis. Nam uarietas in calore & frigore in omni tempore significat aerem pestilentem: unde Autumnus inter omnia tempora est tempus maximum propter eius uarietatem in frigore & calore. Hæc enim uarietas est causa uirium imbecillitatis. Alia signa communia quocunque tempore sunt, quando animalia quæ generantur per putredinem maxime multiplicantur, uidelicet, quando ranæ quæ sunt parue multiplicantur in terra, & multi uermes miscentur, signum est aerem esse pestilentem, quando etiam animalia, ut talpæ, quæ uiuunt intra terram, mouentur ad partes externas terræ, tunc est signum aeris pestilentis. Quædo pestilentia aeris peruenit ab astris, animalia quæ sunt in montibus currunt ad ualles, & partes infimas, & aues montanæ relinquunt nidos suos, & contrà quando infectio aeris à partibus internis ut à terra, tunc animalia terrestria à partibus infernis ad supernas fugiunt, & uitant contraria sibi.

Hæmitritæi

DE MORB. INTER. CVR.
HÆMITRITÆI CVRATIO.

Hæmitritæos consideratur multis modis. Nam hæmitritæus uerus est febris composita ex tertiana intermittente & quotidiana continua. Fit ubi putrescēs pituita putrefactæ bili admiscetur.

Non uerus fit ex pituitosa intermittente, & tertiana continua, uel ex utraque cōtinua, uel intermittente: idq; semper secundum Galenum. Quando igitur paroxysmi quotidiana, & tertianæ simul & semel incipiunt, talis febris est cognitu difficilis, tunc multi sunt rigores. Sed talis febris cognoscitur, quia paroxysmus tertianæ citius finietur quàm paroxysmus quotidiana, quia paroxysmus quotidiana est longior.

Interdum prædictæ febres nō incipiunt simul, sed paroxysmus unius febris, ut tertianæ incipit post paroxysmum quotidianæ, & hoc potest facillè cognosci.

Porro notandum est quòd aliquando sunt duæ continuæ: nempe quotidiana continua, & tertiana continua.

Hæmitritæos est de febribus interficiētibus, quia natura est aggrauata propter diuersitatem materiæ. Et aliquando extenditur usque ad mensem: quāuis sit aliquando febris breuis, ut quando materia est pauca, & in uis ductuum. Sæpe hæmitritæus ducit ad hecticam propter diuturnitatem sui. Aliquando causat hydropem propter obstructionem. Quidam doctor asserit hanc febrem accidere ecclesiasticis, quibus propter labores magnos initio, multa bilis fuit collecta, deinde multa pituita. Quidam Medici diuidunt hæmitritæum in maiorem, minorem & medium.

Signa hæmitritæi aliqua sunt quæ significant hæmitritæum

tritæum absolute: primum est quod unus dies est intensior alio die, si hæmitritæos est febris composita ex tertiana & quotidiana, quia tertio die est paroxysmus tertianæ & quotidianæ.

Nota tamen quod istud signum non est necessarium nisi sit coniunctum cum alijs signis, quia aliquando sunt duæ tertianæ nothæ quarum unius paroxysmus erit fortior paroxysmo alterius uel debilior: & in tali tertiana duplicata materia putret in diuersis locis et corporibus.

Secundum signum est tale, quando tertiana & quotidiana sunt intermittentes, quod rigores & frigus multiplicantur, præcipue quando simul incipiunt, uel quando principium unius sequitur alterius principium, hoc signum hæmitritæi est uerum. Imò in hæmitritæo quando febres simul ueniunt, una particula manet frigida, et altera calida. Cum igitur nunc frigus, nunc calor apparet in paroxysmo alicuius febris est hæmitritæos.

Hæmitritæos nō definit ad infectionem.

Tertium signum hæmitritæi absolute est quod nō remanent sine febre ægroti, etiam quando febres constituentes hæmitritæum sunt intermittentes, quia quotidianæ quies nunquam est munda, etiam si sit quotidiana exquisita.

Signum hæmitritæi secundum diuersitatem temporum uniuersalium & particularium uariatur, quia quando tertiana & quotidiana simul inuadunt, & paroxysmi simul incipiunt, tunc propter choleram & pituitam tardatur & augmentatur calor uicissim propter pugnam duorum humorum.

Quotidianæ quies non est munda.

Item status in paroxysmo prolongatur magis in hæmitritæo quàm in simplici tertiana.

Item

DE MORB. INTER. CVR.

Itē citiùs aduenit status in hæmitritæo, quàm in simplici quotidiana: idem dicendum de declinatione. Nam in hæmitritæo, in fine paroxysmi exiguus sudor aduenit, multus sudor aduenit in declinatione tertianæ. Quando sanguis est copiosus phlebotomia conuenit, uomitus conuenit quando plus pituitæ est quam bilis, si bilis dominetur, etiam dabis uomituum, sed aliud, in principio.

Prouocantia urinam debent esse debilia, & Syrupi in initio debent esse parum aperitiui, in principio mel rosatum coctum cum syrupo de endiuia simplici, dabis in processu oxymeli, & Syrupum capilli ueneris, & de duabus radicibus, dabis postremo ordine, syropos magis aperitiuos procedendo ad maiora, ut ad apozemata bene aperitiua ex asaro facta, quod educunt bilem per urinas.


In declinatione syrupum byzantium ordinabis. Quæ prouocant urinas, prouocant sudores.


Primò educendæ materiæ communes cuiuslibet concoctionis cum cassia & manna. Materiæ cōmunes sunt educendæ, in processu febris per clysteres, quia materiæ illæ declinant ad partes inferiores, aliquando phlebotomia conuenit in hac febre, quia est repletionalis, deinde concoquenda est materia primum & postea uacuanda, tandem prouocandæ sunt urinæ per apozemata, quando apparent signa perfectæ concoctionis sudores sunt prouocandi. Postremo oportet succurrere symptomatibus.


F I N I S.

VENETIIS, Ioan. Gryphius excudebat.

M D L I I I.







83104

